

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

# **РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ**

**для самостоятельной работы**

**выпускников базового уровня специальности «Акушерское дело»**

**для подготовки к 1-му этапу государственной итоговой аттестации**

**г. Новосибирск  
2025**

## Уважаемые студенты!

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы студентов 3 курса специальности Акушерское дело при подготовке к государственной итоговой аттестации, первый этап - тестирование.

В «РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ» представлены типовые тестовые задания первого уровня (на выбор **одного правильного ответа**). При выполнении задания требуется проанализировать верный ответ. Ответ на задание превращается в законченное утверждение. Ответы на тестовые задания можно сверить с правильными ответами предложенных эталонов.

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности специалиста относительно теоретических знаний в профессиональной области.

Тестирование будет проводиться с использованием тестовых заданий, комплектуемых для каждого испытуемого автоматически с использованием информационных систем путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных средств.

На решение тестовых заданий отводится 60 минут.

Результат тестирования формируется с использованием информационных систем автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий.

На основании результата тестирования автоматически выставляется результат прохождения слушателем 1 этапа государственного итогового экзамена:

**"сдано":**

**"5"** - при результате **90%** или более правильных ответов от общего числа тестовых заданий;

**"4"** - при результате **80%** или более правильных ответов от общего числа тестовых заданий;

**"3"** - при результате **60%** или более правильных ответов от общего числа тестовых заданий;

**"не сдано"**

**"2"** - при результате **59%** или менее правильных ответов от общего числа тестовых заданий.

## СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

### Тематическая структура

	стр.
<b>ПМ.01. Осуществление профессионального ухода за пациентами, в том числе по профилю «акушерское дело»</b>	
МДК.01.01. Обеспечение безопасной среды для пациента и персонала	4
МДК.01.02. Осуществление сестринского ухода за пациентами, в том числе по профилю «акушерское дело»	10
<b>ПМ.02. Оказание медицинской помощи в период беременности, родов, послеродового периода с распространенными гинекологическими заболеваниями</b>	
МДК.02.01. Физиологическое акушерство	15
МДК.02.02. Соматические заболевания, отравления и беременность	37
МДК.02.03. Инфекционные заболевания и беременность	45
МДК.02.04. Педиатрия	49
МДК.02.05. Гинекология	68
МДК.02.06. Патологическое акушерство	77
<b>ПМ.03. Осуществление организационной, профилактической работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение</b>	
МДК.03.01. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам	96
МДК.03.02. Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи	98
МДК.03.03. Общественное здоровье и здравоохранение	100
<b>ПМ.04. Оказание медицинской помощи в экстренной форме</b>	
МДК.04.01. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии	103
МДК.04.02. Хирургические болезни	112
МДК.04.03. Реаниматология	114

## СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

### ПМ.01 Осуществление профессионального ухода за пациентами, в том числе по профилю «акушерское дело»

#### МДК.01.01. Обеспечение безопасной среды для пациента и персонала

1. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы классифицируются по уровню своей опасности на

- 5 классов: А, Б, В, Г, Д
- 4 класса: А, Б, В, Г
- 3 класс: А, Б, В
- 2 класса: А, Б

2. Выберите правильный ответ

Класс медицинских отходов, к которому относится разбитый ртутный термометр

- класс Г
- класс Б
- класс В
- класс А

3. Выберите правильный ответ

Класс медицинских отходов, к которому относятся салфетки, загрязненные кровью

- класс Б
- класс А
- класс В
- класс Г

4. Выберите правильный ответ

Класс медицинских отходов, к которому относится бумажная упаковка лекарственного препарата

- класс А
- класс Б
- класс В
- класс Г

5. Выберите правильный ответ

Класс медицинских отходов, помещаемых в контейнеры желтого цвета

- класс Б
- класс А
- класс В
- класс Г

6. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы класса А

- неопасные отходы, которые не имели контакта с биологическими жидкостями больных, с инфекционными больными
- материалы и инструменты, которые были в процессе использования загрязнены выделениями пациентов, в том числе кровью
- все материалы и инструменты, которые имели контакт с пациентами, болеющими особо опасными инфекциями
- отходы, которые по своему химическому составу близки к промышленным отходам

7. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы класса Б

- материалы и инструменты, которые были в процессе использования загрязнены выделениями пациентов, в том числе кровью

неопасные отходы, которые не имели контакта с биологическими жидкостями больных, с инфекционными больными

все материалы и инструменты, которые имели контакт с пациентами, болеющими особо опасными инфекциями

отходы, которые по своему химическому составу близки к промышленным отходам

8. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы класса В

- все материалы и инструменты, которые имели контакт с пациентами, болеющими особо опасными инфекциями
- неопасные отходы, которые не имели контакта с биологическими жидкостями больных, с инфекционными больными

материалы и инструменты, которые были в процессе использования загрязнены выделениями пациентов, в том числе кровью

отходы, которые по своему химическому составу близки к промышленным отходам

9. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы класса Г

- отходы, которые по своему химическому составу близки к промышленным отходам
- неопасные отходы, которые не имели контакта с биологическими жидкостями больных, с инфекционными больными

материалы и инструменты, которые были в процессе использования загрязнены выделениями пациентов, в том числе кровью

все материалы и инструменты, которые имели контакт с пациентами, болеющими особо опасными инфекциями

10. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациента, относятся к медицинским отходам

- класса А
- класса Б
- класса В
- класса Г

11. Выберите правильный ответ

Материалы и инструменты, которые были в процессе использования загрязнены выделениями пациентов, в том числе кровью, относятся к медицинским отходам

- класса Б
- класса В
- класса Г
- класса А

12. Выберите правильный ответ

Одноразовые пакеты для сбора отходов медицинских отходов, относящихся классу Б, должны иметь окраску

- желтую
- красную
- белую
- черную

**13.** Выберите правильный ответ

Одноразовые пакеты для сбора отходов МО, относящихся к классу В, должны иметь окраску

- красную
- черную
- белую
- желтую

**14.** Выберите правильный ответ

При положительной пробе с суданом-3 появляется окрашивание

- жёлтое
- розовое
- бурое
- сине-фиолетовое

**15.** Выберите правильный ответ

Химический метод контроля качества стерилизации (с использованием химических индикаторов) применяется

- при каждом цикле стерилизации
- не реже 2 раз в год
- при запуске нового стерилизатора
- после ремонта

**16.** Выберите правильный ответ

При термическом методе стерилизации без упаковки инструменты хранятся на стерильном столе не более

- 6 часов
- 3 часов
- 12 часов
- 24 часов

**17.** Выберите правильный ответ

Обучение правилам инфекционной безопасности пациентов и их родственников в отделении - это задача

- постовой медсестры
- главной медсестры
- диетсестры
- главного врача

**18.** Выберите правильный ответ

Использование медицинских масок во всех отделениях стационара обязательно

- в период эпидемиологического неблагополучия
- на усмотрение администрации
- на усмотрение эпидемиолога
- постоянно

**19.** Выберите правильный ответ

Индикатором для контроля наличия масляных загрязнений на инструментах является проба

- с суданом-3
- азопирамовая
- амидопириновая
- фенолфталеиновая

**20.** Выберите правильный ответ

К инфекциям, связанным с оказанием медицинской помощи, относят

- внутригоспитальные инфекции
- любое инфекционное заболевание
- любое клинически распознаваемое заболевание, с которым пациент поступил в стационар
- инфекции, передающиеся половым путем

**21.** Выберите правильный ответ

Медицинский персонал меняет одноразовые медицинские маски

- каждые 2 часа
- после каждой манипуляции
- раз в 6 часов
- 1 раз в смену

**22.** Выберите правильный ответ

Медицинский персонал меняет одноразовые медицинские перчатки

- после каждой манипуляции
- при нарушении их целостности
- не меняются, двукратно протираются спиртом
- не меняются, однократно протираются спиртом

**23.** Выберите правильный ответ

Одноразовые медицинские изделия перед утилизацией подвергаются

- дезинфекции
- ополаскиванию проточной водой
- предстерилизационной очистке
- стерилизации

**24.** Выберите правильный ответ

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшей концентрации

- кровь
- спинномозговая жидкость
- слюна
- слезная жидкость

**25.** Выберите правильный ответ

Дезинфекция, проводимая в очаге в присутствии источника инфекции, называется

- текущей
- заключительной
- физической
- профилактической

**26.** Выберите правильный ответ

Стерилизацией называется

- комплекс мероприятий, направленных на уничтожение патогенных и непатогенных микроорганизмов на изделиях медицинского назначения
- система мероприятий, направленных на уничтожение патогенной микрофлоры в окружающей среде
- свод мероприятий, направленный на удаление белковых загрязнений
- блок мероприятий, направленный на удаление всех лекарственных загрязнений

**27.** Выберите правильный ответ

Стерилизация с применением автоклавов относится к методу

- паровому
- воздушному
- химическому

газовому

**28. Выберите правильный ответ**

Термический метод дезинфекции

кипячение

ультрафиолетовое облучение

двукратное протирание дезинфицирующим раствором

погружение в моющий раствор

**29. Выберите правильный ответ**

Действующим нормативным документом для выполнения санитарно-противоэпидемического режима медицинской организации является

СанПиН 3.36.86-21

Трудовой Кодекс РФ

Конституция РФ

Этический Кодекс медицинской сестры России

**30. Выберите правильный ответ**

Целью дезинфекции рук персонала после инфекционного контакта является

профилактика профессионального заражения

обеспечение кратковременной стерильности

создание продолжительной стерильности

удаление бытового загрязнения

**31. Выберите правильный ответ**

Метод стерилизации эндоскопической аппаратуры

химический

физический

паровой

воздушный

**32. Выберите правильный ответ**

Контрольной пробой на наличие крови на инструментах является

азопирамовая

амидопириновая

с суданом-3

с суданом-4

**33. Выберите правильный ответ**

Клизменные наконечники после использования подлежат

дезинфекции

протиранию салфеткой

обработке спиртом

мытью под проточной водой

**34. Выберите правильный ответ**

Обработка кожи при попадании на нее биологической жидкости проводится

70% спиртом

3% раствором перекиси водорода

6% раствором перекиси водорода

96% спиртом

**35. Выберите правильный ответ**

Фактор передачи вирусного гепатита В

препараты крови

руки

пылевые частицы

предметы обихода

**36. Выберите правильный ответ**

Путь передачи ВИЧ-инфекции

половой

алиментарный

воздушно-капельный

трансмиссивный

**37. Выберите правильный ответ**

При попадании биологической жидкости в глаза необходимо промыть глаза

проточной водой

0,05% раствором калия перманганата

0,02% раствором риванола

2% раствором соды

**38. Выберите правильный ответ**

Уничтожение в окружающей человека среде возбудителей инфекционных заболеваний называется

дезинфекцией

дезинсекцией

дератизацией

стерилизацией

**39. Выберите правильный ответ**

Облучение ультрафиолетовыми излучателями для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях относится к методу дезинфекции

физическому

механическому

химическому

комбинированному

**40. Выберите правильный ответ**

Пузырь для льда, грелка дезинфицируются методом

двукратного протирания

полного погружения

однократного протирания

орошения

**41. Выберите правильный ответ**

Кухонку, которую используют для осмотра пациента, необходимо дезинфицировать

двукратным протиранием с интервалом 15 минут после каждого пациента

протиранием после каждого пациента с интервалом 5 минут

в конце смены

протиранием после каждого пациента

**42. Выберите правильный ответ**

После выписки (смерти) пациента постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла) подвергают

камерной дезинфекции

стерилизации

профилактической дезинфекции

очаговой дезинфекции

**43. Выберите правильный ответ**

Чехлы матрасов из полимерной пленки и клеенки после выписки (смерти) пациента дезинфицируют способом

протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства

погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой

двукратного протирания с интервалом 15 минут

камерной дезинфекции

**44.** Выберите правильный ответ

Медицинские термометры дезинфицируют способом

погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой

протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства

двукратного протирания с интервалом 15 минут

камерной дезинфекции

**45.** Выберите правильный ответ

Срок сохранения стерильности изделий зависит от

упаковки

метода стерилизации

вида изделия медицинского назначения

характера манипуляции

**46.** Выберите правильный ответ

Использование одной пары перчаток для ухода за двумя и более пациентами

не допускается

допускается во всех случаях

допускается по решению главной медицинской сестры

отдается на усмотрение персонала

**47.** Выберите правильный ответ

При положительной азопирамовой пробе появляется окрашивание раствора

фиолетовое, переходящее в розово-сиреневое

зелёное, переходящее в фиолетовое

фиолетовое, переходящее в зелёное

синее, переходящее в фиолетовое

**48.** Выберите правильный ответ

Для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

ставят азопирамовую пробу

используют термовременные индикаторы

используют биотесты

делают смывы с различных поверхностей

**49.** Выберите правильный ответ

Количество инструментов для контроля качества предстерилизационной очистки при децентрализованной обработке

1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц

1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену

3 инструмента каждого наименования

5% от одновременно обработанной партии

**50.** Выберите правильный ответ

Фенолфталеиновая проба ставится с целью обнаружения остаточных количеств

моющего средства

крови

жировых загрязнений

лекарственных веществ

**51.** Выберите правильный ответ

Многоразовые медицинские изделия после инвазивных манипуляций подвергаются

дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации

только предстерилизационной очистке

только дезинфекции

только стерилизации

**52.** Выберите правильный ответ

Для стерилизации белья используют стерилизатор

паровой

воздушный

плазменный

газовый

**53.** Выберите правильный ответ

Для мытья рук предпочтительно использовать

жидкое мыло в дозаторе (диспенсере)

индивидуальное мыло

мыльницу с решеткой

губки с моющим раствором

**54.** Выберите правильный ответ

Фактор искусственной передачи внутрибольничной инфекции

медицинские инструменты и оборудование

продукты питания

вода

насекомые

**55.** Выберите правильный ответ

Универсальные меры безопасности акцентируют внимание персонала на

средствах индивидуальной защиты

медикаментах и медицинском оборудовании

пациентах

средствах дезинфекции и стерилизации

**56.** Выберите правильный ответ

«Золотым» стандартом кожных антисептиков являются

спиртовые

водные

гелеобразные

анионные

**57.** Выберите правильный ответ

Гигиеническая обработка рук предусматривает использование

антисептиков (жидкого мыла)

туалетного мыла

мыла, с повышенным содержанием глицерина

специальных косметических средств

**58.** Выберите правильный ответ

Уровни мытья рук зависят от

характера манипуляции

степени загрязнения

вида используемых антисептиков

(дезинфектантов)

наличия перчаток

**59.** Выберите правильный ответ

Самым распространенным резервуаром возбудителей на теле человека являются

руки

мочевыводящие пути

кишечник

кровь

**60.** Выберите правильный ответ

Основой профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, является

- соблюдение медицинским персоналом санитарно-гигиенических норм и правил
- использование дезинфицирующих средств
- сокращение числа инвазивных процедур
- использование технологий уничтожения возбудителей

**61.** Выберите правильный ответ

Получение работником травмы при обращении с медицинскими отходами, потенциально опасной в плане инфицирования, необходимо

- составить акт о несчастном случае на производстве установленной формы
- составить протокол о несчастном случае на производстве произвольной формы
- обратиться к врачу
- обратиться в Управление Роспотребнадзора

**62.** Выберите правильный ответ

Для дезинфекции помещений медицинской организации применяются бактерицидные облучатели

- открытого, закрытого, комбинированного типов
- только закрытого типа
- только открытого типа
- щелевидного типа

**63.** Выберите правильный ответ

Моющий раствор подлежит замене

- при изменении его окраски
- каждые три часа
- при снижении температуры раствора ниже 50 град С
- через сутки

**64.** Выберите правильный ответ

Дезинфекцией называют комплекс мероприятий, направленный на уничтожение

- микроорганизмов
- грызунов
- насекомых
- членистоногих

**65.** Выберите правильный ответ

Свойство дезинфицирующего средства обеспечивать уничтожение грибов

- фунгицидное
- бактерицидное
- вирулицидное
- бактериостатическое

**66.** Выберите правильный ответ

Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивать уничтожение вирусов

- вирулицидное
- бактерицидное
- фунгицидное
- бактериостатическое

**67.** Выберите правильный ответ

Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивать уничтожение бактерий

- бактерицидное

- фунгицидное
- бактериостатическое
- инсектицидное

**68.** Выберите правильный ответ

Свойство препаратов задерживать рост микроорганизмов

- микростатическое
- бактерицидное
- вирулицидное
- спороцидное

**69.** Выберите правильный ответ

Уничтожение на изделиях или в изделиях микроорганизмов всех видов, в том числе споровых форм является целью

- стерилизации
- дезинфекции
- дезинсекции
- дератизации

**70.** Выберите правильный ответ

Механический метод дезинфекции

- протирание
- кипячение
- обжигание
- пастеризация

**71.** Выберите правильный ответ

Физический метод дезинфекции

- кипячение
- протирание
- проветривание
- встряхивание

**72.** Выберите правильный ответ

Резистентные формы микроорганизмов могут возникать при неправильном применении

- антибиотиков, антисептиков и дезинфектантов
- только антибиотиков
- антибиотиков и антисептиков
- дезинфектантов и антисептиков

**73.** Выберите правильный ответ

Асептикой называется

- комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране
- уничтожение болезнетворных микробов
- уничтожение всего живого

**74.** Выберите правильный ответ

Антисептикой называется

- комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме
- комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- уничтожение болезнетворных микробов
- мероприятия по обеззараживанию помещений

**75.** Выберите правильный ответ

Первое место в структуре инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, занимают

- гнойно-септические инфекции
- инфекции кожных покровов
- кишечные инфекции

инфекция мочевыводящих путей

**76. Выберите правильный ответ**

Показания к использованию медицинских перчаток

- асептические процедуры, контакт с кровью и другими биологическими жидкостями
- работа с воздушным стерилизатором
- работа с паровым стерилизатором
- беседа с пациентом

**77. Выберите правильный ответ**

Возможная транспортировка пробирки с кровью в лабораторию

- в закрытом контейнере
- в штативе
- в руках
- в стеклянной банке

**78. Выберите правильный ответ**

Действия акушерки в случае попадания биологической жидкости пациентки на слизистую глаз и носа

- промыть обильно проточной водой
- закапать 1% раствор протаргола
- закапать 1% раствор борной кислоты
- промыть 70% раствором этилового спирта

**79. Выберите правильный ответ**

Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции

- переливание инфицированной крови
- приём пищи из одной посуды
- рукопожатие
- укусы насекомых

**80. Выберите правильный ответ**

Действия акушерки в случае пореза или укола инфицированной иглой

- снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70%-м спиртом, смазать ранку 5%-м спиртовым раствором йода
- снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, раствором фурацилина
- снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой
- снять перчатки, смазать ранку 3%-м раствором перекиси водорода

**81. Выберите правильный ответ**

Действия акушерки в случае попадания хлорсодержащего вещества на кожу

- промыть проточной водой
- обработать 70% этиловым спиртом, обмыть водой с мылом и повторно обработать 70% спиртом
- дважды обработать 1% раствором борной кислоты
- однократно обработать 3% раствором перекиси водорода

**82. Выберите правильный ответ**

Действия акушерки в случае разбивания ртутного термометра - собрать ртуть

- грушевидным баллоном и поместить в герметичную емкость
- грушевидным баллоном и вылить в раковину
- пылесосом и выбросить в мусорный контейнер

влажным тампоном и выбросить в мусорный контейнер

**83. Выберите правильный ответ**

Мероприятия по уничтожению патогенных микроорганизмов в окружающей среде

- дезинфекция
- дезинсекция
- дератизация
- стерилизация

**84. Выберите правильный ответ**

Цель проводимых мероприятий по соблюдению асептики

- предупреждение попадания патогенных микроорганизмов в рану
- уничтожение патогенных микроорганизмов в окружающей среде
- уничтожение патогенных микроорганизмов в ране
- уничтожение насекомых – переносчиков инфекции

**85. Выберите правильный ответ**

Механический способ дезинфекции

- проветривание
- кварцевание
- обжигание
- кипячение

**86. Выберите правильный ответ**

Физический метод дезинфекции

- использование ультрафиолетового излучения
- протирание влажной ветошью
- проветривание
- использование дезинфицирующих растворов

**87. Выберите правильный ответ**

Вид комбинированной дезинфекции

- влажная уборка с последующим кварцеванием и проветриванием
- протирание влажной ветошью
- замачивание в дезинфицирующем растворе с последующим промыванием водой
- кварцевание

**88. Выберите правильный ответ**

Цель гигиенической обработки рук медицинского персонала

- профилактика профессионального заражения
- обеспечение кратковременной стерильности
- создание кратковременной стерильности
- удаление бытового загрязнения

**89. Выберите правильный ответ**

Показание для проведения обработки рук на гигиеническом уровне

- перед инвазивными процедурами
- перед и после приема пищи
- при бытовом загрязнении рук
- после посещения туалета

**90. Выберите правильный ответ**

Кратность обработки рук акушерки

- в начале и в конце процедуры
- перед процедурой
- после всех процедур

после нескольких процедур  
**91.** Выберите правильный ответ  
Продукт питания, запрещенный для передачи пациенткам в акушерском стационаре

- копченая колбаса  
 яблоки  
 печенье  
 сгущенное молоко

**92.** Выберите правильный ответ  
Концентрация этилового спирта, применяемого для обработки кожи пациентки (в %)

- 70  
 96  
 80  
 40

**93.** Выберите правильный ответ  
Срок использования маски в процедурном кабинете (час)

- 3  
 4  
 6  
 1

**94.** Выберите правильный ответ  
Форма медицинской документации, оформляемая в случае выявления педикулеза

- экстренное извещение  
 статистическая карта  
 выписка из истории болезни  
 статистический талон

**95.** Выберите правильный ответ  
Вид обработки педикулеза, выявленного у беременной пациентки

- механическая  
 химическая  
 физическая  
 комбинированная

**96.** Выберите правильный ответ  
Действия после использования инфузионной системы

- дезинфицировать и утилизировать  
 поместить в герметичный контейнер  
 сдать старшей медсестре  
 сдать в ЦСО

**97.** Выберите правильный ответ  
Маркировка емкости с дезинфицирующим раствором  
 название дезинфицирующего средства, его концентрация, дата разведения

название дезинфицирующего средства, его концентрация, количество  
 название дезинфицирующего средства  
 дата разведения

**98.** Выберите правильный ответ  
Полное уничтожение микробов и их спор на предметах медицинского назначения

- стерилизация  
 дезинфекция  
 дезинсекция  
 дератизация

**99.** Выберите правильный ответ  
Концентрация раствора перекиси водорода для стерилизации инструментов (%)

- 6  
 4  
 3  
 1

**100.** Выберите правильный ответ  
Температура моющего раствора при предстерилизационной очистке (град С)

- 45-50  
 55-65  
 25-35  
 18-20

**101.** Выберите правильный ответ  
Цель проведения фенолфталеиновой пробы

- определение остатков моющего средства  
 определение остатков масляного раствора  
 определение остатков крови  
 определение остатков лекарственного средства

**102.** Выберите правильный ответ  
Проба для проверки инструментария на наличие скрытой крови

- азопирамовая  
 бензидиновая  
 фенолфталеиновая  
 бензойная

**103.** Выберите правильный ответ  
Кратность закрытия родильного дома для проведения плановой дезинфекции и косметического ремонта

- 1 раз в год  
 1 раз в 2 года  
 2 раза в год  
 3 раза в год

#### **МДК.01.02. Осуществление сестринского ухода за пациентами, в том числе по профилю «акушерское дело»**

**104.** Выберите правильный ответ  
Перемещение пациентки в постели через каждые 2 часа обеспечивает

- профилактику пролежней  
 мероприятия по уходу  
 нагрузку на позвоночник  
 профилактику опрелостей

**105.** Выберите правильный ответ

Функциональное положение, придаваемое пациентке при обмороке или коллапсе  
 лежа на спине без подушки с приподнятыми ногами  
 лежа на животе  
 промежуточное полулежа/полусидя  
 промежуточное – лежа на боку/лежа на животе

**106.** Выберите правильный ответ

Способ транспортировки пациентки в бессознательном состоянии

- на каталке лежа на боку
- на кресле-каталке сидя
- на каталке лежа на спине
- всеми перечисленными способами

**107.** Выберите правильный ответ

Режим двигательной активности, разрешающий дозированную ходьбу в пределах палаты

- палатный
- строгий постельный
- постельный
- общий

**108.** Выберите правильный ответ

Режим двигательной активности, разрешающий свободное перемещение в пределах учреждения здравоохранения

- общий
- строгий постельный
- постельный
- палатный

**109.** Выберите правильный ответ

Фактор агрессии больничной среды, который может привести к заражению

- инфекционный
- токсический
- физический
- психологический

**110.** Выберите правильный ответ

Антропометрическое исследование

- определение массы тела
- измерение температуры тела
- подсчет частоты пульса
- измерение артериального давления

**111.** Выберите правильный ответ

Антропометрическое исследование

- измерение роста
- измерение температуры тела
- оценка тяжести состояния пациента
- измерение артериального давления

**112.** Выберите правильный ответ

Апноэ – это

- остановка дыхания
- учащение дыхания
- урежение дыхания
- нарушение ритма дыхания

**113.** Выберите правильный ответ

Нитевидный пульс – это

- пустой по наполнению, мягкий по напряжению
- пустой по наполнению, твердый по напряжению
- полный по наполнению, мягкий по напряжению
- полный по наполнению, твердый по напряжению

**114.** Выберите правильный ответ

Артериальное давление выше 140/90 мм.рт.ст.

- гипертензия
- гипотензия
- тахикардия

брадикардия

**115.** Выберите правильный ответ

Артериальное давление 80/50 мм.рт.ст.

- гипотензия
- тахикардия
- гипертензия
- брадикардия

**116.** Выберите правильный ответ

Количество выделенной мочи за определенный промежуток времени

- диурез
- дизурия
- диспепсия
- диспноэ

**117.** Выберите правильный ответ

Соотношение количества потребленной и выделенной за сутки жидкости

- водный баланс
- энурез
- отеки
- диурез

**118.** Выберите правильный ответ

Продолжительность измерения температуры тела в подмышечной впадине (мин)

- 5
- 1
- 2-3
- 20

**119.** Выберите правильный ответ

Субфебрильная температура тела (град С)

- 37,1-38,0
- 38,1-39,0
- 39,1-41,0
- выше 41,0

**120.** Выберите правильный ответ

Фебрильная температура тела (град С)

- 38,1-39,0
- 37,1-38,0
- 39,1-41,0
- выше 41,0

**121.** Выберите правильный ответ

Возможное осложнение критического снижения температуры

- коллапс
- обморок
- удушье
- гипертонический криз

**122.** Выберите правильный ответ

Постепенное снижение температуры тела при лихорадке

- лизис
- гипертермия
- гипотермия
- кризис

**123.** Выберите правильный ответ

Кратность измерения температуры тела у пациентов в стационаре в течение суток

- 2
- 3

- 4  
 1
- 124.** Выберите правильный ответ  
Условия хранения чистых медицинских термометров
- в сухом виде  
 в 3% растворе перекиси водорода  
 в 3% растворе хлорамина  
 в дистиллированной воде
- 125.** Выберите правильный ответ  
Кратность смены постельного белья тяжелобольной пациентке
- по мере загрязнения  
 ежедневно  
 1 раз в 3 дня  
 1 раз в 2 недели
- 126.** Выберите правильный ответ  
Направление тампона при протирании ресниц и век пациентки
- от наружного угла глаза к внутреннему углу  
 от внутреннего угла глаза к наружному  
 снизу вверх  
 круговым движением
- 127.** Выберите правильный ответ  
Признак пролежня второй стадии
- пузырь  
 отек, краснота  
 бледность  
 язва
- 128.** Выберите правильный ответ  
Признак пролежня первой стадии
- отек, краснота  
 бледность  
 пузырь  
 язва
- 129.** Выберите правильный ответ  
Признак пролежня третьей стадии
- язва  
 отек, краснота  
 пузырь  
 поражение кожи и глубжележащих тканей
- 130.** Выберите правильный ответ  
Места образования пролежней при положении пациентки на спине
- область крестца, пятки, лопатки, затылок  
 область тазобедренного сустава (большого вертела), лодыжки  
 ребра, колени, гребни подвздошных костей, пальцы ног  
 седалищные бугры и ягодицы, стопы
- 131.** Выберите правильный ответ  
Места вероятного образования пролежней
- остистые отростки позвонков  
 паховые области  
 подмышечные впадины  
 паховые области
- 132.** Выберите правильный ответ  
Места образования пролежней при положении пациента на животе
- ребра, колени, гребни подвздошных костей, пальцы ног  
 область тазобедренного сустава (большого вертела), лодыжки  
 седалищные бугры и ягодицы, стопы  
 область крестца, пятки, лопатки, затылок
- 133.** Выберите правильный ответ  
Места образования пролежней при положении пациента сидя
- седалищные бугры и ягодицы, стопы  
 область тазобедренного сустава (большого вертела), лодыжки  
 ребра, колени, гребни подвздошных костей, пальцы ног  
 область крестца, пятки, лопатки, затылок
- 134.** Выберите правильный ответ  
Мероприятия по профилактике пролежней у обездвиженной пациентки
- смена положения тела через каждые 2 часа  
 лечебная физкультура  
 умывание  
 высококалорийный рацион питания
- 135.** Выберите правильный ответ  
Кратность смены положения тела пациентки с целью профилактики пролежней
- через каждые 2 часа  
 через каждые 6 часов  
 не имеет значения  
 2-3 раза в день
- 136.** Выберите правильный ответ  
Кратность составления порционного требования на питание
- ежедневно  
 1 раз в неделю  
 2 раза в неделю  
 1 раз при поступлении пациента
- 137.** Выберите правильный ответ  
Одна из рекомендаций по диетическому питанию при запоре
- употребление продуктов, содержащих клетчатку  
 приём пищи 2 раза в день  
 ограничение жидкости  
 употребление легкоусвояемых продуктов
- 138.** Выберите правильный ответ  
Одна из рекомендаций по питанию при лихорадке
- увеличение принимаемой жидкости  
 увеличение в рационе мясных блюд  
 ограничение принимаемой жидкости  
 ограничение соли
- 139.** Выберите правильный ответ  
Цель назначения низкокалорийной диеты
- уменьшение массы тела  
 стимуляция синтеза белка  
 выведение азотистых шлаков  
 нормализация секреции пищеварительного тракта
- 140.** Выберите правильный ответ

Для искусственного кормления пациентки используется

- тонкий желудочный зонд
- катетер
- поильник
- десертная ложка

**141.** Выберите правильный ответ

Температура воды в грелке для лиц с чувствительной кожей (град С)

- 40-45
- 15
- 100
- 60

**142.** Выберите правильный ответ

Показание для применения пузыря со льдом

- кровотечение
- 1-ый период лихорадки
- переохлаждение
- приступ почечной колики

**143.** Выберите правильный ответ

Показание для оксигенотерапии

- одышка, удушье
- озноб
- желудочное кровотечение
- тромбоз

**144.** Выберите правильный ответ

Цвет кислородного баллона

- синий
- желтый
- красный
- белый

**145.** Выберите правильный ответ

Цель увлажнения кислорода при проведении оксигенотерапии

- предотвращение пересыхания слизистых оболочек дыхательных путей
- пеногашение
- уменьшение влажности слизистых оболочек дыхательных путей
- понижение давления

**146.** Выберите правильный ответ

Возможный способ применения суппозитория

- ректально
- инъекционно
- наружно
- ингаляционно

**147.** Выберите правильный ответ

Ректальный способ введения лекарств в организм

- через прямую кишку
- через дыхательные пути
- инъекционно
- под язык

**148.** Выберите правильный ответ

Наружный способ применения лекарственных средств

- на кожу или слизистые
- через прямую кишку
- внутривенно
- через рот

**149.** Выберите правильный ответ

Возможное осложнение при внутримышечной инъекции

- инфильтрат
- воздушная эмболия
- флебит
- кровотечение

**150.** Выберите правильный ответ

Осложнение инъекции из-за нарушения асептики

- абсцесс
- воздушная эмболия
- анафилаксия
- гематома

**151.** Выберите правильный ответ

Осложнение при попадании масляного раствора в кровеносный сосуд

- эмболия
- флебит
- некроз
- инфильтрат

**152.** Выберите правильный ответ

Место для постановки внутримышечной инъекции

- верхний наружный квадрант ягодицы
- предплечье
- передняя брюшная стенка
- подлопаточная область

**153.** Выберите правильный ответ

Место для постановки внутривенной инъекции

- область локтевого сгиба
- внутренняя поверхность предплечья
- наружная поверхность плеча
- верхненаружный квадрант ягодицы

**154.** Выберите правильный ответ

Инъекция, при которой наиболее вероятно воздушная эмболия

- внутривенная
- внутримышечная
- внутривенная
- подкожная

**155.** Выберите правильный ответ

Препарат, используемый для разведения антибиотиков

- 0,5% раствор новокаина
- 10% раствор хлорида натрия
- 5 % раствор глюкозы
- 40% раствор глюкозы

**156.** Выберите правильный ответ

Показание для проведения катетеризации мочевого пузыря

- острая задержка мочи
- травма мочевого пузыря
- инфекция мочевых путей
- гематурия

**157.** Выберите правильный ответ

Кратность сбора суточной мочи по методу Зимницкого

- восьмикратно
- двукратно
- пятикратно

однократно

**158.** Выберите правильный ответ

Черный дегтеобразный стул является признаком

кровотечения

гельминтоза

диареи

токсикоинфекции

**159.** Выберите правильный ответ

Биологический материал, собираемый при соскобе на энтеробиоз

содержимое с перианальных складок

кал

фрагменты тканей пациента

моча

**160.** Выберите правильный ответ

Положение Фаулера предполагает размещение пациента в постели

полулежа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов

на боку, руки согнуты в локтевых суставах

полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов

промежуточное положение между положением лежа на боку и лежа на животе

**161.** Выберите правильный ответ

Пульс чаще всего исследуют на

лучевой и сонной артерии

локтевой артерии и аорте

брюшной аорте и мозговой артерии

подколенной артерии

**162.** Выберите правильный ответ

Температуру тела у пациентов измеряют

утром (с 7 до 9 час) и вечером (с 17 до 19 час)

раз в день с 12 до 13 часов

сразу после завтрака

перед сном

**163.** Выберите правильный ответ

Мероприятие, проводимое перед постановкой лечебной клизмы

очистительная клизма

капельная клизма

промывание желудка

гипертоническая клизма

**164.** Выберите правильный ответ

Анализ мочи на суточную глюкозурию собирается в

течение суток в одну емкость

стерильную пробирку

течение 10 часов в одну емкость

течение суток, 8 банок, каждые 3 часа

**165.** Выберите правильный ответ

Глюкометр используется для измерения уровня

глюкозы в крови

глюкозы в моче

кетоновых тел в моче

глюкозы в пищевых продуктах

**166.** Выберите правильный ответ

Показанием для введения газоотводной трубки является

метеоризм

запор

непроходимость кишечника

операция

**167.** Выберите правильный ответ

Перед введением катетера в мочевого пузыря необходимо обработать область уретры

антисептическим раствором

5% раствором перманганата калия

0,5% раствором хлорамина

раствором йода

**168.** Выберите правильный ответ

Катетер перед введением в мочевого пузыря необходимо смочить

стерильным глицерином

70% раствором спирта

раствором фурацилина

раствором хлоргексидина

**169.** Выберите правильный ответ

Температура воды для подмывания новорожденного (градусов С)

36-37

30-34

40-42

25-28

**170.** Выберите правильный ответ

Стерильный масляный раствор перед инъекцией подогревают до (градусов С)

38

40

34

28

**171.** Выберите правильный ответ

Пульсовое давление представляет собой

разницу между систолическим и диастолическим давлением

сумму систолического и диастолического давления

частоту сердечных сокращений

давление, возникающее в артериях в момент максимального подъема пульсовой волны после систолы желудочков

**172.** Выберите правильный ответ

Суточным диурезом называется

общее количество мочи, выделенной пациентом в течение суток

процесс образования и выделения мочи

общее количество введенной в организм жидкости за сутки

соотношение между количеством введенной в организм жидкости и количеством выделенной жидкости из организма в течение суток

**173.** Выберите правильный ответ

Суточный диурез у взрослых в норме составляет

от 800 мл до 1500 мл

от 200 мл до 500 мл

от 500 мл до 800 мл

от 2000 мл до 3000 мл

**174.** Выберите правильный ответ

Интенсивность боли акушерка может определить с помощью

- специальной шкалы
- опроса пациента
- визуального наблюдения
- пальпации и перкуссии

**175.** Выберите правильный ответ

При транспортировке пациента в кресле-каталке представляет опасность нахождения рук

- за пределами подлокотников
- на животе
- в скрещенном состоянии на груди
- на подлокотниках

**176.** Выберите правильный ответ

Наиболее частым осложнением катетеризации является

- повреждение слизистой оболочки мочеиспускательного канала
- недержание мочи
- инфицирование мочевыводящих путей
- задержка мочи

**177.** Выберите правильный ответ

Критическое снижение температуры тела может привести к развитию

- коллапса
- кишечной непроходимости
- острого коронарного синдрома
- острой дыхательной недостаточности

**178.** Выберите правильный ответ

При сборе мокроты на общий анализ пациента необходимо обеспечить

- сухой банкой
- сухой пробиркой

- стерильной пробиркой
- стерильной банкой

**179.** Выберите правильный ответ

Максимальное пребывание роженицы в приёмном отделении при удовлетворительном состоянии

- 30 минут
- 10-15 минут
- 1 час
- 2 часа

**180.** Выберите правильный ответ

При обнаружении лиц с педикулёзом при поступлении в родильный дом проводится

- санобработка+дезинфекция нательного белья+направление на роды в обсервационное отделение
- санобработка+дезинфекция нательного белья
- санитарная обработка
- мытьё головы

**181.** Выберите правильный ответ

Внутрибольничная инфекция развивается при наличии

- источника инфекции+фактора передачи+восприимчивого человека
- источника инфекции+восприимчивого человека
- источника инфекции
- внутрибольничная инфекция отсутствует

**182.** Выберите правильный ответ

Постельное бельё в послеродовом отделении меняют

- каждые 3 дня
- 2 раза в день
- 1 раз в неделю
- 1 раз в 5 дней

## **ПМ.02. Оказание медицинской помощи в период беременности, родов, послеродового периода с распространёнными гинекологическими заболеваниями**

### **МДК.02.01. Физиологическое акушерство**

**183.** Выберите правильный ответ

Выслушивание сердцебиения плода проводится в первый период родов каждые

- 2 часа в течение одной полной минуты перед схваткой
- 15-30 минут в течение одной полной минуты
- 50-60 минут в течение одной полной минуты
- 1,5 часа после окончания схватки

**184.** Выберите правильный ответ

Запись дневников в истории родов каждые

- 3 часа
- 5 часов
- 1,5 часа
- 4 часа

**185.** Выберите правильный ответ

Внутреннее акушерское исследование в первом периоде родов проводится

- не реже 1 раза в 4 часа
- каждые 3 часа
- через 2 часа

- через 8 часов

**186.** Выберите правильный ответ

Акушерка родового блока должна находиться непосредственно с роженицей в 1-ом периоде родов каждые

- 15-30 минут
- 45-60 минут
- 2 часа
- 4 часа

**187.** Выберите правильный ответ

Акушерка родового блока должна находиться непосредственно с роженицей: в конце 1-ого периода, во 2-ом и в 3-ем периодах родов

- постоянно
- каждые 45-60 минут
- каждые 2 часа
- каждые 4 часа

**188.** Выберите правильный ответ

При излитии околоплодных вод при не прижатой головке рекомендуется положение роженицы

- на боку
- на спине
- на животе
- сидя

**189.** Выберите правильный ответ

Контроль мочеиспускания роженицы в первом периоде родов проводится

- каждые 2-3 часа
- через 5 часов
- каждые 30 минут
- каждый час

**190.** Выберите правильный ответ

Латентная фаза родов характеризуется

- регулярной родовой деятельностью, которая приводит к сглаживанию шейки матки и раскрытию маточного зева до 5 см
- «зрелой» шейкой матки
- активными потугами
- признаками организма к родам

**191.** Выберите правильный ответ

Активную фазу родов характеризует

- раскрытие маточного зева до 10-12 см
- сглаживание шейки матки и раскрытие маточного зева до 3 см
- рождение головки плода
- врезывание головки плода

**192.** Выберите правильный ответ

Выслушивание сердцебиения плода в потужном периоде проводят

- после каждой потуги
- через 3 потуги
- не выслушивается
- через 10 минут

**193.** Выберите правильный ответ

Средняя длительность второго периода родов у первородящих

- 3 часа
- 30 минут
- 4 часа
- 50-60 минут

**194.** Выберите правильный ответ

Средняя длительность второго периода родов у повторнородящих

- 2 часа
- 30 минут
- 3 часа
- 45 минут

**195.** Выберите правильный ответ

Максимально второй период родов у первородящих длится

- 4 часа
- 30 минут
- 2 часа
- 50-60 минут

**196.** Выберите правильный ответ

Максимально второй период родов у повторнородящих длится

- 3 часа
- 30 минут
- 4 часа
- 50-60 минут

**197.** Выберите правильный ответ

Головка плода прорезалась - это

- состояние, при котором головка плода не скрывается в родовом канале
- появление головки из половой щели во время потуги, вне потуги головка уходит
- рождение головки
- внутренний поворот головки

**198.** Выберите правильный ответ

Второй период родов может осложниться

- родовой травмой и гипоксией плода
- разрывом шейки матки
- преждевременным излитием околоплодных вод
- тазовым предлежанием плода

**199.** Выберите правильный ответ

Показания для амниотомии в родах

- многоводие
- преждевременные роды
- поперечное положение плода
- анатомически узкий таз

**200.** Выберите правильный ответ

Амниотомию в родах проводят при

- плоском плодном пузыре
- своевременных родах
- косом положении плода
- тазовом предлежании плода

**201.** Выберите правильный ответ

Вскрытие плодного пузыря предусмотрено при

- родовозбуждении и родостимуляции
- головном предлежании плода
- открытии шейки матки на 6 см
- продольном положении плода

**202.** Выберите правильный ответ

Преждевременное излитие околоплодных вод

- до начала родовой деятельности
- в конце периода раскрытия
- при открытии маточного зева на 7 см
- в начале потужного периода

**203.** Выберите правильный ответ

Раннее излитие околоплодных вод

- при раскрытии шейки матки менее чем на 6 см
- до начала схваток
- при появлении нерегулярных схваток
- при появлении потуг

**204.** Выберите правильный ответ

Цель влагалищного исследования в родах

- оценка состояния шейки матки
- оценка степени зрелости плода
- определение пола ребёнка
- диагностика аднексита

**205.** Выберите правильный ответ

При влагалищном исследовании в родах проводят

- определение наличия и функции плодного пузыря
- определение места прикрепления плаценты
- определение величины матки
- оценка зрелости плода

**206.** Выберите правильный ответ

Цель влагалищного исследования в родах

- уточнение предлежащей части плода
- для диагностики гипоксии плода
- уточнение срока беременности
- для уточнения членорасположения плода

**207.** Выберите правильный ответ

Влагалищное исследование в родах проводится

- при поступлении роженицы в стационар
- при постановке на учёт в женской консультации
- по просьбе роженицы
- в динамике через каждые 2-3 часа

**208.** Выберите правильный ответ

Показания для экстренного влагалищного исследования в родах

- излитие околоплодных вод
- определение раскрытия шейки матки в динамике
- диагностика признаков отделения плаценты
- диагностика гипоксии плода

**209.** Выберите правильный ответ

Показания для экстренного влагалищного исследования в родах

- появление кровянистых выделений
- уточнение функции плодного пузыря
- врезывание головки плода
- третий период родов

**210.** Выберите правильный ответ

Последовательность раскрытия шейки матки у повторнородящих женщин

- укорочение и сглаживание шейки матки происходит одновременно
- раскрытие внутреннего зева, сглаживание шейки матки, раскрытие наружного зева
- раскрытие наружного зева, сглаживание шейки матки, раскрытие внутреннего зева
- сглаживание шейки матки, раскрытие наружного зева

**211.** Выберите правильный ответ

На эффективность родовой деятельности влияет

- сила сокращений миометрия
- пол плода
- предлежание плода
- паритет

**212.** Выберите правильный ответ

На эффективность родовой деятельности влияет

- наличие полноценного плодного пузыря
- предлежание плода
- позиция плода

- паритет

**213.** Выберите правильный ответ

Второй момент биомеханизма родов при переднем виде затылочного предлежания

- внутренний поворот головки затылком кпереди
- внутренний поворот головки затылком кзади
- сгибание головки
- разгибание головки

**214.** Выберите правильный ответ

Размер, в котором устанавливается стреловидный шов на тазовом дне

- прямой
- поперечный
- правый косой
- левый косой

**215.** Выберите правильный ответ

Акушерское пособие при рождении туловища плода

- двумя руками обхватывают грудную клетку плода и направляют ее вверх
- двумя руками обхватывают головку плода и направляют её вверх
- двумя руками обхватывают грудную клетку плода и направляют её вниз
- двумя руками обхватывают головку плода и направляют её вниз

**215.** Выберите правильный ответ

Плечевой пояс плода прорезывается в размере таза

- прямо
- поперечном
- правом косом
- левом косом

**217.** Выберите правильный ответ

Партограммой следует считать

- графическое изображение течения родов
- регистрацию скорости раскрытия шейки матки
- регистрацию движений плода по родовому каналу
- регистрацию сердцебиения плода

**218.** Выберите правильный ответ

Ведение партограммы акушеркой в родах осуществляется с регистрацией следующих показателей

- сократительной активности матки, динамики раскрытия маточного зева
- высоты стояния дна матки
- окружности живота
- осмотра шейки матки на зеркалах

**219.** Выберите правильный ответ

Ведение партограммы акушеркой в родах осуществляется с регистрацией следующих показателей

- частоты сердечных сокращений плода, характера околоплодных вод
- частоты движений плода
- количества теряемых околоплодных вод

- отхождение слизистой пробки из влагалища

**220.** Выберите правильный ответ

Удлинение наружного отрезка пуповины на 10 см называется признаком отделения последа

- Альфельда  
 Шредера  
 Кюстнера-Чукалова  
 Клейна

**221.** Выберите правильный ответ

При надавливании ребром ладони над лоном отрезок пуповины не втягивается – признак отделения последа

- Кюстнера-Чукалова  
 Альфельда  
 Шредера  
 Клейна

**222.** Выберите правильный ответ

Своевременные роды

- роды в сроке 37 недель 1 день - 41 неделя и 6 дней гестации  
 роды в 38-42 недели  
 роды в 36-37 недель  
 роды в 41-42 недели

**223.** Выберите правильный ответ

Определение срока родов

- первый день последней менструации +7 дней - 3 календарных месяца  
 первый день последней менструации -3 месяца  
 последний день последней менструации+10 дней - 2 месяца  
 первый день последней менструации+7 дней+3 месяца

**224.** Выберите правильный ответ

Для проверки признака отделения последа по методу Шредера следует

- визуально определить изменение формы и высоты стояния дна матки  
 надавить ребром ладони над лобком  
 проверить пульсацию сосудов пуповины  
 предложить роженице подышать

**225.** Выберите правильный ответ

При наличии положительных признаков отделения последа первым делом нужно

- предложить женщине потужиться  
 ввести сокращающие средства  
 потянуть за пуповину  
 надавить на матку в области углов

**226.** Выберите правильный ответ

Тактика ведения последового периода определяется

- наличием признаков отделения плаценты  
 длительностью родов  
 состоянием новорожденного  
 длительностью безводного периода

**227.** Выберите правильный ответ

Главный принцип в работе акушерки

- обеспечение безопасности материнства и соблюдение прав пациента

- забота об имидже акушерки  
 выполнение всех желаний роженицы  
 внедрение хозрасчета и расширение сферы услуг

**228.** Выберите правильный ответ

Принципы работы женской консультации изложены в приказе

- МЗ РФ от 20.10.2020 г. №1130н  
 МЗ СССР от 09.01.1986 г. №55  
 МЗ РФ от 10.02.2003 г. №50  
 МЗ РФ от 26.11.1997 г. №345

**229.** Выберите правильный ответ

Приказ №1130н МЗ РФ от 20.10.2020 г. регламентирует

- порядок оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология  
 работу детской поликлиники  
 работу поликлиники  
 работу станции скорой помощи

**230.** Выберите правильный ответ

Принципы организации работы родильных домов содержатся в приказе

- №1130н МЗ РФ от 20.10.2020 г.  
 №50 МЗ РФ от 10.02.2003 г.  
 №55 МЗ СССР от 09.01.1986 г.  
 №345 МЗ РФ от 26.11.1997 г.

**231.** Выберите правильный ответ

Наружные размеры нормального таза

- 25-28-31-21  
 23-25-28-18  
 25-28-31-18  
 28-28-32-17

**232.** Выберите правильный ответ

Истинная конъюгата нормального таза

- 11 см  
 9 см  
 13 см  
 21 см

**233.** Выберите правильный ответ

Диагональная конъюгата нормального таза

- 12,5-13 см  
 9 см  
 11 см  
 21 см

**234.** Выберите правильный ответ

Расстояние между нижним краем симфиза и наиболее выдающейся точкой мыса называется конъюгатой

- диагональной  
 истинной  
 наружной  
 анатомической

**235.** Выберите правильный ответ

Расстояние между верхним краем симфиза и верхним углом ромба Михаэлиса

- наружная конъюгата
- индекс Соловьева
- дистанция кристарум
- истинная конъюгата

**236.** Выберите правильный ответ

Для вычисления истинной конъюгаты нужно

- от диагональной конъюгаты отнять 1,5-2 см
- от наружной конъюгаты отнять 1,5-2 см
- к диагональной конъюгате прибавить 1,5-2 см
- от диагональной конъюгаты отнять 9 см

**237.** Выберите правильный ответ

При измерении наружной конъюгаты таза женщина лежит на

- боку с согнутой нижележащей ногой
- спине с вытянутыми ногами
- спине с согнутыми ногами
- боку с согнутой вышележащей ногой

**238.** Выберите правильный ответ

Заболевания и функциональные расстройства плода, возникающие позже трех месяцев беременности

- фетопатии
- гаметопатии
- эмбриопатии
- зиготопатии

**239.** Выберите правильный ответ

Эмбриопатии возникают под влиянием повреждающих факторов

- до 8 недель беременности
- на любом сроке беременности
- после 30 недель беременности
- от 16 до 28 недель беременности

**240.** Выберите правильный ответ

Тошнота является признаком беременности

- сомнительным
- достоверным
- вероятным
- обязательным

**241.** Выберите правильный ответ

Вероятный признак беременности

- отсутствие менструации
- слюнотечение
- рвота
- вкусовые прихоти

**242.** Выберите правильный ответ

Достоверный признак беременности

- выслушивание сердцебиения плода
- увеличение матки
- задержка месячных
- увеличение молочных желез

**243.** Выберите правильный ответ

Диагностическая проба на беременность основана на выявлении

- хорионического гонадотропина

- ацетона
- белка
- лейкоцитов

**244.** Выберите правильный ответ

Оптимальная прибавка массы беременной за 1 неделю на

- 350 г
- 30 г
- 50 г
- 700 г

**245.** Выберите правильный ответ

Свертывающие свойства крови к концу нормальной беременности

- повышены
- понижены
- не изменены
- можно не учитывать для прогноза родов

**246.** Выберите правильный ответ

Влагалищное исследование у здоровой беременной в женской консультации производится

- однократно при постановке на учет
- при каждой явке в женскую консультацию
- 1 раз за триместр
- 1 раз в месяц для оценки динамики изменений

**247.** Выберите правильный ответ

Осмотр в зеркалах и взятие мазков для исследования влагалищной флоры у здоровой беременной проводят в женской консультации

- дважды за беременность
- однократно при постановке на учет
- при каждой явке в женскую консультацию
- только при наличии жалоб

**248.** Выберите правильный ответ

Анализ мочи для обследования беременной в женской консультации назначается

- к каждой явке
- трижды за беременность
- только при наличии дизурических явлений
- раз в 1-2 месяца

**249.** Выберите правильный ответ

В каждой женской консультации должен быть консультант

- юрист
- невропатолог
- гематолог
- хирург

**250.** Выберите правильный ответ

Терапевт женской консультации обслуживает

- беременных без признаков респираторной инфекции и гриппа амбулаторно
- всех беременных и гинекологических больных
- все население района
- беременных с температурой на дому

**251.** Выберите правильный ответ

Каждая беременная должна не менее двух раз посетить

- терапевта и стоматолога
- дерматовенеролога
- юриста
- хирурга

**252.** Выберите правильный ответ

Каждая беременная должна не менее одного раза посетить

- отоларинголога, офтальмолога
- дерматовенеролога
- хирурга
- терапевта

**253.** Выберите правильный ответ

Каждая беременная должна посетить

отоларинголога и офтальмолога на сроке

не позднее 7-10 дней после первичного обращения

- 7-8 недель беременности
- 30 недель беременности
- 12 недель беременности

**254.** Выберите правильный ответ

Трижды за беременность каждая здоровая женщина сдает

- кровь на гемоглобин, СОЭ и лейкоцитоз
- кровь на группу и резус-фактор
- мазки на скрытые инфекции
- мазки на гормональный фон

**255.** Выберите правильный ответ

Во время беременности женщина должна быть осмотрена врачом акушером-гинекологом

- не менее 7 раз
- 1 раз в месяц
- каждую неделю
- 2 раза в месяц

**256.** Выберите правильный ответ

Типичные жалобы у беременной в 1 триместре

- тошнота и изменение вкуса
- головные боли и ухудшение зрения
- шевеление плода
- отеки

**257.** Выберите правильный ответ

Осмотр окулиста во время беременности

необходим всем для оценки зрения и состояния сосудов глазного дна

- обязателен только для только женщин с конъюнктивитом
- обязателен только для женщин после оперативной коррекции зрения
- не обязателен

**258.** Выберите правильный ответ

Флюорография легких у беременных

- не показана при желанной беременности
- назначается однократно при постановке на учет
- проводится в 1 и 2 половине беременности
- назначается трижды за беременность

**259.** Выберите правильный ответ

Для определения даты родов по формуле Негеле нужно от даты начала последних менструаций

- отнять 3 месяца и прибавить 7-10 дней
- отнять 3 месяца
- отнять 4 месяца
- отнять 4 месяца и прибавить 7-10 дней

**260.** Выберите правильный ответ

Повторнородящие женщины начинают ощущать шевеление плода с

- 18 недель
- 8 недель
- 12 недель
- 22 недель

**261.** Выберите правильный ответ

Срок беременности, начиная с которого

сердцебиение плода можно выслушать акушерским стетоскопом

- 22 недели
- 12 недель
- 18 недель
- 28 недель

**262.** Выберите правильный ответ

Срок беременности, начиная с которого можно

пропальпировать головку плода через брюшную стенку

- 24 недели
- 12 недель
- 18 недель
- 30 недель

**263.** Выберите правильный ответ

Для определения массы внутриутробного плода по методу Жордания необходимо

- умножить высоту стояния дна матки на окружность живота
- перемножить полуокружность живота и длину плода
- разделить окружность живота на высоту стояния дна матки
- от длины окружности живота отнять высоту стояния дна матки

**264.** Выберите правильный ответ

На каждом приеме беременной в женской

консультации в первом триместре необходимо

- взвешивание
- проведение пельвеометрии
- выслушивание сердцебиение плода стетоскопом
- измерение высоты стояния дна матки

**265.** Выберите правильный ответ

На каждом приеме беременной в женской

консультации в третьем триместре необходимо

- проводить
- тонометрию
- осмотр на зеркалах
- пельвеометрию
- влагалищное исследование

**266.** Выберите правильный ответ

Срок беременности, при котором дно матки находится на середине между пупком и лобком

- 16 недель
- 12 недель
- 14 недель
- 20 недель

**267.** Выберите правильный ответ

Срок беременности, при котором дно матки находится на середине между пупком и мечевидным отростком

- 32 недели
- 20 недель
- 24 недели
- 38 недель

**268.** Выберите правильный ответ

Нормальным можно считать сердцебиение плода

- 135 уд/мин.
- 165 уд/мин.
- 115 уд/мин.
- 95 уд/мин.

**269.** Выберите правильный ответ

Рекомендуемая калорийность питания беременной во второй половине беременности

- 2500-3000 ккал
- 1000-1500 ккал
- 1500-2000 ккал
- 4000-4500 ккал.

**270.** Выберите правильный ответ

Беременной рекомендуется

- белково-витаминная диета
- ограничение белковой пищи
- преимущественно углеводно-жировая диета
- ограничение овощей и фруктов

**271.** Выберите правильный ответ

Отношение спинки плода кпереди или кзади

- вид позиции
- предлежание
- положение
- позиция

**272.** Выберите правильный ответ

Отношение оси плода к оси матери

- положение
- предлежание
- позиция
- вид позиции

**273.** Выберите правильный ответ

Третий прием Леопольда-Левицкого позволяет выявить

- предлежание плода
- положение плода
- позиция плода
- вид позиции

**274.** Выберите правильный ответ

Положение, позиция и вид плода определяется приемом Леопольда-Левицкого номер

- 2
- 1
- 3
- 4

**275.** Выберите правильный ответ

При измерении первых трех наружных размеров таза беременная лежит на

- спине
- боку спиной к акушерке
- боку лицом к акушерке
- боку с согнутой нижней ногой

**276.** Выберите правильный ответ

При первой позиции плода

- спинка обращена влево при продольном положении
- спинка обращена вправо при продольном положении
- головка обращена вправо при поперечном положении
- ягодички обращены влево при поперечном положении

**277.** Выберите правильный ответ

Размягчение в области перешейка во время беременности названо признаком

- Горвица-Гегара
- Пискачечка
- Снегирева
- Отта

**278.** Выберите правильный ответ

Перед ультразвуковым исследованием живот беременной обрабатывается

- гелем
- хлорамином
- эфиром
- спиртом

**279.** Выберите правильный ответ

Проведение ультразвукового исследования во время беременности рекомендуется

- 3 раза за беременность
- только женщинам из группы риска
- один раз при постановке на учет
- каждый месяц

**280.** Выберите правильный ответ

Ультразвуковое исследование беременным

- проводится в сроках беременности 11-14, 18-21, 30-34 недели
- абсолютно противопоказано в ранние сроки беременности
- обязательно для поступления в родильный дом
- не рекомендуется женщинам из группы генетического риска

**281.** Выберите правильный ответ

Кровь на альфа-фетопротеин назначают с целью выявления

- пороков развития плода
- раннего гестоза
- позднего гестоза
- невынашивания.

**282.** Выберите правильный ответ

Всем беременным рекомендуется принимать профилактически в 1 триместре

- фолиевую кислоту весь 1 триместр и калия йодид всю беременность
- седативные средства
- антибиотики
- сохраняющие средства

**283.** Выберите правильный ответ

Всем беременным рекомендуется принимать профилактически в течение всей беременности

- калия йодид
- седативные средства
- антибиотики
- сохраняющие средства

**284.** Выберите правильный ответ

Дородовый декретный отпуск выдается в

- 30 недель беременности
- 26 недель беременности
- 28 недель беременности
- 32 недели беременности

**285.** Выберите правильный ответ

Послеродовый декретный отпуск при отсутствии осложнений составляет

- 70 дней
- 56 дней
- 86 дней
- 140 дней

**286.** Выберите правильный ответ

Если беременная не пришла на прием в женскую консультацию, акушерка должна выполнить патронаж

- в этот же или на следующий день
- в течение месяца
- в течение недели
- только по назначению врача

**287.** Выберите правильный ответ

Во время беременности противопоказано назначение методов диагностики

- рентгенологических
- ультразвуковых
- серологических
- иммунологических

**288.** Выберите правильный ответ

Возможно направление беременных с нормальным течением беременности в 32 недели в специализированный санаторий для

- отдыха беременных женщин
- лечения гинекологических заболеваний
- проведения бальнеотерапии и грязевой терапии
- лечения органов мочевыделительной системы

**289.** Выберите правильный ответ

Лучше всего прослушивается сердцебиение плода при 1-ой позиции в переднем виде затылочного предлежания

- слева ниже пупка
- справа ниже пупка
- слева выше пупка
- слева на уровне пупка

**290.** Выберите правильный ответ

Метод инструментального исследования, применяемый при беременности

- осмотр шейки матки с помощью зеркал
- зондирование матки
- биопсия
- гистерография

**291.** Выберите правильный ответ

Параметры оценки «зрелости» шейки матки

- консистенция и длина шейки матки
- форма влагалищной части шейки матки
- величина и консистенция тела матки
- форма наружного зева шейки матки

**292.** Выберите правильный ответ

Параметры оценки «зрелости» шейки матки

- степень проходимости цервикального канала и расположение шейки матки по отношению к проводной оси таза
- цианоз шейки матки
- размягчение области перешейка матки
- форма влагалищной части шейки матки

**293.** Выберите правильный ответ

Признаки «зрелой» шейки матки

- шейка матки размягчена на всем протяжении, цервикальный канал проходим для 1-1,5 пальцев
- влагалищная часть шейки матки расположена в стороне от проводной оси таза
- длина шейки матки 4-5 см
- щелевидная форма наружного зева шейки матки

**294.** Выберите правильный ответ

Для обеспечения инфекционной безопасности медицинскому персоналу необходимо

- применять индивидуальные средства защиты, соблюдать личную гигиену
- заниматься физкультурой и спортом
- соблюдать диету
- регулярно проходить обучение на курсах повышения квалификации

**295.** Выберите правильный ответ

Дно матки у здоровой родильницы на 3 сутки после родов на

- 3 поперечных пальца ниже пупка
- 1 поперечный палец ниже пупка
- уровне пупка
- 1 поперечный палец выше лобка

**296.** Выберите правильный ответ

Дно матки скрывается за лобком у здоровой родильницы

- на 11 сутки

- на 7 сутки
- на 4 сутки
- через месяц

**297.** Выберите правильный ответ

Яркие кровянистые лохии после родов в норме бывают

- 2-3 дня
- 10 дней
- 2 недели
- до конца декретного отпуска

**298.** Выберите правильный ответ

Умеренное нагрубание молочных желез начинается чаще

- на третьи сутки послеродового периода
- в первые сутки послеродового периода
- во вторые сутки послеродового периода
- в родах

**299.** Выберите правильный ответ

Раневая поверхность матки эпителизируется (за исключением плацентарной площадки)

- через 10 дней
- через 5 дней
- через 4 дня
- в конце декретного отпуска

**300.** Выберите правильный ответ

Внутренний зев шейки матки формируется

- на 3 день
- через 10 дней
- через 3 недели
- через месяц

**301.** Выберите правильный ответ

Шейка полностью сформирована после родов

- через 3 недели
- через неделю
- через 2 недели
- на 3 день

**302.** Выберите правильный ответ

Женщине после родов не рекомендуется жить половой жизнью

- 1,5-2 месяца
- 2 недели
- 3 недели
- 10 дней

**303.** Выберите правильный ответ

Для нормальной инволюции матки после родов наиболее рационально

- вставать через несколько часов после родов
- вставать после родов на 2 сутки
- оставаться в постели 3 дня
- соблюдать постельный режим неделю

**304.** Выберите правильный ответ

Первобеременные начинают ощущать шевеления плода с

- 20 недель
- 16 недель
- 18 недель

- 22 недель

**305.** Выберите правильный ответ

Влагалищное исследование при диспансерном наблюдении беременной во II триместре

- проводится только при наличии показаний
- должно проводиться при подозрении на предлежание плаценты
- проводится для уточнения характера предлежащей части
- должно проводиться при каждой явке

**306.** Выберите правильный ответ

Для уточнения 30-недельного срока беременности можно использовать

- УЗИ
- рентгенологический метод
- ЭКГ и ФКГ плода
- амниоскопию

**307.** Выберите правильный ответ

Признак Пискачека при диагностике ранних сроков беременности относится к группе

- вероятных признаков беременности
- предположительных признаков беременности
- сомнительных признаков беременности
- достоверных признаков беременности

**308.** Выберите правильный ответ

Признак Горвица-Гегара относится к группе

- вероятных признаков беременности
- предположительных признаков беременности
- сомнительных признаков беременности
- достоверных признаков беременности

**309.** Выберите правильный ответ

Появление молозива относится к группе

- вероятных признаков беременности
- предположительных признаков беременности
- сомнительных признаков беременности
- достоверных признаков беременности

**310.** Выберите правильный ответ

Среди признаков беременности раннего срока прекращение менструаций относится к группе

- вероятных признаков беременности
- предположительных признаков беременности
- сомнительных признаков беременности
- достоверных признаков беременности

**311.** Выберите правильный ответ

Цианоз слизистой оболочки влагалища и шейки матки относится к группе

- вероятных признаков беременности
- предположительных признаков беременности
- сомнительных признаков беременности
- достоверных признаков беременности

**312.** Выберите правильный ответ

К сомнительным признакам беременности относятся

- изменение аппетита, обонятельных ощущений, тошнота по утрам, неустойчивость настроения

- пальпация частей плода, выслушивание сердечных тонов плода
- прекращение месячных, цианоз слизистой влагалища, изменение величины, формы и консистенции матки
- положительные биологические и иммунологические пробы на беременность

**313.** Выберите правильный ответ

Вероятный признак беременности

- изменение величины, формы и консистенции матки
- регистрация движений плода
- изменение аппетита
- регистрация сердечных тонов плода

**314.** Выберите правильный ответ

Достоверный признак беременности

- пальпация частей плода
- изменение формы, величины и консистенции матки
- тошнота, рвота по утрам
- цианоз слизистой влагалища

**315.** Выберите правильный ответ

Появление признака Горвица-Гегара при беременности ранних сроков обусловлено

- размягчением перешейка матки
- асимметрией матки
- сокращением матки при пальпации
- размягчением тела матки

**316.** Выберите правильный ответ

Признак Снегирева для диагностики беременности раннего срока заключается в

- сокращении матки при ее пальпации
- асимметрии матки
- размягчении перешейка
- перегибе матки

**317.** Выберите правильный ответ

Признак Пискачека для диагностики беременности раннего срока заключается в

- асимметрии матки
- усиленном перегибе матки кпереди
- размягчении перешейка матки
- сокращении матки при пальпации

**318.** Выберите правильный ответ

Диагностические признаки, связанные с изменениями формы беременной матки

- Пискачека, Гентера
- Снегирева, Горвица-Гегара
- Шредера
- Альфельда

**319.** Выберите правильный ответ

Диагностические признаки, связанные с изменениями консистенции беременной матки

- Снегирева, Горвица-Гегара
- Пискачека, Гентера
- Шредера
- Альфельда

**320.** Выберите правильный ответ

Максимальная высота стояния дна матки наблюдается в

- 36 недель
- 38 недель
- 39 недель
- 40 недель

**321.** Выберите правильный ответ

При сроке беременности 36 недель дно матки

- достигает мечевидного отростка
- на уровне пупка
- на середине расстояния между пупком и мечевидным отростком
- на середине расстояния между пупком и мечевидным отростком

**322.** Выберите правильный ответ

Для вычисления предполагаемой даты родов у первобеременных к дате первого шевеления плода необходимо прибавить

- 20 недель
- 18 недель
- 16 недель
- 22 недели

**323.** Выберите правильный ответ

Срок родов у повторнородящей женщины может быть вычислен прибавлением к дате первого шевеления плода

- 22 недели
- 25 недель
- 18 недель
- 20 недель

**324.** Выберите правильный ответ

Срок родов может быть вычислен путем прибавления к дате начала дородового отпуска

- 10 недель
- 6 недель
- 8 недель
- 4 недели

**325.** Выберите правильный ответ

Для уточнения срока беременности может быть использовано

- УЗИ
- рентгенологическое исследование
- ФКГ плода
- влагалищное исследование

**326.** Выберите правильный ответ

При измерении наружной конъюгаты беременная находится в положении

- на боку с согнутой в тазобедренном и коленном суставе вышележащей ногой и вытянутой нижележащей
- на боку с согнутой в тазобедренном и коленном суставе нижележащей ногой и вытянутой вышележащей
- в положении стоя
- лежа на животе

**327.** Выберите правильный ответ

Измерение диагональной конъюгаты производят

- с помощью тазомера от верхнего края лона до остистого отростка 5-го поясничного позвонка
- при влагиалищном исследовании
- для вычисления индекса Соловьева
- в положении женщины стоя

**328.** Выберите правильный ответ

Синтез хорионического гонадотропина происходит

- в синцитиотрофобласте
- в надпочечниках
- в гипофизе
- в яичниках

**329.** Выберите правильный ответ

Первым приемом Леопольда-Левецкого определяют

- высоту стояния дна матки
- характер предлежащей части плода
- позицию плода
- вид позиции плода

**330.** Выберите правильный ответ

Вторым приемом Леопольда-Левецкого определяют

- положение и позицию плода
- высоту стояния дна матки
- характер предлежащей части плода
- отношение предлежащей части к входу в малый таз

**331.** Выберите правильный ответ

Третьим приемом Леопольда-Левецкого определяют

- предлежащую часть
- высоту стояния дна матки
- позицию плода, высоту стояния дна матки
- вид позиции плода

**332.** Выберите правильный ответ

Четвертым приемом Леопольда-Левецкого определяют

- отношение предлежащей части ко входу в малый таз
- позицию плода
- вид позиции плода
- характер предлежащей части плода

**333.** Выберите правильный ответ

Измерение окружности живота беременной женщины производится

- на уровне пупка
- в положении стоя
- на уровне дна матки
- в положении лежа на боку

**334.** Выберите правильный ответ

Основная цель проведения антенатальной кардиоотографии

- диагностика нарушений сердечного ритма плода

определение сократительной активности миоэлектрической активности

- определение предполагаемого веса плода
- определение пороков развития сердца плода

**335.** Выберите правильный ответ

Кордоцентез - это

- взятие крови из вены пуповины плода
- взятие пробы крови из маточных артерий беременной
- получение околоплодных вод трансвагинальным доступом
- получение аспирата ворсин хориона

**336.** Выберите правильный ответ

Взаимоотношение отдельных частей плода - это

- членорасположение
- позиция
- вид
- положение

**337.** Выберите правильный ответ

Отношение спинки плода к правой или левой стенке матки

- позиция
- предлежание
- вид позиции
- вставление

**338.** Выберите правильный ответ

Отношение оси плода к продольной оси матки

- положение
- членорасположение
- позиция
- вид позиции

**339.** Выберите правильный ответ

Предлежит головка плода, спинка обращена кзади - это

- головное предлежание, задний вид
- 1 позиция, задний вид
- головное предлежание, передний вид
- тазовое предлежание, задний вид

**340.** Выберите правильный ответ

Функция плаценты

- обеспечивает газообмен
- влияет на раскрытие маточного зева
- влияет на положение плода
- регулирует свертывание крови

**341.** Выберите правильный ответ

Отношение крупной части плода ко входу в малый таз

- предлежание
- положение
- вид
- членорасположение

**342.** Выберите правильный ответ

Предположительный (сомнительный) признак беременности

- изменение аппетита
- определение движений плода

- цианоз слизистой влагалища
- прекращение менструаций

**343.** Выберите правильный ответ

Предлежащая часть плода может быть определена с помощью

- третьего приема пальпации плода
- четвертого приема пальпации плода
- второго приема пальпации плода
- первого приема пальпации плода

**344.** Выберите правильный ответ

Уровень стояния дна матки и часть плода, расположенную в дне матки, определяют с помощью

- первого приема пальпации плода
- третьего приема пальпации плода
- второго приема пальпации плода
- четвертого приема пальпации плода

**345.** Выберите правильный ответ

Истинная конъюгата может быть определена по

- наружной конъюгате
- поперечному размеру ромба Михаэлиса
- d.spinarum
- d.cristarum

**346.** Выберите правильный ответ

Беременная должна встать на учет в женской консультации в сроке беременности

- до 11 недель 6 дней
- 14 недель
- 16 недель
- 20 недель

**347.** Выберите правильный ответ

Физиологическая беременность продолжается

- 280 дней
- 240 дней
- 320 дней
- 220 дней

**348.** Выберите правильный ответ

Положение и позицию плода определяют с помощью

- второго приема пальпации плода в матке
- третьего приема пальпации плода в матке
- четвертого приема пальпации плода в матке
- первого приема пальпации плода в матке

**349.** Выберите правильный ответ

Отношение предлежащей части плода к плоскостям малого таза определяют с помощью

- четвертого приема пальпации плода
- третьего приема пальпации плода
- второго приема пальпации плода
- первого приема пальпации плода

**350.** Выберите правильный ответ

Данные влагалищного исследования, свидетельствующие о беременности малого срока

- увеличение матки, изменение её консистенции
- матка плотная, безболезненная
- смещение матки кзади

- увеличение придатков

**351.** Выберите правильный ответ

Диагностика маточной беременности малого срока основывается на

- результатах ультразвукового исследования
- появлении вероятных признаков беременности
- результатах рентгенологического исследования
- обнаружении достоверных признаков беременности

**352.** Выберите правильный ответ

Наименьший срок беременности, считая от момента зачатия, при котором можно обнаружить плодное яйцо с помощью трансабдоминальной эхографии

- 3 недели
- 2 недели
- 6 недели
- 5 недели

**353.** Выберите правильный ответ

УЗИ с доплерометрией проводится в сроке беременности

- после 33 недель
- 6-8 недель, 36 недель
- 15 недель, 30 недель
- 10 недель, 25 недель, 34 недели

**354.** Выберите правильный ответ

Посев средней порции мочи необходимо провести в сроке беременности

- после 14 недель однократно
- в 5-6 недель
- в 10 недель
- при первой явке

**355.** Выберите правильный ответ

Кардиотографию плода необходимо провести в сроке беременности

- после 33 недель
- после 20 недель
- в 28 недель
- в 30 недель

**356.** Выберите правильный ответ

Признак зрелости шейки накануне родов

- укорочение шейки до 1 см
- отклонение шейки кзади
- проходимость наружного зева для кончика пальца
- длина шейки 3 см

**357.** Выберите правильный ответ

Признак предвестников родов

- отхождение слизистой пробки
- отхождение вод
- схватки через 5-8 минут по 30 секунд
- кровотечение

**358.** Выберите правильный ответ

Созревание шейки к родам происходит в норме при беременности начиная с

- 38 недель

- 34 недель
- 35 недель
- 32 недель

**359.** Выберите правильный ответ

Сократительная активность миометрия стимулируется увеличением выработки

- простогландинов
- прогестерона
- партусистена
- парлодела

**360.** Выберите правильный ответ

Признаки готовности организма к родам

- наличие «зрелой» шейки матки
- излитие околоплодных вод
- появление регулярных схваток
- вставление головки во вход в малый таз

**361.** Выберите правильный ответ

Особенности нормального прелиминарного периода

- нерегулярные, малоболезненные схватки в течение 6 часов, переходящие в регулярную родовую деятельность
- нарушается режим сна и бодрствования
- маловодие
- раскрытие шейки матки на 6-7 см

**362.** Выберите правильный ответ

Метод, позволяющий определить степень готовности шейки матки к родам

- влагалищное исследование
- пельвеометрия
- аускультация
- кардиотокография

**363.** Выберите правильный ответ

Женщина в родах называется

- роженица
- беременная
- родильница
- кормилица

**364.** Выберите правильный ответ

Раскрытие шейки матки считается полным

- 10-12 см
- 6-8 см
- 9-10 см
- 15 см

**365.** Выберите правильный ответ

Последовый период - это

- отделение плаценты и рождение последа
- изливаются околоплодные воды
- рождается ребенок
- появляются потуги

**366.** Выберите правильный ответ

Началом родовой деятельности следует считать

- появление регулярных схваток и сглаживание шейки матки
- прижатие головки к входу в малый таз
- цианоз шейки матки

- излитие околоплодных вод

**367.** Выберите правильный ответ

Результат начала родовой деятельности

- сглаживание и открытие шейки матки
- положение головки на тазовом дне
- целый плодный пузырь
- гипоксия плода

**368.** Выберите правильный ответ

При поступлении роженицы в помещении, называемом фильтр, проводится

- термометрия
- осмотр на зеркалах
- очистительная клизма
- исследование мочи на белок

**369.** Выберите правильный ответ

У первородящей женщины в родах

- сначала идет раскрытие внутреннего зева
- сначала идет раскрытие наружного зева
- укорочение и раскрытие шейки идет одновременно
- сначала идет раскрытие шейки, а потом её укорочение

**370.** Выберите правильный ответ

Второй период родов называется периодом

- изгнания
- раскрытия
- прелиминарным
- предвестниковым

**371.** Выберите правильный ответ

Вторая фаза периода раскрытия

- активная
- латентная
- транзитная
- прелиминарная

**372.** Выберите правильный ответ

Тип сокращения, который более характерен для тела матки

- контракция
- аккомодация
- дистракция
- регургитация

**373.** Выберите правильный ответ

Проводная точка при переднем виде затылочного предлежания

- малый родничок
- большой родничок
- подзатылочная ямка
- крестцовый мыс

**374.** Выберите правильный ответ

При переднем виде затылочного предлежания головка прорезывается

- малым косым размером
- большим поперечным размером
- малым поперечным размером
- большим косым размером

**375.** Выберите правильный ответ

При заднем виде затылочного вставления головка прорезывается

- средним косым размером
- большим косым размером
- малым косым размером
- прямым размером

**376.** Выберите правильный ответ

Первый момент при заднем виде затылочного вставления биомеханизма родов

- сгибание головки
- разгибание головки
- дополнительное сгибание головки
- внутренний поворот головки

**377.** Выберите правильный ответ

При переднем виде затылочного вставления после разгибания головки следует

- внутренний поворот плечиков и наружный поворот головки
- внутренний поворот головки
- сгибание головки
- дополнительное сгибание головки

**378.** Выберите правильный ответ

Точка, вокруг которой происходит разгибание головки, называется точкой

- фиксации
- ведущая
- проводная
- отсчета

**379.** Выберите правильный ответ

Для активной фазы периода раскрытия характерны схватки через

- 1-2 минуты по 60 секунд
- 12-15 минут по 10 секунд
- 4-5 минут по 35 секунд
- 8-10 минут по 25 секунд

**380.** Выберите правильный ответ

Основные характеристики схваток

- частота, продолжительность
- отсутствие болей
- боли постоянного характера
- околоплодные воды, окрашенные меконием

**381.** Выберите правильный ответ

Признаки, характеризующие схватки

- сила, эффективность
- сокращение мышц диафрагмы и брюшного пресса
- сокращение мышц тазового дна
- безболезненность

**382.** Выберите правильный ответ

Второй период родов начинается с момента

- полного раскрытия шейки матки
- начала последовых схваток
- отхождения вод
- появления схваток через 3 минуты по 40 секунд

**383.** Выберите правильный ответ

Родовая изгоняющая сила второго периода родов

- потуги
- боли в пояснице
- схватки
- боли внизу живота

**384.** Выберите правильный ответ

Своевременным для первых родов считается отхождение вод при раскрытии

- 7-8 см
- 3-4 см
- 5-6 см
- 1-2 см

**385.** Выберите правильный ответ

Роженице запрещают тужиться

- при прорезывании теменных бугров
- при наружном повороте головки
- после рождения головки
- при положительных признаках отделения последа

**386.** Выберите правильный ответ

Осложнения второго периода родов

- разрыв промежности
- раннее излитие околоплодных вод
- гипотрофия плода
- многоводие

**387.** Выберите правильный ответ

Во втором периоде головка плода находится в одной плоскости у первородящих в среднем

- 30-40 минут
- 1 час
- 2 часа
- 50-60 минут

**388.** Выберите правильный ответ

Скорость продвижения головки по родовым путям в среднем составляет у первородящих

- 1 см/час
- 0,5 см/час
- 2 см/час
- 1,5 см/час

**389.** Выберите правильный ответ

Скорость раскрытия маточного зева в латентную фазу в среднем составляет

- 0,35 см/час
- 0,7 см/час
- 2,5 см/час
- 1,5 см/час

**390.** Выберите правильный ответ

Во втором периоде головка плода находится в одной плоскости у повторнородящих в среднем

- 20-30 минут
- 1 час
- 1,5 часа
- 50-60 минут

**391.** Выберите правильный ответ

Скорость продвижения головки по родовым путям в среднем составляет у повторнородящих

- 2 см/час
- 1 см/час
- 2,5 см/час
- 1,5 см/час

**392.** Выберите правильный ответ

Средняя продолжительность первого периода родов у первородящих составляет около

- 14-20 часов
- 18 часов
- 6-8 часов
- 20-24 часа

**393.** Выберите правильный ответ

Средняя продолжительность родов у повторнородящих составляет около

- 10-12 часов
- 20 часов
- 15-16 часов
- 3-4 часа

**394.** Выберите правильный ответ

Скорость раскрытия маточного зева в активную фазу у повторнородящих в среднем составляет

- 1,5 см/час
- 0,35 см/час
- 1,8 см/час
- 3 см/час

**395.** Выберите правильный ответ

Скорость раскрытия маточного зева в активную фазу у первородящих в среднем составляет

- 1,0 см/час
- 0,35 см/час
- 1,8 см/час
- 3 см/час

**396.** Выберите правильный ответ

Верхняя граница физиологической кровопотери в родах

- 0,5% от массы тела
- 0,6% от массы тела
- 1% от массы тела
- 5% от массы тела

**397.** Выберите правильный ответ

Продолжительность раннего послеродового периода

- 2 часа
- 12 часов
- 1 сутки
- 5-6 дней

**398.** Выберите правильный ответ

Родильница остается для наблюдения после нормальных родов в родильном отделении

- 2 часа
- 1 час
- 6 часов
- сутки

**399.** Выберите правильный ответ

Оценка состояния родовых путей после родов проводится

- всем женщинам
- только первородящим
- только повторнородящим
- только женщинам из группы риска

**400.** Выберите правильный ответ

Совокупность движений, которые совершает плод при прохождении через таз и родовые пути

- биомеханизм родов
- конфигурация головки
- асинклитизм
- контракции

**401.** Выберите правильный ответ

Наиболее рационально при неосложненных родах пересекать пуповину

- после прекращения пульсации сосудов пуповины
- сразу после рождения ребенка
- после отделения последа
- через 20 минут

**402.** Выберите правильный ответ

Прикладывание ребенка к груди матери при отсутствии осложнений рационально

- в родильном зале
- после перевода в послеродовое отделение
- через 6 часов после родов
- на вторые сутки после родов

**403.** Выберите правильный ответ

При самообезболивании родов роженице рекомендуют нажимать точки

- наружные углы ромба Михаэлиса
- место измерения индекса Соловьева
- пузырную точку
- верхний край симфиза

**404.** Выберите правильный ответ

Для уменьшения болезненности схваток применяют

- спазмолитики
- утеротонические средства
- антибиотики
- простагландины

**405.** Выберите правильный ответ

Для перидуральной анестезии применяют

- бупивакаин
- триквилар
- трилен
- триампур

**406.** Выберите правильный ответ

Ненаркотический анальгетик

- анальгин
- промедол
- морфин
- омнопон

**407.** Выберите правильный ответ

Медикаментозный сон-отдых показан

- при длительных предвестниках и переутомлении

- всем роженицам без исключения
- во втором периоде родов
- в раннем послеродовом периоде

**408.** Выберите правильный ответ

Послеродовый декретный отпуск при отсутствии осложнений составляет

- 70 дней
- 56 дней
- 86 дней
- 140 дней

**409.** Выберите правильный ответ

Наиболее рациональным в последние годы признано

- совместное пребывание матери и плода в отдельной палате со всеми удобствами
- совместное пребывание матери и плода в многоместной палате
- раздельное пребывание после родов матери и плода
- выписка родильницы домой на 2 сутки после родов

**410.** Выберите правильный ответ

Матка выходит за пределы малого таза в сроке беременности

- 13 недель
- 10 недель
- 18 недель
- 32 недели

**411.** Выберите правильный ответ

Уродства плода чаще возникают при заболевании беременной

- краснухой
- острым трахеитом
- острым ринитом
- аппендицитом

**412.** Выберите правильный ответ

Растяжки на коже у беременных

- свидетельствуют о недостаточной эластичности кожи
- являются достоверным признаком беременности
- выражены у всех беременных
- полностью исчезают после беременности

**413.** Выберите правильный ответ

Для беременности характерно

- цианоз влагалища
- гиперемия влагалища
- бледность влагалища
- влагалище не изменяется

**414.** Выберите правильный ответ

Достоверный признак беременности

- выслушивание сердцебиения плода
- задержка месячных
- увеличение молочных желёз
- увеличение матки

**415.** Выберите правильный ответ

Овуляция при 28-дневном цикле у здоровой женщины происходит чаще всего на

- 14 день менструального цикла
- 5-7 день менструального цикла
- 1-3 день менструального цикла
- 18-26 день менструального цикла

**416.** Выберите правильный ответ

Объем циркулирующей крови во время беременности

- увеличивается
- понижается
- не изменяется
- увеличивается только в 1 триместре

**417.** Выберите правильный ответ

Проницаемость стенок сосудов во время беременности

- повышена
- слегка понижена
- существенно понижена
- не изменена

**418.** Выберите правильный ответ

Свертывающие свойства крови к концу нормальной беременности

- повышены
- понижены
- не изменены
- можно не учитывать для прогноза родов

**419.** Выберите правильный ответ

Срок беременности, при котором дно матки находится на уровне пупка

- 16 недель
- 14 недель
- 24 недели
- 12 недель

**420.** Выберите правильный ответ

Правильное членорасположение

- головка разогнута, ручки скрещены на груди, ножки согнуты в коленях и тазобедренных суставах, туловище согнуто
- головка согнута, ручки скрещены на груди, ножки согнуты в коленях и тазобедренных суставах, туловище согнуто
- головка согнута, позвоночник разогнут, ручки скрещены на груди, ножки согнуты в коленях и тазобедренных суставах, туловище согнуто
- головка согнута, ручки скрещены на груди, ножки разогнуты в тазобедренных и коленных суставах

**421.** Выберите правильный ответ

Правильным положением плода считается

- продольное
- косое
- поперечное с головкой плода, обращенной влево
- поперечное с головкой плода, обращенной вправо

**422.** Выберите правильный ответ

Позиция плода при поперечном положении определяется по расположению

- головки
- спинки
- мелких частей
- тазового конца

**423.** Выберите правильный ответ

Для ранней диагностики беременности определяется гормон

- хорионический гонадотропин
- прогестерон
- эстрогены
- пролактин

**424.** Выберите правильный ответ

Размеры матки к 12 неделям беременности

- дно матки доходит до верхнего края симфиза
- матка размером с куриное яйцо
- матка на 2 поперечных пальца выше лона
- матка размером с гусиное яйцо

**425.** Выберите правильный ответ

Размеры матки в 8 недель беременности

- увеличивается до размеров гусиного яйца
- дно матки доходит до верхнего края симфиза
- матка размером с куриное яйцо
- матка на 2 поперечных пальца выше лона

**426.** Выберите правильный ответ

Дно матки в 40 недель беременности находится на

- середине расстояния между пупком и мечевидным отростком
- уровне пупка
- уровне мечевидного отростка
- 2 пальца выше пупка

**427.** Выберите правильный ответ

Место наилучшего выслушивания сердечных тонов при головном предлежании плода

- ниже пупка слева или справа, в зависимости от позиции
- на уровне пупка
- выше пупка
- на уровне пупка справа

**428.** Выберите правильный ответ

Место наилучшего выслушивания сердечных тонов при поперечном положении плода

- на уровне пупка ближе к головке плода
- ниже пупка справа
- ниже пупка слева
- выше пупка

**429.** Выберите правильный ответ

Размер истинной конъюгаты по наружной конъюгате можно определить если

- вычесть 9 см из величины наружной конъюгаты
- вычесть 3 см из величины наружной конъюгаты
- вычесть 5 см из величины наружной конъюгаты
- вычесть 8 см из величины наружной конъюгаты

**430.** Выберите правильный ответ

Место выслушивания сердечных тонов при тазовом предлежании

- выше пупка слева или справа
- ниже пупка справа
- ниже пупка слева
- на уровне пупка

**431.** Выберите правильный ответ

Для обработки рук перед родами следует выбрать кожный антисептик

- хлоргексидина биглюконат
- фурацилин
- перманганат калия
- анолит

**432.** Выберите правильный ответ

Совместное пребывание родильницы с ребенком

- допускается, только если это не вредит матери и ребенку
- допускается у всех родильниц без ограничений
- может быть только на физиологическом послеродовом отделении
- не разрешается у женщин с любыми оперативными вмешательствами

**433.** Выберите правильный ответ

При утилизации последов запрещено

- вынос в контейнеры для бытового мусора
- захоронение в специально отведенных местах после обеззараживания
- вывоз на организованные свалки после предварительного обеззараживания
- сжигание в специальных печах

**434.** Выберите правильный ответ

Положение сагиттального шва относительно симфиза и мыса во входе в малый таз

- вставление
- предлежание
- членорасположение
- положение

**435.** Выберите правильный ответ

Основной критерий продолжительности послеродового периода

- инволюция матки
- появлением первой менструации
- длительность лактации
- прекращение выделения лохий

**436.** Выберите правильный ответ

Совместное пребывание матери и ребенка после родов

- способствует более активной лактации
- способствует появлению трещин на молочных железах
- увеличивает риск развития лактационного мастита
- приводит к нарушению режима вскармливания новорожденного

**437.** Выберите правильный ответ

Совместное пребывание матери и ребенка после родов способствует

обсеменению кожи новорожденного материнскими штаммами микроорганизмов

замедляет инволюцию матки

вызывает эмоциональное напряжение родильницы

приводит к уменьшению массы новорожденного

**438.** Выберите правильный ответ

Совместное пребывание матери и ребенка после родов способствует

снижению гнойно-септических заболеваний родильниц и новорожденных

повышению инфекционных заболеваний у персонала послеродового отделения

активации госпитальных штаммов микроорганизмов

отказу новорожденного от грудного вскармливания

**439.** Выберите правильный ответ

Метод Пискачека в родах указывает

на уровень расположения головки в малом тазу

на угрозу разрыва матки

на клиническое несоответствие таза и головки

на отделение последа

**440.** Выберите правильный ответ

Степень раскрытия маточного зева точнее определяется по

влагалищному исследованию

методу Пискачека

стоянию контракционного кольца

характеру схваток

**441.** Выберите правильный ответ

Сердцебиение плода во втором периоде родов выслушивают

в промежутках между потугами

на протяжении всего периода, включая схватки

через 15 минут

через 30 минут

**442.** Выберите правильный ответ

Физиологическая кровопотеря в родах

200-250 мл

600 мл

500 мл

800 мл

**443.** Выберите правильный ответ

В наборе для осмотра и зашивания разрывов родовых путей отсутствует

зеркало Куско

окончатые зажимы

иглодержатель

ножницы

**444.** Выберите правильный ответ

Перевод родильницы в наблюдательное отделение проводим

после родов в приемном отделении

с умеренной анемией

с миокардиодистрофией

после планового кесарева сечения

**445.** Выберите правильный ответ

Родильница с гнойным маститом переводится

в хирургическое отделение

в родильный дом с отделением внешней обсервации

в гинекологическое отделение

в отделение послеродовых заболеваний

**446.** Выберите правильный ответ

Здоровая родильница находится после родов в послеродовом отделении родильного дома

4-5 дней

5-6 дней

2-3 дня

7-8 дней

**447.** Выберите правильный ответ

Для профилактики осложнений швов промежности назначается

УФО

УВЧ

ультразвук

фонофорез

**448.** Выберите правильный ответ

Женщина получает дородовый отпуск при сроке беременности

30 недель

32 недели

35 недель

28 недель

**449.** Выберите правильный ответ

Реакция Вассермана в течение беременности проводится

2 раза

1 раз

каждые 2 месяца

1 раз в месяц

**450.** Выберите правильный ответ

Исследование мазков на гонококки Нейссера у беременных производится

2 раза за беременность

1 раз за беременность

1 раз в месяц

2 раза в триместр

**451.** Выберите правильный ответ

Лечебная физкультура в послеродовом периоде

рекомендуется всем родильницам при отсутствии противопоказаний

нецелесообразна

показана только после кесарева сечения

противопоказана

**452.** Выберите правильный ответ

Кардиотокография

- назначается для диагностики изменений сердцебиения плода и сократительной активности матки
- не может выполняться акушеркой
- проводится только в родах
- проводится только в экспериментальных целях

**453.** Выберите правильный ответ

В послеродовом периоде противопоказано применение

- бальнеотерапии
- УФО
- льда
- ЛФК

**454.** Выберите правильный ответ

Параметры ультразвуковой фетометрии плода

- бипариетальный размер головы, длина бедра
- плацентация
- окружность головы
- межвертельное расстояние

**455.** Выберите правильный ответ

Кардиотокография позволяет выявить

- острую и хроническую гипоксию плода
- внутриутробное инфицирование плода
- пороки развития плода
- ранний неонатальный период

**456.** Выберите правильный ответ

Показания для назначения обезболивающих препаратов в первом периоде родов

- дискоординация родовой деятельности
- разрыв плодного пузыря
- раскрытие шейки матки до 4 см
- слабость родовой деятельности

**457.** Выберите правильный ответ

В норме после окончания потуги должен восстановиться ритм сердечной деятельности плода

- через 20 секунд
- через 10 секунд
- через 40 секунд
- через 60 секунд

**458.** Выберите правильный ответ

Личико плода при 2 позиции после наружного поворота головки обращено

- к левому бедру матери
- к правому бедру матери
- вниз
- вверх

**459.** Выберите правильный ответ

Прорезывание головки при переднем виде затылочного предлежания совпадает с моментом биомеханизма родов

- разгибание головки
- внутренний поворот
- наружный поворот
- сгибание головки

**460.** Выберите правильный ответ

Роды – это

- физиологический процесс изгнания плода, плаценты с оболочками и околоплодными водами из матки через родовые пути
- изгнание последа
- отделение плаценты от стенки матки
- рождение плода

**461.** Выберите правильный ответ

Конфигурация головки в родах

- взаимное смещение костей черепа вследствие их подвижного сочленения
- разгибание головки
- внутренний поворот головки
- сгибание головки

**462.** Выберите правильный ответ

Оказание акушерского пособия по защите промежности начинают при

- врезывании головки
- головке, прижатой ко входу в малый таз
- головке, совершающей внутренний поворот
- внутреннем повороте плечиков

**463.** Выберите правильный ответ

Околоплодные воды в норме изливаются

- при полном или почти полном раскрытии маточного зева
- при появлении первых схваток
- во втором периоде родов
- при открытии шейки матки на 5 см

**464.** Выберите правильный ответ

«Передние» воды - это

- околоплодные воды, находящиеся в плодном пузыре ниже пояса соприкосновения
- околоплодные воды, находящиеся выше пояса соприкосновения
- околоплодные воды, находящиеся ниже и выше пояса соприкосновения
- околоплодные воды, изливающиеся после рождения плода

**465.** Выберите правильный ответ

«Задние» воды - это

- околоплодные воды, находящиеся выше пояса соприкосновения
- околоплодные воды, находящиеся ниже пояса соприкосновения
- околоплодные воды, находящиеся ниже и выше пояса соприкосновения
- околоплодные воды, изливающиеся в первом периоде родов

**466.** Выберите правильный ответ

Контракционное кольцо

- граница между сокращающимся верхним сегментом и растягиваемым нижним сегментом матки
- граница между большим и малым тазом
- расстояние между передневерхними остями подвздошных костей

расстояние между верхним краем симфиза и дном матки

**467.** Выберите правильный ответ

Контракционное кольцо при полном раскрытии маточного зева при физиологических родах определяется на

- ладонь выше лона
- уровне лона
- 2 поперечных пальца выше лона
- 4 пальца выше лона

**468.** Выберите правильный ответ

При формировании пояса соприкосновения с околоплодными водами происходит

- разделение их на «передние» и «задние»
- излитие околоплодных вод
- изменение цвета околоплодных вод
- образование околоплодных вод

**469.** Выберите правильный ответ

Количество передних околоплодных вод в норме

- 100-200 мл
- 300 мл
- 50 мл
- 700 мл

**470.** Выберите правильный ответ

Количество околоплодных вод в норме

- 1,5 л
- 2 л
- 3 л
- 0,5 л

**471.** Выберите правильный ответ

Родовая опухоль на головке плода образуется

- после излития околоплодных вод и при наличии пояса соприкосновения
- при целом плодном пузыре
- при подвижной головке, находящейся над входом в малый таз
- при тазовом предлежании плода

**472.** Выберите правильный ответ

Дно матки к концу первых суток после нормальных родов находится

- на уровне пупка
- на уровне лонного сочленения
- на середине между пупком и лобком
- на середине между пупком и мечевидным отростком

**473.** Выберите правильный ответ

Величина матки уменьшается до размеров небеременной матки после родов через

- 6-8 недель
- 10 недель
- 4-5 недель
- 2-3 недели

**474.** Выберите правильный ответ

Интенсивность схваток

- сила маточных сокращений, определяемая пальпацией стенки матки на пике её сокращения

период времени между началом и окончанием сокращений матки во время схватки

период времени между началом двух последующих друг за другом сокращений мускулатуры матки.

болезненность схваток

**475.** Выберите правильный ответ

Продолжительность схваток

- период времени между началом и окончанием сокращений матки во время схватки
- период болевых ощущений
- сила пика маточных сокращений, определяемая пальпацией стенки матки на пике её сокращения
- период времени между началом двух следующих друг за другом сокращений мускулатуры матки

**476.** Выберите правильный ответ

Частота схваток

- период времени между началом двух следующих друг за другом сокращений мускулатуры матки
- период болевых ощущений
- сила пика маточных сокращений, определяемая пальпацией стенки матки на пике её сокращения
- период времени между началом и окончанием сокращений матки во время схватки

**477.** Выберите правильный ответ

После родов рекомендуется

- совместное пребывание матери и ребенка в индивидуальной палате
- раздельное пребывание матери и ребёнка
- пребывание матери и ребёнка в многоместной палате
- выписка домой через 2 часа после родов

**478.** Выберите правильный ответ

После родов рекомендуется

- раннее прикладывание ребёнка к груди и контакт кожа к коже
- кормление ребёнка на вторые сутки после родов
- отказ от метода «кожа к коже»
- отказ от грудного вскармливания

**479.** Выберите правильный ответ

Неэффективные медицинские вмешательства во время родов низкого риска включают в себя

- рутинное использование очистительной клизмы
- оказание ручного пособия в родах
- профилактика кровотечения
- выслушивание сердцебиения плода

**480.** Выберите правильный ответ

Неэффективные медицинские вмешательства во время родов низкого риска включают в себя

- сбривание волос на лобке и промежности
- проведение влагалитического исследования
- мониторинг сердцебиения плода
- слежение за динамикой родовой деятельности

**481.** Выберите правильный ответ

Неэффективные медицинские вмешательства во время родов низкого риска включают в себя

- рутинное применение эпизиотомии
- измерение АД и подсчёт пульса роженицы
- оказание ручного пособия в родах с защитой промежности
- мониторинг сократительной деятельности матки

**482.** Выберите правильный ответ

Неэффективные медицинские вмешательства во время родов низкого риска включают в себя

- длительная задержка дыхания во время потужной деятельности, массаж и растягивание промежности во втором периоде родов
- КТГ
- ведение партограммы
- влагалищное исследование

**483.** Выберите правильный ответ

Если роженице предоставляют свободу выбора позиции в родах – это

- снижает дискомфорт во время родов и уменьшает число травм промежности и влагалища
- приводит к затяжным родам
- приводит к гипоксии плода
- повышает артериальное давление

**484.** Выберите правильный ответ

Принципы ведения родов

- выбор адекватного метода родоразрешения, ведение партограммы
- отказ от ручного пособия в родах
- рекламирование заменителей грудного молока
- использовать приёмы выдавливания плода

**485.** Выберите правильный ответ

Принципы ведения родов

- бережное оказание пособия в родах, профилактика кровотечения
- проводить латеральную эпизиотомию
- принимать роды только в положении роженицы на спине
- форсировать рождение ребёнка за одну потугу

**486.** Выберите правильный ответ

Принципы ведения родов

- мониторинг контроль в родах за состоянием матери и плода, раннее прикладывание ребенка к груди матери
- использовать утеротоники во втором периоде родов
- поднимать ребёнка при непережатой пуповине выше тела матери
- использовать приёмы выдавливания плода

**487.** Выберите правильный ответ

Предвестники родов

- ложные схватки
- отхождение околоплодных вод
- регулярные, частые схватки
- головная боль

**488.** Выберите правильный ответ

Причина начала родовой деятельности

- родовая доминанта
- зрелая шейка матки
- зрелая плацента
- перерастянутая матка

**489.** Выберите правильный ответ

Родовые схватки характеризуются

- периодичностью, длительностью, произвольностью, болезненностью и силой сокращения
- нерегулярностью и произвольностью
- роженица может управлять схватками
- сокращением матки в нижнем сегменте

**490.** Выберите правильный ответ

Во время потуг

- повышается внутрибрюшное давление
- уменьшается внутриматочное давление
- уменьшается внутрибрюшное давление
- расслабляются мышцы брюшного пресса

**491.** Выберите правильный ответ

Раскрытие зева и сглаживание шейки матки происходит под влиянием

- сокращения, ретракции мышц, плодного пузыря
- сокращения
- плодного пузыря
- сокращения пристеночных мышц таза

**492.** Выберите правильный ответ

Раскрытие шейки матки у первородящих происходит

- с внутреннего зева, затем сглаживается шейка, раскрывается наружный зев
- с наружного зева
- оба зева открываются одновременно
- быстрее, чем у повторнородящих

**493.** Выберите правильный ответ

После родов матка уменьшается в размере за счет

- сокращения и атрофии мышечных волокон матки
- снижения внутриматочного давления
- мышц брюшного пресса
- эпителизации эндометрия

**494.** Выберите правильный ответ

Обратное развитие матки – это

- инволюция
- имплантация
- эпителизация
- субинволюция

**495.** Выберите правильный ответ

Особое внимание в послеродовом периоде уделяем

- профилактике мастита
- профилактике кариеса
- уходу за кожей рук
- психическому состоянию роженицы

**496.** Выберите правильный ответ

Кефалогематома - это

- кровоизлияние под надкостницу головки плода
- отек мягких тканей головки
- кровоизлияние в подкожной клетчатке
- скопление крови в мозговой ткани

**497.** Выберите правильный ответ

Родовая опухоль – это

- отек мягких тканей головки
- смещение костей черепа плода
- кровоизлияние мягких тканей головки
- опухоль костей черепа

**498.** Выберите правильный ответ

Влагалищное исследование в родах проводить нецелесообразно

- в динамике через каждые 2 часа
- при поступлении роженицы в стационар
- при появлении кровянистых выделений
- при излитии околоплодных вод

**499.** Выберите правильный ответ

Наиболее целесообразно обезболивание с помощью наркотических анальгетиков на этапе родов

- в активную фазу
- в латентную фазу
- в фазу замедления;
- с появлением первых схваток

**500.** Выберите правильный ответ

Основное значение в нормальной инволюции послеродовой матки имеет

- естественное вскармливание новорожденного
- роды в тазовом предлежании
- гигиена родильницы
- диета

**501.** Выберите правильный ответ

Основное значение в нормальной инволюции послеродовой матки имеет

- нормальное функционирование кишечника и мочевого пузыря родильницы
- роды в тазовом предлежании
- роды в головном предлежании
- питание

**502.** Выберите правильный ответ

Приему в наблюдательное отделение подлежат роженицы, имеющие

- внутриутробную гибель плода
- безводный период 6 часов
- анатомически узкий таз
- аллергические заболевания

**503.** Выберите правильный ответ

Роженицы с носительством вирусного гепатита «В» госпитализируются

- в наблюдательное отделение
- в гинекологическое отделение
- в физиологическое отделение
- в специализированный акушерский стационар

**504.** Выберите правильный ответ

Акушерки родильного дома обязательно работают в стерильных разовых масках

- в родильном зале
- в приемном отделении
- в послеродовом отделении
- в отделении патологии беременности

**505.** Выберите правильный ответ

Ношение стерильных разовых масок обязательно при работе акушерки

- в операционной и при проведении инвазивных процедур
- в женской консультации
- на ФАПе
- в послеродовом отделении

**506.** Выберите правильный ответ

Акушерки родильного зала допускаются к работе при наличии

- эндокринных заболеваний
- лихорадки
- воспалительных заболеваний
- гнойных процессов

**507.** Выберите правильный ответ

Запоздалым считается излитие околоплодных вод

- после полного раскрытия маточного зева и после появления потуг
- после фиксации головки большим сегментом в плоскости входа в малый таз
- после раскрытия маточного зева на 5 см
- после раскрытия маточного зева на 7 см

**508.** Выберите правильный ответ

При запоздалом излитии околоплодных вод возникает риск развития

- преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты
- слабости родовой деятельности
- инфекционных осложнений
- родовой травмы у матери

**509.** Выберите правильный ответ

Окситоциновый тест проводится для определения

- готовности организма женщины к родам
- группы риска по возникновению кровотечения в третьем и раннем послеродовом периоде
- группы риска по развитию аномалий сократительной деятельности
- компенсаторных возможностей плода

**510.** Выберите правильный ответ

Акушерское пособие (защита промежности) проводится с целью

- сохранения нормального биомеханизма родов и предупреждение травматизма матери и плода
- обеспечения постепенного прорезывания головки
- выведения головки наименьшей окружностью
- содействия освобождению головки и плечиков

**511.** Выберите правильный ответ

Укороченная до 2 см полностью размягчённая, расположенная по проводной оси таза, цервикальный канал проходим для 1 поперечного пальца за внутренний зев - шейка матки

- зрелая
- незрелая
- не полностью созревшая
- созревающая

**512.** Выберите правильный ответ

При влагалищном исследовании обнаружено: шейка матки длиной 3.5 см, плотная, отклонена от проводной оси таза кзади, наружный зев закрыт.

Эти данные свидетельствуют

- о незрелой шейке
- о зрелой шейке
- о не полностью созревшей шейке
- о наличии готовности организма к родам

**513.** Выберите правильный ответ

При влагалищном исследовании обнаружено: шейка матки сглажена, открытие маточного зева 5 см, плодный пузырь вскрылся во время исследования. Диагноз

- 1-ый период родов, раннее излитие околоплодных вод

1-ый период родов, своевременное излитие околоплодных вод

1-ый период родов, дородовое излитие околоплодных вод

2-ой период родов, запоздалое излитие околоплодных вод

**514.** Выберите правильный ответ

У роженицы излились околоплодные воды при раскрытии маточного зева на 5 см. Предлежит головка, фиксирована во входе в малый таз.

Диагноз

- конец 1 периода родов, раннее излитие вод
- 1-й период родов, дородовое излитие вод
- 2-й период родов, раннее излитие вод
- 2-й период родов, запоздалое излитие вод

**515.** Выберите правильный ответ

Предполагаемый срок родов, если 1-ый день последней менструации 10 января

- 17 октября
- 6 сентября
- 11 ноября
- 21 декабря

## МДК.02.02. Соматические заболевания, отравления и беременность

**516.** Выберите правильный ответ

Сжимающие боли за грудиной, иррадиирующие под левую лопатку, продолжительностью 5-10 минут, характерны для

- стенокардии
- бактериального эндокардита
- гипертонической болезни
- ревматического эндокардита

**517.** Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при приступе стенокардии

- нитроглицерин под язык
- астмопент ингаляционно
- димедрол подкожно
- преднизолон внутрь

**518.** Выберите правильный ответ

Аэрозольная форма нитроглицерина

- нитроминт
- нитронг
- нитросорбид
- нитрогранулонг

**519.** Выберите правильный ответ

Для расширения коронарных артерий применяют

- нитроглицерин
- гепарин
- морфин
- панангин

**520.** Выберите правильный ответ

Продукты, богатые калием

- изюм, курага
- конфеты, печенье
- молоко, творог
- мясо, рыба

**521.** Выберите правильный ответ

Клинические симптомы кардиогенного шока

- резкое снижение АД, частый нитевидный пульс
- лихорадка, кашель с «ржавой» мокротой
- лихорадка, лимфаденопатия
- резкое повышение АД, напряженный пульс

**522.** Выберите правильный ответ

Коллапс - проявление острой недостаточности

- сосудистой
- левожелудочковой
- правожелудочковой
- коронарной

**523.** Выберите правильный ответ

Клокочущее дыхание и розовая пеннистая мокрота наблюдаются при

- отеке легких
- коллапсе
- обмороке
- бронхоспазме

**524.** Выберите правильный ответ

Отеки нижних конечностей, асцит, увеличение печени наблюдаются при

- недостаточности кровообращения
- инфаркте миокарда
- стенокардии
- гипертонической болезни

**525.** Выберите правильный ответ

Массивные, распространенные по всему телу отеки - это

- анасарка
- асцит
- гидроторакс

гидроторакс

**526.** Выберите правильный ответ

Отеки сердечного происхождения больше выражены

вечером на ногах

утром на ногах

утром на лице

вечером на лице

**527.** Выберите правильный ответ

При наличии отеков пациентке рекомендуют

ограничение приема жидкости и соли

ограничение приема белков и жиров

увеличение приема жидкости и соли

увеличение приема белков и жиров

**528.** Выберите правильный ответ

ЧСС 100 уд/мин. - это

тахикардия

брадикардия

экстрасистолия

норма

**529.** Выберите правильный ответ

АД 170/100 мм.рт.ст. - это

гипертензия

гипотензия

коллапс

норма

**530.** Выберите правильный ответ

Основная причина развития острого бронхита

ОРВИ

курение

алкоголизм

переохлаждение

**531.** Выберите правильный ответ

Основная причина развития хронического бронхита

курение

ОРВИ

переохлаждение

гиповитаминоз

**532.** Выберите правильный ответ

Основная жалоба пациентки при обструктивном бронхите

одышка

головная боль

повышение температуры

слабость

**533.** Выберите правильный ответ

Данные аускультации при бронхите

сухие и влажные хрипы

крепитация

бронхиальное дыхание

шум трения плевры

**534.** Выберите правильный ответ

При остром бронхите отмечается кашель с мокротой

слизистой

«ржавой»

розовой пенистой

стекловидной

**535.** Выберите правильный ответ

Осложнение хронического бронхита

эмфизема легких

плеврит

туберкулез

абсцесс легкого

**536.** Выберите правильный ответ

Основная жалоба при бронхиальной астме

удушье

кашель с гнойной мокротой

боль в грудной клетке

кровохарканье

**537.** Выберите правильный ответ

Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы

сидя, опираясь о колени

горизонтальное, с приподнятыми ногами

лежа на боку

горизонтальное

**538.** Выберите правильный ответ

Аускультативные данные при приступе бронхиальной астмы

сухие свистящие и влажные разнокалиберные хрипы

крепитация

везикулярное дыхание

шум трения плевры

**539.** Выберите правильный ответ

При приступе бронхиальной астмы противопоказано применение препарата

морфина

беротека

эуфиллина

астмопента

**540.** Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы

сальбутамол

кодеин

либексин

тусупрек

**541.** Выберите правильный ответ

Наиболее информативный метод диагностики пневмонии

рентгенография грудной клетки

анализ крови

анализ мокроты

плевральная пункция

**542.** Выберите правильный ответ

Осложнение очаговой пневмонии

абсцесс легкого

бронхит

туберкулез

рак легкого

**543.** Выберите правильный ответ

Мокроту для бактериологического исследования собирают в

стерильную банку

сухую банку

- стерильную пробирку
- сухую пробирку

**544.** Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при гипертоническом кризе

- каптоприл, нифедипин
- кордиамин, кофеин
- мезатон, адреналин
- преднизолон, гидрокортизон

**545.** Выберите правильный ответ

Противопоказание для промывания желудка

- желудочное кровотечение
- отравление алкоголем
- отравление лекарствами
- пищевое отравление

**546.** Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при печеночной колике

- дротаверин, баралгин
- кордиамин, валидол
- гепарин, димедрол
- мезатон, лазикс

**547.** Выберите правильный ответ

Триада симптомов при остром гломерулонефрите

- гематурия, отеки, гипертония
- пиурия, бактериурия, гипертония
- гематурия, бактериурия, отеки
- лейкоцитурия, цилиндрурия, отеки

**548.** Выберите правильный ответ

Слабость, обмороки, извращение вкуса и обоняния наблюдаются при анемии

- железодефицитной
- гипопластической
- гемолитической
- В12-дефицитной

**549.** Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при гипогликемической коме

- глюкоза в/в
- дибазол в/в
- инсулин п/к
- гепарин в/в

**550.** Выберите правильный ответ

Характерный запах изо рта при гипергликемической коме

- ацетона
- аммиака
- алкоголя
- тухлых яиц

**551.** Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при анафилактическом шоке

- адреналин, преднизолон, физиологический раствор
- атропин, морфин, баралгин
- дибазол, клофелин, лазикс
- корвалол, строфантин, лазикс

**552.** Выберите правильный ответ

Основная причина острого гломерулонефрита

- бета гемолитический стрептококк
- кишечная палочка
- синегнойная палочка
- протей

**553.** Выберите правильный ответ

Заболевание, при котором развивается почечная колика

- мочекаменная болезнь
- пиелонефрит
- цистит
- острый гломерулонефрит

**554.** Выберите правильный ответ

Фитотерапия при пиелонефрите

- брусника, толокнянка
- валериана, пустырник
- алтей, термосис
- женьшень, элеутерококк

**555.** Выберите правильный ответ

Заболевание, при котором наблюдаются тахикардия, экзофтальм, тремор

- диффузный токсический зоб
- гигантизм
- гипотиреоз
- сахарный диабет

**556.** Выберите правильный ответ

При лечении железодефицитной анемии следует увеличить употребление

- красного мяса
- молока
- сливочного масла
- бобовых

**557.** Выберите правильный ответ

Содержание гемоглобина в норме у женщин (г/л)

- 120-140
- 130-160
- 160-180
- 180-200

**558.** Выберите правильный ответ

Заболевание, при котором наблюдается красный «лакированный» язык

- В12-дефицитная анемия
- железодефицитная анемия
- острый лейкоз
- гемофилия

**559.** Выберите правильный ответ

Клинические симптомы почечной колики

- боль в пояснице, иррадиирующая по ходу мочеточника
- боль в пояснице, иррадиирующая под левую лопатку
- тошнота, рвота
- лихорадка, головная боль

**560.** Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при почечной колике

- дротаверин, но-шпа
- морфин, гепарин
- нитроглицерин, анальгин
- пентамин, дибазол

**561.** Выберите правильный ответ

Клинические симптомы острого цистита

- рези при мочеиспускании
- повышение АД
- отеки

метеоризм

**562.** Выберите правильный ответ

При острой кровопотере развивается анемия

постгеморрагическая

В12-дефицитная

гипопластическая

желездефицитная

**563.** Выберите правильный ответ

Кожа и слизистые оболочки при желездефицитной анемии

бледные

бледно-желтушные

цианотичные

гиперемированные

**564.** Выберите правильный ответ

Клинические симптомы гипогликемического состояния

чувство голода, потливость

тахикардия, экзофтальм

жажда, полиурия

изжога, отрыжка

**565.** Выберите правильный ответ

Причина кетоацидотической комы

недостаточные дозы инсулина

передозировка инсулина

переохлаждение

перегревание

**566.** Выберите правильный ответ

Количество эритроцитов в 1 л крови в норме у женщин

3,7-4,7 x 10 в 9

4,5-5,0 x 10 в 9

3,9-4,0 x 10 в 9

4-4,5 x 10 в 12

**567.** Выберите правильный ответ

Для профилактики эндемического зоба целесообразнее йодировать

хлеб, поваренную соль

растительное масло, сливочное масло

конфеты, шоколад

молоко, сметану

**568.** Выберите правильный ответ

Предрасполагающий фактор развития острого гломерулонефрита

очаг хронической инфекции

перегревание

избыточный прием углеводов;

стрессы

**569.** Выберите правильный ответ

Диета №7 ограничивает количество

соли и жидкости

белков и углеводов

белков и жидкости

соли и углеводов

**570.** Выберите правильный ответ

Для анализа мочи при остром гломерулонефрите характерны

гематурия, протеинурия

глюкозурия, полиурия

лейкоцитурия, бактериурия

пиурия, протеинурия

**571.** Выберите правильный ответ

Основные клинические симптомы острого гломерулонефрита

гипертония, отеки

запор, метеоризм

слабость, недомогание

тошнота, рвота

**572.** Выберите правильный ответ

Больная выделила за сутки 150 мл мочи - это

олигурия

анурия

странгурия

никтурия

**573.** Выберите правильный ответ

Учащенное мочеиспускание

полидипсия

полиурия

дизурия

поллакиурия

**574.** Выберите правильный ответ

Норма пульса (уд. в мин.)

60-80

40-70

16-20

70-90

**575.** Выберите правильный ответ

Гипогликемия у больной сахарным диабетом может быть вызвана

введением неадекватно большой дозы инсулина

приемом большого количества пищи

развитием острого инфекционного заболевания

отсутствие физической нагрузки

**576.** Выберите правильный ответ

Характерные клинические проявления тиреотоксикоза

стойкая тахикардия снижение массы тела

повышенная раздражительность

снижение интеллекта

сонливость

запоры

**577.** Выберите правильный ответ

Сахарный диабет I типа требует

постоянного лечения инсулином

гипохолестериновой диеты

снижение физической нагрузки

диеты с повышенной калорийностью

**578.** Выберите правильный ответ

Фактор риска сахарного диабета

наследственная предрасположенность

гипертоническая болезнь

хронический гепатит

хронический энтерит

**579.** Выберите правильный ответ

Для сахарного диабета I типа характерно

острое начало заболевания

избыточная масса тела

отсутствие склонности к кетоацидозу

не требует лечения инсулином

**580.** Выберите правильный ответ

Для сахарного диабета II типа наиболее характерно

возраст к началу болезни старше 40 лет

лечение инсулином

снижения уровня инсулина в сыворотке крови

гиперлипидемия

**581.** Выберите правильный ответ

Жалобы на слабость, головокружение, сухость кожи, извращенный вкус, ломкость волос характерны

железодефицитной анемии

для острого лейкоза

постгеморрагической анемии

для болезни Аддисона-Бирмера

**582.** Выберите правильный ответ

Особенности диетотерапии больных с железодефицитной анемией

включение в рацион красного мяса, гранатов, овощей

ограничение углеводов, жиров, больше витаминов

больше включать в пищу жиров, углеводов

больше шоколада, овощей, фруктов

**583.** Выберите правильный ответ

Причина развития эндемического зоба

недостаток йода в почве и воде

избыток йода в пище

избыток йода в почве, воде

недостаток железа в пище

**584.** Выберите правильный ответ

Неспецифические включения в мокроте при бронхиальной астме

эозинофилы

эластические волокна

атипичные клетки

лейкоциты

**585.** Выберите правильный ответ

Профилактика обострения бронхиальной астмы

прекращение контакта с аллергеном

устранение гиподинамии

отказ от алкоголя

сбалансированное питание

**586.** Выберите правильный ответ

Пикфлоуметрия - это определение

пиковой скорости выдоха

жизненной емкости легких

остаточного объема

дыхательного объема

**587.** Выберите правильный ответ

Осложнение пневмонии

острая дыхательная недостаточность

лихорадка

боль в грудной клетке

лёгочное кровотечение

**588.** Выберите правильный ответ

При критическом снижении температуры тела может развиваться

коллапс

острая дыхательная недостаточность

острая коронарная недостаточность

легочное кровотечение

**589.** Выберите правильный ответ

При длительном применении антибиотиков у пациента может развиваться

дисбактериоз

лихорадка

отеки

увеличение массы тела

**590.** Выберите правильный ответ

Основной причиной развития заболеваний сердечно-сосудистой системы является

гиперлипидемия

природно-экологические факторы

неблагоприятные климатические условия

рациональное питание

**591.** Выберите правильный ответ

Нормальный уровень холестерина в крови у взрослых

5,2 ммоль/л

4,0 ммоль/л

2,8 ммоль/л

6,9 ммоль/л

**592.** Выберите правильный ответ

При ревматизме чаще поражается клапан сердца

митральный

аортальный

пульмональный

трехстворчатый

**593.** Выберите правильный ответ

Поражение кожи при ревматизме

кольцевидная эритема

диффузный цианоз

сосудистые звездочки

акроцианоз

**594.** Выберите правильный ответ

При лечении ревматизма с патогенетической целью применяются

нестероидные противовоспалительные препараты

нитраты

анальгетики

мочегонные

**595.** Выберите правильный ответ

Возможные осложнения при приеме преднизолона

повышение АД, гипергликемия, ожирение

головная боль, снижение АД

одышка, легочное кровотечение

лихорадка, нарушение слуха

**596.** Выберите правильный ответ

Для вторичной профилактики ревматизма применяют

бициллин 3

анальгин

димедрол

фуросемид

**597.** Выберите правильный ответ

Бициллинопрофилактика при ревматизме проводится с момента последнего обострения в течение

- 5 лет
- 1 года
- 2 лет
- 6 месяцев

**598.** Выберите правильный ответ

Основная причина приобретенных пороков сердца

- ревматизм
- инфаркт миокарда
- стенокардия
- гипертоническая болезнь

**599.** Выберите правильный ответ

Синюшное окрашивание губ и кончиков пальцев - это

- акроцианоз
- иктеричность
- диффузный цианоз
- гиперемия

**600.** Выберите правильный ответ

Гидроперикард - это

- застойная жидкость в полости перикарда
- массивный отек организма
- жидкость в полости плевры
- воспаление перикарда

**601.** Выберите правильный ответ

Частота сердечных сокращений 110 уд/мин. - это

- тахикардия
- брадикардия
- экстрасистолия
- норма

**602.** Выберите правильный ответ

Основные симптомы гипертонического криза

- головная боль, головокружение, мелькание мушек перед глазами
- кровохарканье, головная боль, одышка
- изжога, рвота, шум в ушах
- отрыжка, слабость

**603.** Выберите правильный ответ

При лечении гипертонической болезни применяются

- эналаприл, атенолол
- дигоксин, димедрол
- целанид, корвалол
- атропин, аспаркам

**604.** Выберите правильный ответ

Осложнения гипертонической болезни

- инсульт, инфаркт миокарда
- обморок, коллапс
- ревматизм, порок сердца
- пневмония, плеврит

**605.** Выберите правильный ответ

Твердый напряженный пульс наблюдается при

- гипертоническом кризе
- кардиогенном шоке
- коллапсе
- обмороке

**606.** Выберите правильный ответ

Осложнения атеросклероза

- инсульт, инфаркт миокарда
- асцит, анасарка
- пиелонефрит, цистит
- пневмония, бронхит

**607.** Выберите правильный ответ

Симптом атеросклероза коронарных артерий

- загрудинная боль
- головная боль
- одышка
- тошнота

**608.** Выберите правильный ответ

Нитрат короткого действия

- нитроглицерин
- нитрогранулонг
- сустак-форте
- оликард

**609.** Выберите правильный ответ

Эффект действия нитроглицерина наступает через (мин)

- 1-3
- 10-15
- 20-25
- 30-40

**610.** Выберите правильный ответ

Побочное действие нитроглицерина

- головная боль
- лихорадка
- отеки
- асцит

**611.** Выберите правильный ответ

Длительность боли при стенокардии не более

- 30 минут
- 60 минут
- 120 минут
- 180 минут

**612.** Выберите правильный ответ

Для лечения стенокардии используются

- нитраты, бета-адреноблокаторы
- анальгетики, наркотики
- гипотензивные, диуретики
- ганглиоблокаторы, диуретики

**613.** Выберите правильный ответ

Основной симптом ангинозной формы инфаркта миокарда

- загрудинная боль
- головная боль
- отеки на ногах
- сердцебиение

**614.** Выберите правильный ответ

Осложнение инфаркта миокарда

- кардиогенный шок
- артриты
- повышение АД
- одышка

**615.** Выберите правильный ответ

Основной симптом астматической формы инфаркта миокарда

- приступ удушья

- загрудинная боль
- боль в животе
- головная боль

**616.** Выберите правильный ответ

Появление удушья, обильной пенистой розовой мокроты при инфаркте миокарда является проявлением

- отека легких
- кровохарканья
- легочного кровотечения
- пневмонии

**617.** Выберите правильный ответ

Экстрасистолия - это

- преждевременное сокращение сердца
- увеличение частоты сердечных сокращений
- нарушение проводимости
- уменьшение частоты сердечных сокращений

**618.** Выберите правильный ответ

При записи ЭКГ на правую руку накладывают электрод

- красный
- желтый
- зелёный
- черный

**619.** Выберите правильный ответ

Транспортировка больного с не осложненным инфарктом миокарда

- на носилках
- в кресле-каталке
- самостоятельное передвижение
- передвижение в сопровождении медработника

**620.** Выберите правильный ответ

Первая помощь при обмороке

- рефлекторное воздействие нашатырного спирта
- введение мезатона
- введение пентамина
- проведение оксигенотерапии через пеногасители

**621.** Выберите правильный ответ

После восстановления сознания при обмороке необходимо

- напоить пациентку крепким горячим чаем
- поставить банки
- поставить горчичники
- провести кровопускание

**622.** Выберите правильный ответ

Предпочтительны в рационе пациента с атеросклерозом

- растительные жиры
- мясо
- кофе, чай
- продукты, богатые углеводами

**623.** Выберите правильный ответ

Основной симптом гастралгической формы инфаркта миокарда

- боль в животе
- головная боль
- загрудинная боль
- приступ удушья

**624.** Выберите правильный ответ

Подготовка пациента к эндоскопическому исследованию пищевода, желудка и 12-перстной кишки

- вечером - легкий ужин, утром - натощак
- вечером - очистительная клизма
- вечером и утром - очистительная клизма
- подготовки не требуется

**625.** Выберите правильный ответ

Беззондовое исследование секреторной функции желудка

- ацидотест
- глюкозотест
- рентгенография
- лапароскопия

**626.** Выберите правильный ответ

Острый гломерулонефрит возникает после ангины через

- 1-2 дня
- 3-4 дня
- 1-2 недели
- 1-2 месяца

**627.** Выберите правильный ответ

Отеки почечного происхождения появляются

- утром на ногах
- утром на лице
- вечером на ногах
- вечером на лице

**628.** Выберите правильный ответ

Ранним проявлением развивающихся скрытых отеков является

- увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза
- гидроперикард
- увеличение живота
- гидроторакс

**629.** Выберите правильный ответ

При остром гломерулонефрите моча имеет цвет

- мясных помоев
- пива
- соломенно-желтый
- бесцветный

**630.** Выберите правильный ответ

Моча цвета "мясных помоев" обусловлена содержанием большого количества

- эритроцитов
- лейкоцитов
- цилиндров
- бактерий

**631.** Выберите правильный ответ

Суточный диурез у пациента с острым гломерулонефритом составил 400 мл - это

- олигурия
- анурия
- полиурия
- протеинурия

**632.** Выберите правильный ответ

Анурия - это

- отсутствие мочи

- нормальное количество мочи
- преобладание ночного диуреза над дневным
- много мочи

**633.** Выберите правильный ответ

При остром гломерулонефрите пациенту рекомендуется режим

- постельный
- строгий постельный
- палатный
- общий

**634.** Выберите правильный ответ

При лечении пациента с острым гломерулонефритом используются

- антибиотики, гормоны, дезагреганты
- анальгетики, спазмолитики
- нитраты, сердечные гликозиды
- сульфаниламиды, нитрофураны

**635.** Выберите правильный ответ

Основная причина острого пиелонефрита

- восходящая инфекция мочевых путей
- нерациональное питание
- переохлаждение
- стрессы

**636.** Выберите правильный ответ

При пиелонефрите преимущественно поражаются почечные

- чашечки
- клубочки
- каналы и клубочки
- каналы

**637.** Выберите правильный ответ

При остром пиелонефрите обычно выявляются

- боль в пояснице, дизурия, лихорадка
- жажда, полиурия, полидипсия
- диспепсия, боль в правом подреберье
- слабость, кожный зуд, артралгии

**638.** Выберите правильный ответ

При остром пиелонефрите в анализе мочи определяются

- лейкоцитурия, бактериурия
- гематурия, протеинурия
- глюкозурия, цилиндрурия
- глюкозурия, протеинурия

**639.** Выберите правильный ответ

Рентгенологическое контрастное исследование почек и мочевыводящих путей

- экскреторная урография
- томография
- хромоцистоскопия
- ирригоскопия

**640.** Выберите правильный ответ

Железодефицитная анемия по цветовому показателю

- гипохромная
- гиперхромная
- нормохромная
- апластическая

**641.** Выберите правильный ответ

При железодефицитной анемии в анализе крови наблюдаются

- снижение гемоглобина и цветового показателя
- лейкопения, уменьшение СОЭ
- лейкоцитоз, увеличение СОЭ
- увеличение гемоглобина и эритроцитов

**642.** Выберите правильный ответ

Препарат железа для парентерального применения

- феррум-лек
- аскорутин
- панзинорм
- цианокобаламин

**643.** Выберите правильный ответ

При лечении железодефицитной анемии используется

- актиферрин
- аскорутин
- панзинорм
- цианокобаламин

**644.** Выберите правильный ответ

Для улучшения всасывания препаратов железа используют

- аскорбиновую кислоту
- цианокобаламин
- ретинол
- эргокальциферол

**645.** Выберите правильный ответ

Нормальные показатели глюкозы в крови натощак (ммоль/л)

- 3,3-5,5
- 2,2-3,3
- 1,1-2,2
- 6,6-8,8

**646.** Выберите правильный ответ

При диагностике заболеваний щитовидной железы большое значение имеет определение в крови

- гормонов Т3, Т4, ТТГ
- гемоглобина, цветового показателя
- лейкоцитов, СОЭ
- инсулина, глюкагона

**647.** Выберите правильный ответ

При недостаточном содержании йода в пище развивается

- эндемический зоб
- ожирение
- сахарный диабет
- диффузный токсический зоб

**648.** Выберите правильный ответ

Заболевание, при котором суточный диурез может составить более 5 литров

- сахарный диабет
- диффузный токсический зоб
- гипотиреоз
- эндемический зоб

**649.** Выберите правильный ответ

Симптомы сахарного диабета

- жажда, кожный зуд
- отеки, боли в пояснице
- сухой кашель, одышка

- снижение памяти, запоры
- 650.** Выберите правильный ответ  
При сахарном диабете в анализе крови отмечается
- гипергликемия
  - гипопроteinемия
  - гиперпротеинемия
  - гипербилирубинемия

- 651.** Выберите правильный ответ  
При сахарном диабете в анализе мочи отмечается
- глюкозурия
  - бактериурия
  - фосфатурия
  - пиурия

- 652.** Выберите правильный ответ  
Осложнение сахарного диабета
- кетоацидотическая кома
  - гипертонический криз
  - отек легких
  - легочное кровотечение

- 653.** Выберите правильный ответ  
При кетоацидотической коме кожные покровы пациента
- сухие
  - гиперемированные
  - желтушные
  - влажные

- 654.** Выберите правильный ответ  
При гипогликемической коме кожные покровы пациента
- влажные
  - гиперемированные
  - желтушные
  - сухие

- 655.** Выберите правильный ответ  
При гипогликемической коме у пациента в выдыхаемом воздухе определяется
- отсутствие запаха
  - запах аммиака
  - запах ацетона
  - запах алкоголя

- 656.** Выберите правильный ответ  
Препараты, чаще вызывающие аллергическую реакцию
- антибиотики
  - диуретики
  - гипотензивные
  - цитостатики

- 657.** Выберите правильный ответ  
Основные проявления крапивницы
- сыпь, кожный зуд
  - одышка, сухой кашель
  - тошнота, рвота
  - боль за грудиной, одышка

- 658.** Выберите правильный ответ  
Локализация сыпи при крапивнице
- любые участки тела
  - туловище
  - конечности
  - лицо

- 659.** Выберите правильный ответ  
Возможные осложнения при отеке Квинке
- асфиксия
  - кожный зуд
  - судороги
  - непроизвольное мочеиспускание

- 660.** Выберите правильный ответ  
Анафилактический шок чаще возникает при введении лекарственного препарата
- парентерально
  - ингаляционно
  - внутрь
  - сублингвально

- 661.** Выберите правильный ответ  
Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию сердца
- разъяснение сущности исследования
  - очистительная клизма
  - подготовки не требуется
  - накануне исследования легкий ужин

### МДК.02.03. Инфекционные заболевания и беременность

- 662.** Выберите правильный ответ  
Основной механизм заражения при кишечных инфекциях
- фекально-оральный
  - воздушно-капельный
  - парентеральный
  - воздушно-пылевой

- 663.** Выберите правильный ответ  
При диагностике кишечных инфекций необходимо проводить бактериологическое исследование
- испражнений
  - мочи
  - крови
  - желчи

- 664.** Выберите правильный ответ

- При пищевой токсикоинфекции рвота
- приносит облегчения
  - не приносит облегчение
  - возникает при резком вставании больного
  - не связана с приемом пищи

- 665.** Выберите правильный ответ  
Для клинической картины гриппа характерно
- синдром интоксикации в сочетании с синдромом трахеита
  - диарейный синдром в сочетании с синдромом интоксикации
  - синдром интоксикации в сочетании с менингеальным синдромом
  - синдром интоксикации в сочетании с мочевым синдромом

- 666.** Выберите правильный ответ

При диагностике инфекций верхних дыхательных путей необходимо проводить бактериологическое исследование

- слизи из носа и зева
- крови
- испражнений
- желчи

**667.** Выберите правильный ответ

Гепатиты А и В объединяет

- поражение печени
- меры профилактики
- способ заражения
- поражение селезёнки

**668.** Выберите правильный ответ

Профилактика парентеральных гепатитов В и С

- употребление одноразовых шприцев
- дезинфекция выделений
- употребление кипяченой воды
- кварцевание палат

**669.** Выберите правильный ответ

Вирусный гепатит В и ВИЧ-инфекцию объединяют

- механизм заражения
- поражение лимфатических узлов
- поражение печени
- поражение селезенки

**670.** Выберите правильный ответ

Источник инфекции при вирусных гепатитах

- больные люди
- больные животные
- больные люди и больные животные
- объекты окружающей среды

**671.** Выберите правильный ответ

Для постановки серологической реакции берётся

- кровь
- моча
- мокрота
- кал

**672.** Выберите правильный ответ

Механизм передачи ВИЧ-инфекции

- гемоконтактный
- воздушно-капельный
- фекально-оральный
- контактно-бытовой

**673.** Выберите правильный ответ

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшем количестве

- кровь
- слюна
- слезная жидкость
- грудное молоко

**674.** Выберите правильный ответ

Источник инфекции при ВИЧ-инфекции

- инфицированные люди
- инфицированные животные
- кровососущие насекомые
- грызуны

**675.** Выберите правильный ответ

Для предупреждения внутрибольничного инфицирования ВИЧ-инфекцией в роддоме необходимо проводить

- дезинфекцию и стерилизацию изделий медицинского назначения
- кварцевание помещений
- тщательное проветривание помещения
- санитарно-просветительскую работу среди пациентов стационара

**676.** Выберите правильный ответ

Противовирусную профилактику парентерального заражения ВИЧ-инфекцией, при возникновении аварийных ситуаций, эффективно назначать не позднее

- 2 суток
- 5 суток
- 4 суток
- 10 суток

**677.** Выберите правильный ответ

ВИЧ-инфицированные беременные при отсутствии клинических проявлений заболевания наблюдаются в

- женской консультации и СПИД-центре
- инфекционном стационаре
- женской консультации
- СПИД-центре

**678.** Выберите правильный ответ

Процесс распространения инфекционных болезней среди населения называется

- эпидемический процесс
- профилактика заболеваний
- инфекционный процесс
- клиническое течение болезни

**679.** Выберите правильный ответ

Первым звеном эпидемического процесса является

- источник инфекции
- механизм передачи инфекции
- восприимчивый организм
- окружающая среда

**680.** Выберите правильный ответ

Вторым звеном эпидемического процесса является

- механизм передачи инфекции
- источник инфекции
- восприимчивый организм
- окружающая среда

**681.** Выберите правильный ответ

Третьим звеном эпидемического процесса является

- восприимчивый организм
- источник инфекции
- механизм передачи
- окружающая среда

**682.** Выберите правильный ответ

Противоэпидемические мероприятия, проводимые по отношению к источнику инфекции - это

- изоляция пациента

- дезинфекция
- здоровый образ жизни
- санитарно-гигиеническое просвещение

**683.** Выберите правильный ответ

Противоэпидемические мероприятия, направленные на механизм передачи инфекции - это

- дезинфекция
- изоляция пациента
- здоровый образ жизни
- санитарно-гигиеническое просвещение

**684.** Выберите правильный ответ

Противоэпидемические мероприятия, направленные на восприимчивый организм - это

- иммунопрофилактика
- дезинфекция
- изоляция пациента
- дератизация

**685.** Выберите правильный ответ

Эпидемиологическим очагом является

- место, где находится источник инфекции
- место скопления большого количества людей
- место, где произошло дорожно-транспортное происшествие
- место отдыха людей

**686.** Выберите правильный ответ

Дезинфекция, проводимая в эпидемическом очаге, в присутствии источника инфекции называется

- текущая
- плановая
- заключительная
- профилактическая

**687.** Выберите правильный ответ

Текущую дезинфекцию при лечении пациента на дому проводит

- ухаживающий
- сам пациент
- медицинский работник
- никто не проводит

**688.** Выберите правильный ответ

Сроки наблюдения за эпидемическим очагом определяются

- максимальным инкубационным периодом
- минимальным инкубационным периодом
- средним инкубационным периодом
- числом заболевших

**689.** Выберите правильный ответ

Быстрее всего развиваются эпидемии в группе

- инфекций дыхательных путей
- кишечных инфекций
- кровяных инфекций
- инфекций наружных покровов

**690.** Выберите правильный ответ

Механизмом заражения считается

- процесс перемещения возбудителя из заражённого организма в незаражённый

- употребление заражённой воды
- использование предметов, которыми пользовался инфекционный больной
- употребление инфицированных продуктов

**691.** Выберите правильный ответ

Выделяют заболевания в зависимости от источника инфекции

- антропонозы, зоонозы
- вириозы, бактериозы
- сапронозы, клостридиозы
- риккетииозы, микозы

**692.** Выберите правильный ответ

Медицинский персонал акушерских стационаров подлежит обязательным профилактическим прививкам против

- вирусного гепатита В
- вирусного гепатита А
- бруцеллёза
- полиомиелита

**693.** Выберите правильный ответ

Заражение через укус насекомого – это путь заражения

- трансмиссивный
- контактно-бытовой
- пищевой
- воздушно-капельный

**694.** Выберите правильный ответ

Естественный активный иммунитет - это

- иммунитет, возникающий после перенесённой инфекции
- иммунитет, передающийся от матери к ребёнку
- иммунитет после введения сыворотки
- иммунитет после введения вакцины

**695.** Выберите правильный ответ

Искусственный активный иммунитет это

- иммунитет после введения вакцины
- иммунитет, возникающий после перенесённой инфекции
- иммунитет после введения сыворотки
- иммунитет, передающийся от матери к ребёнку

**696.** Выберите правильный ответ

Фекально-оральный механизм передачи инфекции характерен для

- кишечных инфекций
- кровяных инфекций
- внутриутробных инфекций
- инфекций верхних дыхательных путей

**697.** Выберите правильный ответ

Источником инфекции при сальмонеллёзе являются

- больной человек и животное
- только домашние животные
- только человек (больной и бактерионоситель)
- насекомые

**698.** Выберите правильный ответ

Источником инфекции при дизентерии являются

- только человек (больной и бактерионоситель)
- только домашние животные
- больной человек и животное
- грызуны

**699.** Выберите правильный ответ

Необычно большая заболеваемость, охватывающая все страны и континенты, называется

- пандемией
- эндемией
- эпизоотией
- спорадической формой

**700.** Выберите правильный ответ

При диагностике кишечных инфекций необходимо проводить бактериологическое исследование

- испражнений
- мочи
- крови
- желчи

**701.** Выберите правильный ответ

Летне-осеннюю сезонность имеет

- дизентерия
- грипп
- малярия
- дифтерия

**702.** Выберите правильный ответ

При диагностике инфекций верхних дыхательных путей необходимо проводить бактериологическое исследование

- слизи из носа и зева
- крови
- испражнений
- желчи

**703.** Выберите правильный ответ

Источником инфекции при вирусных гепатитах являются

- больные люди
- больные животные
- больные люди и больные животные
- объекты окружающей среды

**704.** Выберите правильный ответ

Источником инфекции при дифтерии являются

- больные люди и бактериовыделители токсигенной дифтерийной палочки
- больные животные
- больные люди и больные животные
- бактериовыделители нетоксигенной дифтерийной палочки

**705.** Выберите правильный ответ

При подозрении на дифтерию необходимо провести бактериологическое исследование

- слизи из носа и зева
- крови
- испражнений
- желчи

**706.** Выберите правильный ответ

В эпидемическом очаге дифтерии контактным проводят бактериологическое исследование

- слизи из носа и зева
- испражнений
- крови
- желчи

**707.** Выберите правильный ответ

Для специфической профилактики дифтерии применяют

- анатоксин
- антибиотики
- ремантадин
- химиофилактику

**708.** Выберите правильный ответ

Метод лабораторной диагностики, при котором определяются специфические антитела к возбудителю в организме больного, называется

- серологический
- бактериологический
- микроскопический
- вирусологический

**709.** Выберите правильный ответ

Метод лабораторной диагностики, позволяющий установить возбудителя в материале, взятом от больного, называется

- бактериологический
- серологический
- аллергологический
- биологический

**710.** Выберите правильный ответ

При бактериальной дизентерии стул имеет вид

- «ректального плевка»
- «болотной тины»
- «горохового пюре»
- «малинового желе»

**711.** Выберите правильный ответ

Боли в животе при дизентерии

- схваткообразные, усиливаются перед актом дефекации
- постоянные ноющего характера
- не характерны
- появляются только после акта дефекации

**712.** Выберите правильный ответ

При холере стул имеет вид

- «рисового отвара»
- «ректального плевка»
- «малинового желе»
- «болотной тины»

**713.** Выберите правильный ответ

Для специфической профилактики гриппа применяют

- вакцину
- антибиотики
- интерферон
- химиофилактику

**714.** Выберите правильный ответ

При ВИЧ-инфекции источником инфекции являются

- инфицированные люди
- инфицированные животные
- кровососущие насекомые
- грызуны.

**715.** Выберите правильный ответ

Методами иммуноферментного анализа (ИФА) и иммуноблота (ИБ) определяются

- антитела
- антигены

#### МДК.02.04. Педиатрия

**717.** Выберите правильный ответ

Длительность периода новорожденности (дней)

- 28
- 30
- 40
- 60

**718.** Выберите правильный ответ

Длительность перинатального периода

- с 22-й недели внутриутробной жизни по 7-е сутки после рождения
- с 38-й недели внутриутробной жизни до рождения
- с 28-й недели внутриутробной жизни до рождения
- с 28-й недель внутриутробной жизни по 3-е сутки после рождения

**719.** Выберите правильный ответ

Квалифицированную медицинскую помощь новорожденным осуществляют

- перинатальные центры, акушерские стационары
- организации терапевтического профиля
- амбулатории
- медицинские организации хирургического профиля

**720.** Выберите правильный ответ

Аntenатальный период

- от момента зачатия до появления первых схваток
- от момента пережания пуповины и до 28 дня жизни новорожденного ребенка
- период родов
- от момента зачатия до 28-ой недели беременности

**721.** Выберите правильный ответ

Интранатальный период

- период родов
- от момента пережания пуповины и до 28 дня жизни новорожденного ребенка
- период от момента зачатия до появления первых схваток
- от момента зачатия до 28-ой недели беременности

**722.** Выберите правильный ответ

Продолжительность раннего неонатального периода

- вирусы
- фермент обратная транскриптаза

**716.** Выберите правильный ответ

Характеристика бубона при чуме

- резко болезненный, спаян с окружающими тканями
- малоболезненный, не спаян с окружающими тканями
- безболезненный, подвижный
- периодическая болезненность при физической нагрузке

- 7 дней

- 8 дней
- 10 дней
- 14 дней

**723.** Выберите правильный ответ

Продолжительность позднего неонатального периода

- с 8 дня жизни по 28 день
- 8 дней
- 10 дней
- 14 дней

**724.** Выберите правильный ответ

Акушерка может проконсультировать родильницу по вопросам

- грудного вскармливания и ухода за новорожденным
- состояния здоровья новорожденного
- обследования новорожденного
- лечения ее ребенка

**725.** Выберите правильный ответ

Важная составляющая часть качественной медицинской помощи родителям новорожденного

- психологическая удовлетворенность родителей от общения с медработником
- материальная поддержка со стороны медработника
- равнодушное отношение со стороны медработников
- отсутствие общения с медработником

**726.** Выберите правильный ответ

Средние показатели массы тела доношенного новорожденного (г)

- 3000-3500
- 2000-2300
- 3800-3900
- 3700-4000

**727.** Выберите правильный ответ

Средние показатели окружности головы доношенного новорожденного (см)

- 34-36
- 28-32
- 39-40
- 37-38

**728.** Выберите правильный ответ

Средние показатели окружности груди доношенного новорожденного (см)

- 32-34
- 30-32
- 34-35
- 35-36

**729.** Выберите правильный ответ

Средние показатели роста доношенного новорожденного (см)

- 50-52
- 48-50
- 55-58
- 63-64

**730.** Выберите правильный ответ

Соотношение окружности головы и окружности груди новорожденного

- окружность головы больше окружности груди на 2 см
- окружность головы больше окружности груди на 5-6 см
- окружность головы больше окружности груди на 3-4 см
- окружность головы меньше окружности груди на 2 см

**731.** Выберите правильный ответ

Цвет кожных покровов новорожденного первого дня жизни

- гиперемированные
- бледные
- цианотичные
- желтушные

**732.** Выберите правильный ответ

Мышечный тонус конечностей у доношенного новорожденного

- гипертонус сгибателей
- сниженный
- гипертонус разгибателей
- нормотония

**733.** Выберите правильный ответ

У здоровых доношенных новорожденных сосательный и глотательный рефлексы

- выражены хорошо
- ослаблены
- незначительно ослаблены
- повышены

**734.** Выберите правильный ответ

Число дыханий здорового новорожденного в 1 минуту

- 40-60
- 20-40
- 60-80
- 20-30

**735.** Выберите правильный ответ

Число сердечных сокращений у здорового новорожденного (уд. в 1 мин)

- 120-160
- 80-100
- 110-115
- 160-180

**736.** Выберите правильный ответ

Характер стула у новорожденного ребенка после рождения

- меконеальный
- переходный
- оформленный
- жидкий

**737.** Выберите правильный ответ

Основной признак определения доношенности

- срок гестации
- масса тела
- длина тела
- окружность головы и груди

**738.** Выберите правильный ответ

Срок гестации для доношенного ребенка (недель)

- 37-41 и 6 дней
- 36-39
- 40-43
- 36-38

**739.** Выберите правильный ответ

Критерии зрелости новорожденного определяются признаками

- морфологическими и функциональными
- сроком отпадения пуповинного остатка
- сроком появления переходных состояний
- прибавкой в массе тела

**740.** Выберите правильный ответ

Персонал работает в масках в родильном доме

- в отделениях новорожденных при проведении инвазивных манипуляций
- при приеме пациентов
- при заполнении медицинской документации
- постоянно

**741.** Выберите правильный ответ

Сроки ранней выписки новорожденных из родильного дома на

- 3-4-ые сутки
- 6-8-ые сутки
- 1-2-ые сутки
- 5-6-ые сутки

**742.** Выберите правильный ответ

В родильном доме посещение родильниц родственниками и присутствие их на родах

- разрешается
- не разрешается
- по усмотрению акушерки
- по усмотрению медицинской сестры

**743.** Выберите правильный ответ

Для совместного пребывания матери и ребенка предназначаются

- одно- или двухместные палаты
- многоместные палаты
- мельцеровские боксы
- палаты интенсивной терапии

**744.** Выберите правильный ответ

Заполнение палаты для совместного пребывания матери и ребенка происходит в течение

- 1 суток
- 2 суток

3 суток

по мере заполнения

**745.** Выберите правильный ответ

Детские палаты при раздельном пребывании матери и ребенка заполняются в течение

3 суток

2 суток

1 суток

по мере заполнения

**746.** Выберите правильный ответ

При совместном пребывании матери и ребенка грудное вскармливание проводится

по требованию

6 раз в сутки

7 раз в сутки

на усмотрение матери

**747.** Выберите правильный ответ

В послеродовом физиологическом отделении родильного дома новорожденный ребенок должен находиться в палате с матерью

совместно

раздельно

не имеет значения

по усмотрению матери

**748.** Выберите правильный ответ

При уходе за новорожденным в родильном зале используют пеленки

стерильные

постиранные и проглаженные

любые

постиранные

**749.** Выберите правильный ответ

Стерильные пинцеты, корнцанги для взятия стерильного материала при уходе за новорожденным меняют

перед каждой обработкой новорожденного

через 6 часов

через 4 часа

каждые 2 часа

**750.** Выберите правильный ответ

Лекарственные формы для новорожденных

стерильные, в мелкой расфасовке, для однократного применения

в любой расфасовке

стерильные, в любой расфасовке

расфасовка не имеет значения

**751.** Выберите правильный ответ

При обнаружении признаков инфекционного заболевания новорожденного в родильном доме необходимо

срочно вывести из стационара

изолировать в отдельную палату

перевести его в наблюдательное отделение

продолжать наблюдение и лечение

**752.** Выберите правильный ответ

Температура воздуха в палатах для доношенных новорожденных в градусах С

22-24

24-26

20-22

18-20

**753.** Выберите правильный ответ

Детские кроватки в палатах следует располагать друг от друга на расстоянии

0,5 м

1 м

1,5 м

0,7 м

**754.** Выберите правильный ответ

Предметы ухода за новорожденным хранятся

в сухой стерильной упаковке

в дезинфицирующем растворе

в дистиллированной воде

на открытом лотке

**755.** Выберите правильный ответ

По эпидемиологическим показаниям возможна выписка новорожденного домой после родов на

2-3 сутки

1-2 сутки

6-7сутки

8-9 сутки

**756.** Выберите правильный ответ

Ранняя выписка из родильного дома способствует

снижению заболеваемости внутрибольничными инфекциями

росту маститов

увеличению послеродовых инфекций

усилению лактации

**757.** Выберите правильный ответ

Переходными состояниями называют

реакции новорожденного, вызванные приспособлением к внеутробной жизни

реакции новорожденного, вызванные приспособлением к внутриутробной жизни

реакции новорожденного, вызванные приспособлением к родам

реакции новорожденного, вызванные родами

К физиологическим переходным состояниям относится

- половой криз
- опрелости
- цианоз кожи
- потница

**762.** Выберите правильный ответ

Физиологическая желтуха обусловлена

- незрелостью печени и повышенным гемолизом эритроцитов
- неправильным вскармливанием
- переохлаждением
- перегреванием

**763.** Выберите правильный ответ

Половой криз обусловлен

- попаданием половых гормонов матери во время беременности и родов к плоду
- незрелостью ЦНС
- незрелостью половых органов
- неправильным вскармливанием

**764.** Выберите правильный ответ

Для физиологической желтухи характерно

- появляется на 3 день жизни
- состояние ребенка ухудшается
- самостоятельно не исчезает
- требует лечения

**765.** Выберите правильный ответ

Первоначальная убыль массы тела новорожденного наблюдается

- в первые 3 дня жизни
- в первые 3-4 дня жизни
- в первые 5-6 дней жизни
- в первые 7-8 дней жизни

**766.** Выберите правильный ответ

Физиологическое снижение массы тела новорожденного составляет от массы тела при рождении

- до 10%
- 11-15%
- 16-20%
- 15-20%

**767.** Выберите правильный ответ

Продолжительность физиологической эритемы у новорожденного

- 1-2 дня
- 3-4 дня
- 5-6 дней
- 7-8 дней

**768.** Выберите правильный ответ

Половой криз у новорожденного проявляется

- увеличением грудных желез
- повышением массы тела
- повышением температуры тела
- снижением температуры тела

**769.** Выберите правильный ответ

Физиологическая желтуха у доношенного новорожденного исчезает

- на 10-12-ый день жизни
- на 5-6-ой день жизни

на 21-ый день

на 3-4-ый день жизни

**770.** Выберите правильный ответ

Для профилактики опрелостей складки кожи новорожденного обрабатывают

- стерильным растительным маслом
- физиологическим раствором
- раствором фурацилина
- раствором полиглюкина

**771.** Выберите правильный ответ

Пупочную ранку ежедневно в родильном доме обрабатывают

- 3% раствором перекиси водорода, 5% раствором перманганата калия
- 70% раствором этилового спирта, 5% раствором йода
- 90% раствором этилового спирта, 3% раствором калия перманганата
- 90% раствором этилового спирта, 3% раствором йода

**772.** Выберите правильный ответ

Для очищения носовых ходов новорожденного используют

- ватные жгутики, смоченные в физиологическом растворе
- сухие ватные жгутики
- марлевые салфетки
- ватные шарики

**773.** Выберите правильный ответ

Для утреннего туалета глаз новорожденного используют

- тёплую очищенную воду
- раствор калия перманганата
- раствор перекиси водорода
- вазелиновое масло

**774.** Выберите правильный ответ

Полость рта здоровому новорожденному обрабатывают

- не обрабатывают
- ватно-марлевым шариком
- марлевым шариком
- сухим ватным шариком

**775.** Выберите правильный ответ

Для обработки кожных складок применяют

- стерильное растительное масло
- спиртовой раствор йода 1%
- раствор фурацилина
- раствор перекиси водорода 3%

**776.** Выберите правильный ответ

Время заживления пупочной ранки

- 5-7-ые сутки от момента отпадения пуповинного остатка
- 2-ые сутки
- 3-5-ые сутки
- 10-11-ые сутки

**777.** Выберите правильный ответ

Медицинская документация родовспомогательных организаций

- история развития новорожденного

- история болезни новорожденного
- история развития ребенка
- карта профилактических прививок

**778.** Выберите правильный ответ

Пуповинный остаток в родильном доме ведется

- сухим способом
- обязательно ежедневно обрабатывается спиртом
- обязательно ежедневно обрабатывается раствором фурацилина
- обязательно ежедневно обрабатывается раствором пероксида

**779.** Выберите правильный ответ

Для предупреждения раздражения и инфицирования кожи следует

- своевременно менять пеленки
- белье стирать моющими средствами
- использовать подсушенные после мочеиспускания пеленки
- прокладывать между слоями пеленок клеенку

**780.** Выберите правильный ответ

Вторичная обработка новорожденного ребенка

- проводится через 4-6 часов после перевода ребенка из родильного зала
- проводится в детской палате сразу после перевода из родильного зала
- проводится в детской палате на 2 сутки жизни
- проводится гигиеническая ванна

**781.** Выберите правильный ответ

Утренняя обработка новорожденного включает

- обработка носовых ходов, глаз, кожных складок, умывание
- проведение гигиенической ванны
- измерение длины тела
- обработка слизистой полости рта

**782.** Выберите правильный ответ

Широкое пеленание показано

- для профилактики дисплазии тазобедренных суставов
- для лучшего развития ребенка
- для закаливания
- вместо гимнастики

**783.** Выберите правильный ответ

Термометрия в родильном зале должна проводиться

- 4-кратно
- 2 раза
- 3-кратно
- только перед переводом в отделение

**784.** Выберите правильный ответ

Для обработки лица новорожденного применяют

- вазелиновое масло
- дистиллированную воду
- салициловый спирт
- физиологический раствор

**785.** Выберите правильный ответ

При переводе новорожденного из родильного зала особое внимание обращают

- на крик ребенка, состояние кожных покровов, состояние пуповинного остатка
- на наличие первородной смазки
- вес ребенка
- длину тела ребенка

**786.** Выберите правильный ответ

Время отпадения пуповинного остатка у доношенного ребенка

- 4-5-ые сутки
- 2-ые сутки
- 5-7-ые сутки
- 10-ые сутки

**787.** Выберите правильный ответ

Уход за новорожденным в основном должна осуществлять

- мама ребенка
- близкие родственники
- другие родственники
- няня

**788.** Выберите правильный ответ

Главным помощником маме в уходе за новорожденным должен быть

- отец ребенка
- бабушки
- другие родственники
- няня

**789.** Выберите правильный ответ

В детском уголке для новорожденного должны находиться

- детская кроватка, пеленальный столик
- телевизор
- мягкая мебель
- большой шкаф

**790.** Выберите правильный ответ

Температурный режим в комнате новорожденного

- 20-22 гр. С
- 18-20 гр. С
- 26-28 гр. С
- 16-18 гр. С

**791.** Выберите правильный ответ

Высокая температура в комнате новорожденного вызывает

- перегревание малыша, высыхание слизистой носа
- удлинение сна
- улучшение сосания
- высокие темпы роста

**792.** Выберите правильный ответ

Уборка в детской комнате проводится

- ежедневно, влажная
- через день, сухая
- 2 раза в неделю, влажная
- ежедневно сухая

**793.** Выберите правильный ответ

Детская кроватка располагается

- параллельно родительской кровати
- возле отопительных приборов
- на солнышке
- в дальнем углу комнаты

**794.** Выберите правильный ответ  
Сроки первого прикладывания новорожденного к груди

- первые 30 минут после рождения
- в первые 3 часа после рождения
- в первые сутки
- через сутки после рождения

**795.** Выберите правильный ответ  
Оптимальное количество кормлений для новорожденных

- по требованию новорожденного
- 6 раз
- через каждые 3 часа
- 7 раз

**796.** Выберите правильный ответ  
Признаки голодания ребенка

- беспокойство после кормления
- срыгивания после кормления
- частый жидкий стул
- частое мочеиспускание

**797.** Выберите правильный ответ  
Состав грудного молока

- вода, белок, жиры, углеводы, ферменты, минералы, витамины
- белок представлен преимущественно казеином
- углеводы представлены альфа-лактозой
- обеспеченность витаминами недостаточна

**798.** Выберите правильный ответ  
Кормление грудью

- способствует послеродовой инволюции матки
- вызывает послеродовые кровотечения
- препятствует инволюции матки
- способствует возникновению новой беременности

**799.** Выберите правильный ответ  
Опасности искусственного вскармливания

- риск возникновения частых респираторных инфекций, аллергии
- высокая вероятность возникновения гипотрофии

- гармоничное развитие
- отсутствие склонности к аллергии

**800.** Выберите правильный ответ  
Значение молозива

- способствует формированию микрофлоры кишечника
- препятствует усвоению и всасыванию зрелого молока
- способствует возникновению выраженной физиологической желтухи
- препятствует удалению мекония

**801.** Выберите правильный ответ  
Лактационный криз

- временное уменьшение количества молока
- наблюдается на 2 недели лактации
- повторяется ежемесячно
- длительность криза 10-14 дней

**802.** Выберите правильный ответ

Факторы становления лактации и рекомендации по грудному вскармливанию

- кормление исключительно грудью в первые месяцы жизни
- убежденность женщины в преимуществе искусственного питания
- неуверенность в способности кормить ребенка грудью

- своевременное введение докорма

**803.** Выберите правильный ответ

Польза раннего прикладывания к груди

- нормализует психоэмоциональное состояние матери и ребенка
- повышает послеродовые кровотечения
- повышает заболеваемость родильниц
- вызывает закупорку млечного протока

**804.** Выберите правильный ответ

Мать при прикладывании ребенка к груди должна

- дать ребенку захватить сосок и ареолу
- нижняя губа должна быть на соске
- во время кормления поддерживать ребенка за затылок
- удерживать грудь пальцами возле соска

**805.** Выберите правильный ответ

Признаки, указывающие на возможные трудности кормления грудью

- слышно чмокание, щелканье при сосании
- сосание продолжительное и слышно глотание
- в конце кормления ребенок отпускает грудь
- после кормления железа мягкая, соски набухшие и вытянуты вперед

**806.** Выберите правильный ответ

Обработка груди перед кормлением ребенка проводится

- грудным молоком
- кипяченой водой с мылом
- 1% р-ром бриллиантового зеленого
- эмульсией с антибиотиком

**807.** Выберите правильный ответ

Абсолютное противопоказание к грудному вскармливанию

- ВИЧ у матери
- ОРВИ у матери
- мастит у матери
- трещины сосков у матери

**808.** Выберите правильный ответ

Лекарственный препарат, стимулирующий лактацию

- апилак
- аскорбиновая кислота
- димедрол
- пенициллин

**809.** Выберите правильный ответ

Растительное средство, стимулирующее лактацию

- крапива двудомная
- зверобой
- ромашка
- толокнянка

**810.** Выберите правильный ответ

Абсолютное противопоказание к грудному вскармливанию

- онкологическое заболевание у матери
- мастит у матери
- пиелонефрит у матери
- трещины сосков у матери

**811.** Выберите правильный ответ

Показатель неонатальной смертности

- число детей умерших в возрасте до 1 года из 1000 живорожденных
- число детей умерших в возрасте до 5 лет из 1000 живорожденных
- число детей, умерших в течении первых полных 28 суток жизни из 1000 живорожденных
- число мертворожденных из 1000 родившихся живыми

**812.** Выберите правильный ответ

Впервые термины «неонатология» и «неонатолог» были предложены американским педиатром

- Шаффером
- Спокком
- Багеллярдом
- Бюденом

**813.** Выберите правильный ответ

Забор крови при проведении неонатального скрининга проводится

- в течение 24-48 часов после рождения
- сразу после кормления
- через 6 часов после кормления
- через 12 часов после кормления

**814.** Выберите правильный ответ

Лекарственное средство для обработки пуповины

- 5% раствор перманганата калия
- вазелиновое (растительное) масло
- йоданат натрия
- физиологический раствор

**815.** Выберите правильный ответ

Лекарственное средство при окончательной перевязке пуповины

- этиловый спирт 70%
- вазелиновое масло
- раствор пероксида водорода
- раствор калия перманганата

**816.** Выберите правильный ответ

Для профилактики офтальмобленореи используют

- 1% тетрациклиновую мазь
- водный раствор фурацилина
- раствор сульфацила натрия
- физиологический раствор

**817.** Выберите правильный ответ

Сведения идентификационных браслетов новорожденного ребенка

- фамилия, имя и отчество матери, пол ребенка, дата и час рождения, вес и рост
- фамилия, имя и отчество матери, пол ребенка, окружность головы, окружность груди
- фамилия, имя и отчество матери, пол ребенка, время прикладывания к груди

фамилия, имя и отчество матери, пол ребенка, пограничные состояния

**818.** Выберите правильный ответ

Время оценки по шкале Апгар

- на 1 и 5 минуте
- на 1 и 2 минуте
- на 2 и 10 минуте
- на 5 и 10 минуте

**819.** Выберите правильный ответ

Количество признаков по Шкале Апгар

- 5
- 4
- 3
- 6

**820.** Выберите правильный ответ

Состав грудного молока

- белки содержат много незаменимых аминокислот, таурин, преобладают белки молочной сыворотки
- количество углеводов меньше, чем в коровьем молоке
- жира в женском и коровьем молоке одинаковое количество
- жира в грудном молоке больше чем в коровьем молоке

**821.** Выберите правильный ответ

Кормление грудью

- уменьшает риск возникновения аллергических заболеваний
- способствует развитию рахита, железодефицитной анемии, паратрофии
- повышает вероятность возникновения сахарного диабета, раннего атеросклероза
- не способствует возникновению эмоционального чувства единства матери и ребенка

**822.** Выберите правильный ответ

Молозиво, его характеристика

- выделяется в конце беременности и в первые дни после родов
- количество 300-500 мл в сутки
- цвет белый за счет большого количества углеводов
- бедно иммуноглобулинами и другими защитными факторами

**823.** Выберите правильный ответ

Значение молозива

- повышает иммунитет
- способствует развитию аллергии
- обладает закрепляющим действием
- содействует желтухе

**824.** Выберите правильный ответ

Изменение состава молока во время кормления

- в течение кормления выделяется раннее и позднее молоко
- для роста и развития ребенка требуется в основном позднее молоко
- ребенок нуждается только в раннем молоке

ограничение длительности сосания груди уменьшает потребление раннего молока

**825.** Выберите правильный ответ

Раннее молоко

- выделяется в начале кормления
- молоко жирное
- имеет насыщенный белый цвет
- богато жирорастворимыми витаминами

**826.** Выберите правильный ответ

Образованию грудного молока способствуют гормоны

- пролактин и окситоцин
- пролактин угнетает образование молока
- пролактин выделяется во время кормления грудью
- наибольшая секреция пролактина происходит днем

**827.** Выберите правильный ответ

Кормление новорожденного до прикладывания к груди (предлактационное кормление) опасно, т.к. оно

- заменяет молозиво – самую раннюю пищу ребенка
- улучшает сосательную способность ребенка
- стимулирует лактацию
- способствует хорошей прибавке массы

**828.** Выберите правильный ответ

Сцеживание грудного молока полезно, чтобы

- предотвратить закупорку млечного протока и нагрубание молочной железы
- кормить ребенка, если он не хочет брать грудь
- для уменьшения лактации
- кормить ребенка, который хорошо «берет» грудь

**829.** Выберите правильный ответ

Гипогалактия - это

- снижение лактации у матери
- истечение молока из грудной железы
- недостаток молочной смеси
- воспалительный процесс в молочной железе

**830.** Выберите правильный ответ

Причина гипогалактии

- стресс, переутомление, нарушения сна
- раннее прикладывание к груди
- частые и длительные кормления грудью, кормления ночью
- соблюдение диеты и режима кормящей матери

**831.** Выберите правильный ответ

Признаки недокорма

- беспокойство и плохая прибавка в массе
- прибавка массы тела более 600 г в месяц
- обильное выделение мочи низкой концентрации
- регулярный стул

**832.** Выберите правильный ответ

Поддержка матери при гипогалактии

- часто прикладывать ребёнка к груди
- не кормить ребенка ночью
- посоветовать реже и менее продолжительно кормить ребенка грудью

предложить ему молоко из бутылочки

**833.** Выберите правильный ответ

Раннее прикладывание к груди противопоказано при

- оценке по шкале Апгар ниже 7 баллов
- нарушении мозгового кровообращения 1 степени
- недоношенности (при наличии сосательного рефлекса)
- пороках развития конечностей

**834.** Выберите правильный ответ

Неонатальный скрининг в родильном доме проводится

- на 5 заболеваний
- на 2 заболевания
- на 3 заболеваний
- на 4 заболевания

**835.** Выберите правильный ответ

Неонатальный скрининг проводится для раннего выявления

- врожденного гипотиреоза
- сепсиса
- анемии
- пневмонии

**836.** Выберите правильный ответ

Неонатальный скрининг проводится для раннего выявления

- галактоземии
- краснухи
- болезни Дауна
- сифилиса

**837.** Выберите правильный ответ

Неонатальный скрининг проводится

- на 4 сутки
- на 2 сутки
- на 3 сутки
- на 1 сутки

**838.** Выберите правильный ответ

Для проведения неонатального скрининга берется

- кровь
- моча
- пот
- кал

**839.** Выберите правильный ответ

Для проведения неонатального скрининга

- кровь берется из пяточки на специальный тест-бланк
- кровь берется из вены в пробирку
- моча в баночку
- моча на специальный бланк

**840.** Выберите правильный ответ

Вакцинация новорожденных в роддоме проводится

- против туберкулеза
- против дифтерии
- против СПИДа
- против сифилиса

**841.** Выберите правильный ответ

Вакцинация новорожденных в родильном доме проводится

- против гепатита В
- против дифтерии
- против СПИДа
- против сифилиса

**842.** Выберите правильный ответ

Вакцинация новорожденных в родильном доме против туберкулеза проводится

- на 3-4 день жизни
- на 5-6 день жизни
- на 1-2 день жизни
- на 2-3 день жизни

**843.** Выберите правильный ответ

Вакцинация новорожденных против гепатита В проводится

- в первые сутки после рождения
- вместе с вакцинацией против туберкулеза
- на 2-3 сутки
- перед выпиской

**844.** Выберите правильный ответ

Вакцина БЦЖ вводится

- в верхнюю треть левого плеча
- в предплечье
- в/м в бедро
- в/м в ягодицу

**845.** Выберите правильный ответ

Вакцина против вирусного гепатита вводится

- в/м
- п/к
- в плечо
- в ягодицу

**846.** Выберите правильный ответ

Сроки проведения первого патронажа к новорожденному

- в первый день после выписки новорожденного
- на 2-3 день после выписки новорожденного
- на 4 день
- через неделю после выписки

**847.** Выберите правильный ответ

Критерии выписки доношенного новорожденного домой

- отсутствие заболеваний у матери и ребенка
- масса тела 3500 г и более
- заживление пупочной ранки
- вакцинация против гепатита и туберкулеза

**848.** Выберите правильный ответ

Окончательная перевязка пуповины проводится

- стерильным одноразовым зажимом
- марлевой лигатурой
- зажимом Кохера
- кровоостанавливающим зажимом

**849.** Выберите правильный ответ

Пережатие пуповины проводится

- 3 зажимами Кохера
- одноразовыми зажимами
- марлевыми лигатурами
- 1 зажимом Кохера

**850.** Выберите правильный ответ

Кожный контакт проводится с целью

- уменьшения внутрибольничной инфекции

- предупреждения развития желтухи
- профилактика поражений ЦНС
- предупреждения гипертермии

**851.** Выберите правильный ответ

Сроки пережатия пуповины

- после прекращения пульсации пуповины
- сразу после рождения ребенка
- спустя 10 минут после рождения
- спустя 5 минут после рождения

**852.** Выберите правильный ответ

Сразу после рождения необходимо

- осушить кожу ребенка
- провести профилактику офтальмобленнореи
- взвесить ребенка
- приложить к груди

**853.** Выберите правильный ответ

Температура в родильном зале (градусов С)

- 25-28
- 22-24
- 20-22
- 28-30

**854.** Выберите правильный ответ

Кожный контакт проводится с целью

- профилактики гипотермии новорожденного
- предупреждения развития желтухи
- профилактики поражений ЦНС
- предупреждения гипертермии

**855.** Выберите правильный ответ

Аудиологический скрининг проводится с целью

- выявления тугоухости
- выявления желтухи
- выявления поражений ЦНС
- выявления гипертермии

**856.** Выберите правильный ответ

Реанимационный лист в родильном зале заполняется

- на всех новорожденных
- на новорожденных, кому проводилась реанимация
- на больных новорожденных
- на новорожденных с оценкой по шкале Апгар 5 баллов и ниже

**857.** Выберите правильный ответ

Подмывание новорожденного проводится

- под теплой проточной водой
- стерильной водой
- раствором фурацилина
- физиологическим раствором

**858.** Выберите правильный ответ

Неонатальный скрининг проводится согласно приказу

- №274 МЗ РФ от 21.04.2022
- №921н МЗ СРРФ от 15.11.2012
- №808н МЗ СРРФ от 25.07.2011
- №1687н МЗ СРРФ от 27.12.2011

**859.** Выберите правильный ответ

Вакцинация новорожденных проводится согласно приказу

- №1122н МЗ РФ от 06.12.2021

- №51н МЗ СРРФ от 31.01.2011
- №808н МЗ СРРФ от 25.07.2011
- №1687н МЗ СРРФ от 27.12.2011

**860.** Выберите правильный ответ

Норма площади на одну кроватку в  
обсервационном отделении составляет (кв.м)

- 4,5
- 3
- 6
- 8

**861.** Выберите правильный ответ

Основной документ по санитарно-эпидемическому  
режиму в отделении новорожденных

- СанПиН 3.3686-21 от 01.09.2021
- №808 н МЗ СРРФ от 25.07.2011
- №51 н МЗ СРРФ от 31.01.2011
- №372 МЗ СРРФ от 28.12.1995

**862.** Выберите правильный ответ

Недоношенным считается ребенок, родившийся  
при сроке гестации

- 36 недель 6 дней и менее
- 40 недель
- 39 недель
- 38 недель

**863.** Выберите правильный ответ

Критерием живорождения является

- дыхание
- цвет кожи
- срок гестации
- хорошие безусловные рефлексы

**864.** Выберите правильный ответ

К недоношенным с низкой массой тела относятся  
дети с массой (г)

- 2500-1500
- 2700-2500
- 2500-2000
- 3000-2500

**865.** Выберите правильный ответ

К недоношенным с экстремально низкой массой  
тела относятся дети с массой (г)

- менее 1000
- 1500-1000
- 2500-1500
- менее 1500

**866.** Выберите правильный ответ

Общие особенности патологии детей с низкой  
массой тела

- выше перинатальная смертность
- высокие темпы психомоторного развития
- развитие аллергии
- высокие темпы физического развития

**867.** Выберите правильный ответ

К социально-экономическим факторам  
преждевременных родов относятся

- незарегистрированный брак
- возраст отца старше 50 лет
- психические травмы
- возраст матери моложе 18 лет

**868.** Выберите правильный ответ

К социально-биологическим факторам  
преждевременных родов относятся

- возраст матери моложе 18 лет
- незарегистрированный брак
- доход семьи
- условия проживания

**869.** Выберите правильный ответ

К клиническим факторам преждевременных родов  
относятся

- иммунологический конфликт между  
беременной и плодом
- доход сем
- незарегистрированный брак
- возраст матери

**870.** Выберите правильный ответ

К внешним признакам недоношенного ребенка  
относится

- распространенное лануго на плечах, спине
- хорошо развитый жировой слой
- относительно маленькая голова
- поза флексии

**871.** Выберите правильный ответ

К функциональным признакам недоношенности  
относится

- незрелость легких
- хорошо удерживает тепло
- хорошо выраженные безусловные рефлексы
- живая реакция на осмотр,

**872.** Выберите правильный ответ

Основной принцип выхаживания недоношенных  
детей

- поддержание постоянной температуры тела
- обязательное кормление грудью
- совместное пребывание с мамой
- ранняя выписка домой

**873.** Выберите правильный ответ

Средство для согревания недоношенных  
новорожденных с очень низкой массой тела

- кювез
- метод «кенгуру»
- «гнездо»
- повышение температуры в помещении

**874.** Выберите правильный ответ

Срок синхронизации глотания, сосания и дыхания  
у недоношенных новорожденных

- 36-38 недель
- 28-32 недель
- 26-30 недель
- 38-40 недель

**875.** Выберите правильный ответ

Показание для кормления через зонд

- отсутствие сосательного и глотательного  
рефлекса
- отсутствие сосательного рефлекса
- низкая температура тела
- повышенная температура тела

**876.** Выберите правильный ответ

Признак незрелости новорожденного

- гипотония мускулатуры

- исчерченность всей стопы
- высокая температура тела
- повышенный мышечный тонус

**877.** Выберите правильный ответ

Температура в палате для недоношенных детей должна быть

- 24-26 гр. С
- 22-23 гр. С
- 18-20 гр. С
- 28-30 гр. С

**878.** Выберите правильный ответ

В одном кувезе новорожденный может находиться

- 2-4 дня
- 2 дня
- до 10 дней
- 5 дней

**879.** Выберите правильный ответ

Номер приказа, определяющий критерии живорождения

- №1687н МЗ СР РФ от 27.12.2011
- №125 н МЗ РФ от 21.03.2014
- №51 н МЗ СР РФ от 31.01.2011
- №808 н МЗ СР РФ от 25.07.2011

**880.** Выберите правильный ответ

В зависимости от массы тела недоношенные дети подразделяются на

- 3 группы
- 2 группы
- 4 группы
- 5 групп

**881.** Выберите правильный ответ

К очень низкой массе тела относятся дети с массой (г)

- 1500-1001
- 2500-2000
- 2500-1500
- 2000-1500

**882.** Выберите правильный ответ

Материнские факторы, приводящие к ЗВУР

- заболевания сердечно-сосудистой системы у беременной
- преждевременные роды
- длительный безводный период
- токсикоз первой половины беременности

**883.** Выберите правильный ответ

Проблемы пациента с ЗВУР в раннем неонатальном периоде

- нарушение терморегуляции
- зуд кожных покровов
- гнойное отделяемое из пупочной ранки
- развитие анемии

**884.** Выберите правильный ответ

Асфиксия новорожденного – это

- отсутствие дыхания при наличии сердцебиения
- отсутствие сердцебиения
- отсутствие дыхания и сердцебиения
- отсутствие пульсации сосудов пуповины

**885.** Выберите правильный ответ

Оценка по шкале Апгар 5 баллов соответствует асфиксии

- средней степени
- легкой степени
- тяжелой степени
- отсутствие асфиксии

**886.** Выберите правильный ответ

Количество признаков, оцениваемых по шкале Сильвермана

- 5
- 6
- 3
- 4

**887.** Выберите правильный ответ

Аntenатальные факторы риска по развитию гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных

- обострение хронического пиелонефрита у беременной
- токсикоз I половины беременности
- течение беременности на фоне артериальной гипертензии
- угроза выкидыша при сроке 26 недель беременности

**888.** Выберите правильный ответ

Проявления опрелостей I степени у новорожденного

- гиперемия кожи в естественных складках
- эрозивная мокнущая поверхность в естественных складках кожи
- эрозии на фоне гиперемии кожи в естественных складках
- мелкоточечная сыпь розового цвета

**889.** Выберите правильный ответ

Потница характеризуется появлением на коже

- мелкоточечной сыпи розового цвета
- пятнисто-папулезной сыпи
- везикул
- пустул

**890.** Выберите правильный ответ

Фактор риска по развитию гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных

- длительный безводный период более 18 часов
- повышение давления у роженицы
- затяжные роды
- курение во время беременности

**891.** Выберите правильный ответ

Воспаление пупочной ранки новорожденного

- омфалит
- дерматит
- потница
- гемангиома

**892.** Выберите правильный ответ

Препарат для обработки пустул у новорожденного

- 1% раствор бриллиантового зеленого
- раствор фурацилина 1:5000
- 3% раствор перекиси водорода
- 1% раствор йода

**893.** Выберите правильный ответ

Проявления опрелостей II степени у новорожденного

- эрозии на фоне гиперемии кожи в естественных складках
- эрозивная мокнущая поверхность в естественных складках кожи
- мелкоточечная сыпь розового цвета
- гиперемия кожи в естественных складках

**894.** Выберите правильный ответ

При псевдофурункулезе воспалительный процесс развивается

- в выводных протоках потовых желез
- в выводных протоках сальных желез
- в волосяном мешочке
- в подкожной клетчатке

**895.** Выберите правильный ответ

Гнойно-воспалительное поражение кожи и подкожной клетчатки у новорожденного

- флегмона
- псевдофурункулез
- везикулопустулез
- омфалит

**896.** Выберите правильный ответ

Препарат для проведения туалета пупочной ранки при омфалите

- 3% раствор перекиси водорода
- дистиллированная вода
- раствор фурацилина 1:5000
- стерильное растительное масло

**897.** Выберите правильный ответ

Генерализованная форма гнойно-воспалительной инфекции у новорожденных

- сепсис
- остеомиелит
- флегмона
- пневмония

**898.** Выберите правильный ответ

Наиболее частая причина перинатальных поражений ЦНС

- внутриутробная гипоксия
- резус-несовместимость крови матери и плода
- гнойно-воспалительные заболевания
- воздействие вирусов

**899.** Выберите правильный ответ

Кефалогематома – это кровоизлияние

- под надкостницу
- под апоневроз
- подкожное
- внутричерепное

**900.** Выберите правильный ответ

Напряжение и вздутие большого родничка характерно для

- повышения внутричерепного давления
- физиологического переходного состояния
- судорожного синдрома
- синдрома гипервозбудимости

**901.** Выберите правильный ответ

Для легкой формы перинатальных поражений ЦНС характерно

- синдром гипервозбудимости
- синдром угнетения
- судорожный синдром
- коматозный

**902.** Выберите правильный ответ

Для среднетяжелой формы перинатальных поражений ЦНС характерно

- синдром угнетения деятельности головного мозга
- синдром гипервозбудимости
- судорожный синдром
- коматозный

**903.** Выберите правильный ответ

Для тяжелой формы перинатальных поражений ЦНС характерны

- серьезные и стойкие нарушения
- гипервозбудимости
- синдром желтухи
- гипертермический синдром

**904.** Выберите правильный ответ

При синдроме гипервозбудимости новорожденному назначают

- настой корня валерианы
- димедрол
- витамины группы В
- анальгин

**905.** Выберите правильный ответ

Исход легкой формы перинатальных поражений ЦНС

- полное выздоровление
- ДЦП
- гидроцефалия
- задержка умственного развития

**906.** Выберите правильный ответ

Исход тяжелой формы перинатальных поражений ЦНС

- ДЦП
- задержка речевого развития
- повышенная возбудимость
- полное выздоровление

**907.** Выберите правильный ответ

Причина механической родовой травмы

- применение акушерских пособий в родах
- переносимость
- гипоксия плода
- головное предлежание

**908.** Выберите правильный ответ

Наиболее частый перелом у новорожденного как следствие родового травматизма

- перелом ключицы
- перелом плечевой кости
- перелом бедренной кости
- перелом основания черепа

**909.** Выберите правильный ответ

Возбудитель герпетической внутриутробной инфекции

- вирусы
- микробы
- грибы

- паразиты

**910.** Выберите правильный ответ

Период беременности, когда может развиваться эмбриопатия

- в первые 10 недель
- с 12 до 24 недели
- с 20 по 28 неделю
- в последние 2 недели

**911.** Выберите правильный ответ

Период беременности, когда может развиваться ранняя фетопатия

- с 11 по 26 неделю
- с 24 по 40 неделю
- с 1 по 8 неделю
- с 10 по 12 неделю

**912.** Выберите правильный ответ

Период беременности, когда может развиваться поздняя фетопатия

- с 26 по 40 неделю
- в первые 12 недель
- в 8-10 недель
- в 39-40 недель

**913.** Выберите правильный ответ

Интранатальные повреждения плода возникают

- во время родов
- во время беременности
- до беременности
- в послеродовом периоде

**914.** Выберите правильный ответ

Возбудитель врожденного токсоплазмоза

- паразит
- вирус
- бактерия
- внутриклеточный микроб

**915.** Выберите правильный ответ

Возбудитель хламидийной инфекции

- внутриклеточный микроб
- внутриклеточный паразит
- бактерия
- вирус

**916.** Выберите правильный ответ

Возбудитель врожденного сифилиса

- бледная трепонема
- внутриклеточный паразит
- грибы
- вирус

**917.** Выберите правильный ответ

Наиболее частый путь заражения плода хламидиозом

- контактный во время родов
- трансплацентарный
- бытовой
- воздушно-капельный

**918.** Выберите правильный ответ

Наиболее частое проявление хламидиоза у новорожденного

- хламидийный конъюнктивит
- стоматит
- энтерит

- ангина

**919.** Выберите правильный ответ

Внутриутробная вирусная инфекция

- ЦМВ
- токсоплазмоз
- сифилис
- листериоз

**920.** Выберите правильный ответ

Бактериальная внутриутробная инфекция

- сифилис
- краснуха
- токсоплазмоз
- герпетическая инфекция

**921.** Выберите правильный ответ

Внутриутробная инфекция, при которой развивается триада Грега

- краснуха
- герпетическая
- цитомегаловирусная инфекция
- туберкулез

**922.** Выберите правильный ответ

Врожденный сифилис подтверждается

- серологическими реакциями
- вирусологическим исследованием
- вирусоскопическим исследованием
- бак посевами

**923.** Выберите правильный ответ

Гемолитическая болезнь новорожденного развивается в результате

- резус-конфликта
- гипоксического поражения ЦНС
- отсутствия полного набора хромосом
- родовой травмы

**924.** Выберите правильный ответ

Наиболее тяжелая форма гемолитической болезни новорожденного

- отечная
- желтушная
- анемическая
- смешанная

**925.** Выберите правильный ответ

Первые признаки «ядерной желтухи»

- желтушное окрашивание кожи и глаз, вялость, угнетение рефлексов
- гипертонус мышц конечностей
- опистотонус, мозговой крик
- беспокойство, оживление рефлексов

**926.** Выберите правильный ответ

Основная причина возникновения поздней желтухи у новорожденного

- внутриутробные инфекции
- резус-конфликт
- переохлаждение
- искусственное вскармливание

**927.** Выберите правильный ответ

При резус-конфликте переливается

- эритроцитарная масса I группы и отрицательным Rh-фактором
- одногруппная и однорезусная кровь матери

- однократная и однократная кровь ребенка
- однократная кровь матери резус-положительная

**928.** Выберите правильный ответ

Проведение фототерапии показано при уровне билирубина

- 220 мкмоль/л и выше
- 170 мкмоль/л
- 200 мкмоль/л и выше
- 100 мкмоль/л

**929.** Выберите правильный ответ

Заменное переливание показано при уровне билирубина

- 342 мкмоль/л и выше
- 170 мкмоль/л
- 120 мкмоль/л
- 300 мкмоль/л

**930.** Выберите правильный ответ

Эффективность фототерапии увеличивается при сочетании ее

- с инфузионной терапией
- с массажем
- с воздушными ваннами
- с гигиенической ванной

**931.** Выберите правильный ответ

Ядерная желтуха характеризуется поражением

- ЦНС
- легких
- сердца
- почек

**932.** Выберите правильный ответ

Причина развития геморрагической болезни новорожденных

- недостаток витамина К
- избыток витамина К
- недостаток инсулина
- избыток глюкозы

**933.** Выберите правильный ответ

Классическая форма геморрагической болезни новорожденного развивается

- на 2-7 сутки жизни
- в первые 24 часа
- на 2-8 день жизни
- внутриутробно

**934.** Выберите правильный ответ

Профилактика геморрагической болезни новорожденного заключается

- однократное введение викасола в/м
- в/в введение глюкозы
- введение инсулина
- введение гепарина

**935.** Выберите правильный ответ

Основной клинический симптом геморрагической болезни новорожденного

- желудочно-кишечное кровотечение
- отечность кожи
- повышенный тонус мышц
- желтушность кожи

**936.** Выберите правильный ответ

Кишечное кровотечение при геморрагической болезни новорожденного называется

- мелена
- лануго
- милиа
- липома

**937.** Выберите правильный ответ

Первая помощь при геморрагической болезни при пупочном кровотечении заключается

- в наложении стерильной давящей повязки на пупочное кольцо
- в переливании крови
- в ушивании раны
- в переливании плазмы

**938.** Выберите правильный ответ

Особенности ведения родов при резус-конфликте

- быстро отделить ребенка от матери
- дождаться прекращения пульсации пуповины
- быстро приложить ребенка к груди
- взять кровь из пуповины через 1 час

**939.** Выберите правильный ответ

При срыгиваниях, связанных с перекормом ребенка

- ребенок хорошо прибавляет в массе
- срыгивания возникают ближе к следующему кормлению
- не прибавляет в массе
- склонность к запорам

**940.** Выберите правильный ответ

При срыгиваниях, связанных с перекормом ребенка необходимо

- уменьшить время кормления
- ввести докорм
- контролировать массу тела
- контролировать стул и мочеиспускание

**941.** Выберите правильный ответ

При аэрофагии срыгивания у новорожденных бывают

- через 5-10 мин после кормления
- срыгивания возникают ближе к следующему кормлению
- через 20-30 мин
- через 60 мин

**942.** Выберите правильный ответ

При пилороспазме рвота у новорожденных

- створоженным молоком
- неизменным молоком
- створоженным молоком со слизью
- створоженным молоком с желчью

**943.** Выберите правильный ответ

При высокой кишечной непроходимости рвота

- створоженным молоком с желчью
- створоженным молоком
- створоженным молоком со слизью
- неизменным молоком

**944.** Выберите правильный ответ

При низкой кишечной непроходимости рвота

- с примесью каловых масс
- створоженным молоком

- неизменным молоком
- створоженным молоком с желчью

**945.** Выберите правильный ответ

К первичным органическим рвотам относится рвота при

- пилоростенозе
- ахолазии
- пилороспазме
- холазии

**946.** Выберите правильный ответ

При частой рвоте у новорожденных отмечается

- обезвоживание
- метеоризм
- слюнотечение
- частое мочеиспускание

**947.** Выберите правильный ответ

Признаки обезвоживания

- западение большого родничка
- метеоризм
- слюнотечение
- частое мочеиспускание

**948.** Выберите правильный ответ

При обезвоживании показано

- проведение оральной регидратации
- дача ферментов
- прием антибиотиков
- прием смекты

**949.** Выберите правильный ответ

При частых срыгиваниях функционального характера показано

- назначение антирефлюксной смеси
- дача ферментов
- проведение оральной регидратации
- прием смекты

**950.** Выберите правильный ответ

Светлая кожа, голубые глаза, рыжие волосы, мышинный запах характерны для

- фенилкетонурии
- рахита
- болезни Дауна
- гипотиреоза

**951.** Выберите правильный ответ

Брахицефалия, косой разрез глаз, плоское лицо, поперечная борозда на ладони характерны для

- болезни Дауна
- рахита
- фенилкетонурии
- гипотиреоза

**952.** Выберите правильный ответ

Первый признак респираторного дистресс-синдрома новорожденного

- учащенное дыхание
- западение грудной клетки на вдохе
- цианоз кожных покровов
- гипотермия

**953.** Выберите правильный ответ

Шкала Сильвермана используется

- для оценки степени тяжести дыхательных расстройств у новорожденного

для определения гестационного возраста новорожденного

определения физического развития новорожденного

для оценки тяжести состояния новорожденного

**954.** Выберите правильный ответ

Пенный тест определяет

- зрелость легких
- зрелость почек
- зрелость печени
- зрелость ЦНС

**955.** Выберите правильный ответ

Основная причина развития респираторного дистресс-синдрома новорожденного

- недостаток сурфактанта
- избыток сурфактанта
- незрелость ЦНС
- незрелость печени

**956.** Выберите правильный ответ

Причины судорог у новорожденного могут быть

- метаболические нарушения
- перегревание
- недокорм
- яркий свет

**957.** Выберите правильный ответ

При судорогах новорожденным назначают

- седуксен
- димедрол
- анальгин
- супрастин

**958.** Выберите правильный ответ

Особенности судорожного синдрома у новорожденного

- часто встречаются эквиваленты судорог
- наличие продолжительных судорог
- часто с потерей сознания
- с преобладанием клонического компонента

**959.** Выберите правильный ответ

К функциональным признакам недоношенности относятся

- неспособность самостоятельно поддерживать постоянную температуру тела
- хорошо удерживает тепло
- хорошо выраженные безусловные рефлексы
- живая реакция на осмотр

**960.** Выберите правильный ответ

К функциональным признакам недоношенности относятся

- живая реакция на осмотр
- слабо выраженные или отсутствуют безусловные рефлексы
- хорошо удерживает тепло
- хорошо выраженные безусловные рефлексы

**961.** Выберите правильный ответ

Материнские факторы, приводящие к ЗВУР

- тяжелая анемия беременной
- преждевременные роды
- длительный безводный период
- токсикоз первой половины беременности

**962.** Выберите правильный ответ

Факторы, приводящие к ЗВУР

хроническая фетоплацентарная недостаточность

преждевременные роды

длительный безводный период

токсикоз первой половины беременности

**963.** Выберите правильный ответ

Факторы, приводящие к ЗВУР

раннее старение плаценты

преждевременные роды

длительный безводный период

токсикоз первой половины беременности

**964.** Выберите правильный ответ

Оценка по шкале Апгар 3 балла соответствует асфиксии

тяжелой степени

легкой степени

средней степени

отсутствие асфиксии

**965.** Выберите правильный ответ

Для гипоксии плода характерно учащение ЧСС (уд/мин)

160 и выше

до 140

до 130

до 120

**966.** Выберите правильный ответ

Аntenатальный фактор риска по развитию гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных

гнойная ангина у беременной

токсикоз I половины беременности

течение беременности на фоне артериальной гипертензии

угроза выкидыша при сроке 26 недель беременности

**967.** Выберите правильный ответ

Аntenатальный фактор риска по развитию гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных

абсцесс почки у беременной

токсикоз I половины беременности

течение беременности на фоне артериальной гипертензии

угроза выкидыша при сроке 26 недель беременности

**968.** Выберите правильный ответ

Интранатальный фактор риска по развитию гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных

длительный безводный период

затяжные роды

преэклампсия

стремительные роды

**969.** Выберите правильный ответ

Интранатальный фактор риска по развитию гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных

домашние роды

затяжные роды

преэклампсия

стремительные роды

**970.** Выберите правильный ответ

К механическим родовым травмам относится

перелом ключицы

омфалит

сепсис

желтуха

**971.** Выберите правильный ответ

К механическим родовым травмам относится

акушерский парез руки

омфалит

сепсис

желтуха

**972.** Выберите правильный ответ

Родовая опухоль - это

отек мягких тканей предлежащей области

поднадкостничное кровоизлияние

гематома

повреждение спинного мозга

**973.** Выберите правильный ответ

Лечение родовой опухоли

не требуется

тепловые процедуры

наложение повязки

наложение компресса

**974.** Выберите правильный ответ

Родовая опухоль самостоятельно рассасывается через

2-3 дня

2-3 часа

2-3 недели

2-3 месяца

**975.** Выберите правильный ответ

Кефалогематома начинает рассасываться через

7-10 дней

2-3 часа

2-3 дня

2-3 месяца

**976.** Выберите правильный ответ

Наиболее частое проявление сифилиса у новорожденного

наличие пузырей на ладонях и подошвах

стоматит

энтерит

ангина

**977.** Выберите правильный ответ

Наиболее частое проявление ЦМВ у новорожденного

затянувшаяся желтуха

стоматит

энтерит

ангина

**978.** Выберите правильный ответ

Первый период активности новорожденного непосредственно после родов длится в основном

первые 30 минут

иногда 1 час

2 часа

3 часа

**979.** Выберите правильный ответ

После первого периода активности новорожденный входит в фазу сна, которая продолжается

3 часа

2 часа

1 час

4 часа

**980.** Выберите правильный ответ

У новорожденного после родов второй период активности после фазы сна длится

4-6 часов

2-3 час

1 час

7 часов

**981.** Выберите правильный ответ

Время, оптимальное для начала кормления ребенка грудью непосредственно после родов

первые 30 минут

через 1 час

через 2 часа

через 3 часа

**982.** Выберите правильный ответ

Пастеризованное молоко, молочные смеси, питьевые растворы используются у новорожденных только

по назначению врача

по усмотрению матери

на усмотрение акушерки (медсестры)

при чувстве голода

**983.** Выберите правильный ответ

Вода и растворы для питья новорожденных в родильном доме должны быть

стерильными, в индивидуальной разовой расфасовке

стерильными, в индивидуальной расфасовке

стерильными

нестерильными

**984.** Выберите правильный ответ

Самое неблагоприятное воздействие на плод оказывает вирус

краснухи

вирусного гепатита

гриппа

цитомегалии

**985.** Выберите правильный ответ

Внутриутробный хламидиоз клинически проявляется у новорожденного

менингоэнцефалитом

бленнореей

атрофией зрительных нервов

глухотой

**986.** Выберите правильный ответ

Первичная обработка кожных покровов производится

стерильными салфетками

спиртом этиловым 96 град

йодом 2%

спиртом этиловым 70 град

**987.** Выберите правильный ответ

При вторичной обработке новорожденного в родильном зале

обрабатывают пуповинный остаток

обрабатывают слизистые оболочки

моют голову с мылом и обрабатывают кожу

производят профилактику гонобленнореи

**988.** Выберите правильный ответ

Только у новорожденных встречаются судороги

«неуловимые»

тонические

клонические

тонико-клонические

**989.** Выберите правильный ответ

Опрелости у новорожденного располагаются

в естественных складках и на ягодичах

на волосистой части головы

по всему телу

на стопах и ладонях

**990.** Выберите правильный ответ

Яркая гиперемия кожи с видимыми единичными эрозиями характерна для опрелости

второй степени

первой степени

третьей степени

четвертой степени

**991.** Выберите правильный ответ

Особенности ухода при опрелостях у новорожденных

провести воздушную ванну

дать обильное питье

согреть ребенка

обработать кожу антисептической мазью

**992.** Выберите правильный ответ

Причина возникновения инфекционных заболеваний кожи и пупка у новорожденных

нарушение санэпидрежима при уходе

переохлаждение

перегревание ребенка

неправильное вскармливание

**993.** Выберите правильный ответ

Ранние симптомы сепсиса у недоношенного новорожденного ребенка

слабость, вялость, отказ от еды

повышение температуры тела

появление очагов инфекции

судороги, «мозговой крик»

**994.** Выберите правильный ответ

Тактика акушерки при подозрении на развитие сепсиса у новорожденного ребенка

вызвать врача, подготовить к переводу в специализированный стационар

изолировать, начать антибиотикотерапию

начать водно-чайную паузу

начать антибиотикотерапию

**995.** Выберите правильный ответ

Тактика акушерки родильного дома при обнаружении у новорожденного ребенка везикулопустулеза

- вызвать врача, перевести в ОПН
- изолировать, обработать гнойнички
- обработать гнойнички, вызвать врача
- обработать гнойнички, перевести в ОПН

**996.** Выберите правильный ответ

Анемия у новорожденного ребенка развивается при гемоглобине

- ниже 150 г/л
- 190 г/л
- 210 г/л
- 200 г/л

**997.** Выберите правильный ответ

Срок хранения стерильных растворов глюкозы для инъекции и питья, приготовленных в асептических условиях аптек, укупоренных под обкатку алюминиевым колпачком

- 1 месяц
- 10 дней
- 2 дня
- 2 месяца

**998.** Выберите правильный ответ

Оптимальный период грудного возраста длится (от момента рождения)

- 1 год
- 6 месяцев
- 1 месяц
- 3 года

**999.** Выберите правильный ответ

Женская консультация и детская поликлиника должны иметь

- плакаты с принципами успешного грудного вскармливания
- образцы смесей для искусственного вскармливания
- плакаты, рекламирующие детское питание
- смеси, выдаваемые по бесплатным рецептам

**1000.** Выберите правильный ответ

Осложнения ветряной оспы

- нагноение элементов сыпи
- гломерулонефрит
- миокардит
- ядерная желтуха

**1001.** Выберите правильный ответ

Вакцинацию БЦЖ проводит

- специально обученная медсестра
- процедурная медсестра
- врач
- акушерка

**1002.** Выберите правильный ответ

Новорожденному, родившемуся от матери-носительницы вируса гепатита В, вакцинация против гепатита проводится

- в первые 24 часа, до вакцинации БЦЖ
- в первую неделю, после прививки БЦЖ
- через 2 месяца после БЦЖ
- в возрасте 4-5 месяцев

**1003.** Выберите правильный ответ

Стерилизации должно подвергаться грудное молоко биологической матери при хранении в холодильнике более

- 4 часов
- 3,5 часов
- 1 часа
- 24 часов

**1004.** Выберите правильный ответ

Восстановление первоначальной массы тела происходит чаще всего к

- 6-8 дню жизни
- 9 дню жизни
- 14 дню жизни
- 21 дню жизни

**1005.** Выберите правильный ответ

Вакцина БЦЖ вводится в дозе

- 0,05 мг
- 0,5 мг
- 1 мг
- 0,2 мг

**1006.** Выберите правильный ответ

Крик здорового новорожденного

- громкий, эмоциональный
- пронзительный
- тихий, стонущий
- похож на писк

**1007.** Выберите правильный ответ

Вторичная обработка новорожденного в отделении новорожденного заключается

- мытье головы, удаление слизи, крови и мекония с кожи
- проведение гигиенической ванны
- очищение носовых ходов
- умывание лица

**1008.** Выберите правильный ответ

Выработка грудного молока осуществляется под действием гормона

- пролактина
- прогестерона
- инсулина
- фолликулина

**1009.** Выберите правильный ответ

Аудиологический скрининг проводится для выявления

- тугоухости
- гипотиреоза
- фенилкетонурии
- муковисцидоза

**1010.** Выберите правильный ответ

Температура воды для подмывания новорожденного в градусах

- 36-37
- 30
- 24
- 40

**1011.** Выберите правильный ответ

Напряжение и выбухание большого родничка характерно для

- повышения внутричерепного давления
- физиологического переходного состояния
- судорожного синдрома
- синдрома гипервозбудимости

**1012.** Выберите правильный ответ

Гипоксия плода - это

- снижение содержания кислорода в органах и тканях
- повышение содержания кислорода в органах и тканях
- пониженное содержание кислорода в крови
- повышенное содержание кислорода в крови

**1013.** Выберите правильный ответ

Наиболее частая причина гипоксии плода

- анемия беременной
- рвота беременной
- ОРВИ беременной
- травмы беременной

**1014.** Выберите правильный ответ

Причина постгеморрагической анемии новорожденного

- отслойка плаценты
- анемия у матери
- несовместимость крови матери и плода по резус фактору
- несовместимость крови матери и плода по АВО

**1015.** Выберите правильный ответ

Для гипогликемии новорожденного характерно

- сахар крови ниже 2,6 ммоль/л
- сахар крови выше 2,6 ммоль/л
- сахар крови 4 ммоль/л
- сахар крови 3 ммоль/л

**1016.** Выберите правильный ответ

Медикаментозные средства, используемые в реанимации при асфиксии

- дофамин
- антибиотики
- плазма
- кортикостероиды

**1017.** Выберите правильный ответ

Доза 1% раствора викасола (менадион) для новорожденного в сутки составляет

- 0,1-0,3 мл
- 1,0 мл
- 0,5 мл
- 0,5 мл/кг

**1018.** Выберите правильный ответ

Доза дофамина для новорожденного составляет

- 5-15 мкг/кг/мин
- 0,1-0,3 мл на год жизни
- 0,3-0,5 мл/кг
- 1,0 мл/кг

**1019.** Выберите правильный ответ

Срок хранения порошков, мазей в детском отделении родильного дома

- 10 дней
- 1 месяц
- 2 недели
- 3 месяца

**1020.** Выберите правильный ответ

Срок хранения флаконов со стерильными растворами под алюминиевой обкаткой

- 1 месяц
- 10 дней
- 2 недели
- 3 месяца

**1021.** Выберите правильный ответ

Цвет кожных покровов у новорожденного ребенка при асфиксии средней степени

- цианотичные
- красный
- розовый
- белый

**1022.** Выберите правильный ответ

Цвет кожных покровов у новорожденного ребенка при асфиксии тяжелой степени

- бледный
- красный
- розовый
- розовый с акроцианозом

**1023.** Выберите правильный ответ

Гемолитическая болезнь новорожденного по АВО развивается, если

- женщина I(0), а ребенок II(A) или III(B) группы крови
- женщина II(A), а ребенок II(A) или III(B) группы крови
- женщина III(б), а ребенок II(A) или III(B) группы крови
- женщина I(0), а ребенок I(0) группу крови

**1024.** Выберите правильный ответ

Желтуха при гемолитической болезни появляется

- в первые часы после рождения
- на 2-3 сутки
- на 5-6 сутки
- на 2 неделе после рождения

**1025.** Выберите правильный ответ

Для анемии новорожденного 1-2 недели жизни характерно

- гемоглобин меньше 150 г/л
- гемоглобин меньше 160 г/л
- гемоглобин меньше 190 г/л
- гемоглобин меньше 200 г/л

**1026.** Выберите правильный ответ

Объем крови для гемотрансфузии новорожденному составляет при проведении ему заменного переливания крови

- 160-180 мл/кг
- 100-120 мл/кг
- 250-270 мл/кг
- 50-100 мл/кг

**1027.** Выберите правильный ответ

Пневмопатии у новорожденных сопровождаются развитием

- синдрома дыхательных расстройств
- геморрагического синдрома
- судорожного синдрома
- синдрома токсикоза

**1028.** Выберите правильный ответ

Частое осложнение при лечении высокой концентрацией кислорода

- бронхолегочная дисплазия
- кровотечение
- снижение слуха
- поражения ЦНС

**1029.** Выберите правильный ответ

Основной признак врожденного порока сердца у новорожденного

- появление цианоза после физической нагрузки
- задержка темпов физического развития
- срыгивания
- метеоризм

**1030.** Выберите правильный ответ

Основной принцип лечения фенилкетонурии

- диета с исключением белка животного происхождения
- назначение ноотропов
- назначение противосудорожных препаратов
- диетотерапия с исключением углеводов

**1031.** Выберите правильный ответ

Основной принцип лечения врожденного гипотиреоза

заместительная терапия гормонами щитовидной железы

- назначение ноотропов
- назначение противосудорожных препаратов
- диетотерапия с исключением углеводов

**1032.** Выберите правильный ответ

Подтвердить диагноз болезни Дауна можно

- исследованием хромосомного набора у ребенка
- неонатальным скринингом
- биохимическим исследованием крови
- исследованием мочи

**1033.** Выберите правильный ответ

Причина болезни Дауна

- увеличение хромосом по 21 паре
- уменьшение хромосом по 21 паре
- увеличение хромосом по 23 паре
- увеличение хромосом по 23 паре

**1034.** Выберите правильный ответ

Важнейшая социальная функция женщины

- рождение и воспитание здорового ребенка
- создание семьи
- карьера
- сохранение здоровья нации

## МДК.02.05. Гинекология

**1035.** Выберите правильный ответ

Бимануальное влагалищное исследование применяют для выяснения состояния

- матки, маточных труб и яичников
- шейки матки
- наружных половых органов
- мочевого пузыря, прямой кишки

**1036.** Выберите правильный ответ

Осмотр с помощью зеркал производят для выявления патологии

- влагалища, шейки матки
- яичников
- мочевого пузыря, прямой кишки
- матки, маточных труб

**1037.** Выберите правильный ответ

Бактериоскопическое исследование применяют с целью

- выявления микробного фактора
- раннего выявления онкологических заболеваний
- гормональной функции яичников
- состояния матки и маточных труб

**1038.** Выберите правильный ответ

Кольпоскопия позволяет уточнить диагноз

- эрозии шейки матки
- метротромбофлебита
- эндометрита
- остроконечных кондилом

**1039.** Выберите правильный ответ

Измерение базальной температуры применяют для оценки

- гормональной функции яичников
- состояния шейки матки
- раннего выявления онкологических заболеваний
- степени чистоты влагалища

**1040.** Выберите правильный ответ

Цитологическое исследование на атипичные клетки производят для

- раннего выявления онкологических заболеваний
- выявления угрозы выкидыша
- определения степени чистоты влагалища
- выявления гонококка

**1041.** Выберите правильный ответ

Ректо-вагинальное исследование проводят обязательно при

- раке шейки матки
- вульвите
- кольпите
- бартолините

**1042.** Выберите правильный ответ

Профилактические гинекологические осмотры должны проходить

- все женщины и девушки, начиная с 16-18 лет
- только женщины репродуктивного возраста
- только женщины, состоящие на диспансерном учёте
- только женщины, живущие половой жизнью

**1043.** Выберите правильный ответ

Во время профилактического осмотра обязательным является взятие мазков на

- цитологическое исследование
- гормональное исследование
- посев
- гонококки с провокацией

**1044.** Выберите правильный ответ

Мазки на онкоцитологическое исследование берутся

- с цервикального канала и влагалищной части шейки матки
- с боковой стенки влагалища
- из уретры
- с наружных половых органов

**1045.** Выберите правильный ответ

Мазки на гонококк Нейсера берут

- при помощи ложечки Фолькмана из цервикального канала
- с поверхности бокового свода шпателем
- из заднего свода шпателем
- деревянным шпателем с боковой стенки

**1046.** Выберите правильный ответ

Мазки на гормональный фон берут

- деревянным шпателем с боковой стенки влагалища
- ложечкой Фолькмана из цервикального канала
- палочкой-помазком из заднего свода влагалища
- кюреткой из матки

**1047.** Выберите правильный ответ

Девственницам нельзя проводить

- осмотр в зеркалах
- взятие мазков из уретры
- ректальное исследование
- трансабдоминальное УЗИ

**1048.** Выберите правильный ответ

Специальный метод гинекологического исследования

- бимануальное исследование
- кольпоскопия
- биопсия шейки матки
- гистеросальпингография

**1049.** Выберите правильный ответ

Перед ультразвуковым исследованием органов малого таза

- рекомендуют выпить жидкости и не опорожнять мочевой пузырь
- пациентка должна опорожнить мочевой пузырь
- мочевой пузырь наполняют контрастом
- мочу выпускают катетером

**1050.** Выберите правильный ответ

Перед бимануальным исследованием в женской консультации необходимо

- предложить женщине опорожнить мочевой пузырь
- вывести мочу катетером
- попросить женщину выпить 1 литр жидкости

- попросить женщину не мочиться

**1051.** Выберите правильный ответ

Основной принцип организации акушерско-гинекологической службы

- профилактический
- лечебно-охранительный
- участковый
- диагностический

**1052.** Выберите правильный ответ

Учреждение поликлинической акушерско-гинекологической службы

- женская консультация
- центральная районная больница
- ФАП
- областная больница

**1053.** Выберите правильный ответ

Исследование молочных желёз

- проводится на каждом профилактическом осмотре
- может проводить только хирург
- может проводить только гинеколог
- не может проводить акушерка

**1054.** Выберите правильный ответ

Онкологическое обследование на профилактическом осмотре необходимо проводить женщинам

- всех возрастных групп
- старше 30 лет
- после 50 лет
- до 30 лет

**1055.** Выберите правильный ответ

Каждая женщина должна проходить гинекологический профилактический осмотр

- 1 раз в год
- 1 раз в 3 года
- .1 раз в 3 месяца
- 1 раз в 5 лет

**1056.** Выберите правильный ответ

Наименее тревожный признак при обследовании молочных желёз

- асимметрия молочных желез
- морщинистость кожи и образование «лимонной корочки»
- пальпация образования без четких границ
- втяжение соска

**1057.** Выберите правильный ответ

На гинекологическую больную в женской консультации заполняется

- амбулаторная карта
- индивидуальная карта беременной и родильницы
- обменная карта
- родовой сертификат

**1058.** Выберите правильный ответ

Обязанность акушерки смотрового кабинета

- брать мазки на онкоцитологию

- производить миниаборт
- делать окончательное заключение о характере найденной опухоли
- проводить биопсию шейки матки

**1059.** Выберите правильный ответ

Кровомазанье в постменопаузе свидетельствуют

- о раке эндометрия
- о воспалении матки
- о беременности
- о нормальной менструации

**1060.** Выберите правильный ответ

При заращении девственной плевы

- возникает гематокольпос
- аменорея называется истинной
- менструальная функция не нарушена
- не требуется оперативное вмешательство

**1061.** Выберите правильный ответ

При нормальном положении матки

- тупой угол между шейкой и телом матки обращён к лону
- тело матки наклонено кзади и книзу
- угол между телом и шейкой обращён кзади
- между телом матки и шейкой угол острый

**1062.** Выберите правильный ответ

Для профилактики опущения и выпадения влагалища женщинам рекомендуют воздержаться от

- подъема тяжестей
- занятий спортом
- приема лекарственных средств
- мясной пищи

**1063.** Выберите правильный ответ

Тесты функциональной диагностики позволяют определить

- двуфазность менструального цикла
- срок последующей менструации
- наличие беременности
- наличие воспалительного процесса

**1064.** Выберите правильный ответ

Повышение ректальной температуры обусловлено

- действием прогестерона на центр терморегуляции в гипоталамусе
- действием эстрогенов
- действием андрогенов
- усилением биохимических процессов в матке

**1065.** Выберите правильный ответ

Меноррагия – менструации

- длительные обильные
- скудные, короткие
- болезненные
- редкие

**1066.** Выберите правильный ответ

Аменорея – отсутствие менструации в течение

- 6 месяцев
- 5 месяцев
- 4 месяцев

- 1 года

**1067.** Выберите правильный ответ

Аномальные маточные кровотечения у девочек называются

- ювенильными
- климактерическими
- ациклическим
- менструальными

**1068.** Выберите правильный ответ

Метод диагностики, позволяющий обнаружить дисплазию и раковые клетки шейки матки

- мазок на онкоцитологию
- феномен зрачка
- исследование базальной температуры
- симптом папоротника

**1069.** Выберите правильный ответ

Базальная температура измеряется

- в прямой кишке утром, не вставая с постели
- после очистительной клизмы
- после опорожнения мочевого пузыря
- после спринцевания влагалища

**1070.** Выберите правильный ответ

Базальная температура у здоровой женщины 25 лет

- выше в лютеиновой фазе
- выше в фолликулиновой фазе
- ниже в лютеиновой фазе
- постоянная в течение цикла

**1071.** Выберите правильный ответ

Мазок на гормональное исследование выявляет

- динамику изменений многослойного плоского эпителия
- кислотность содержимого влагалища
- степень чистоты влагалища
- атипичные клетки слизистой шейки матки

**1072.** Выберите правильный ответ

Менархе – это

- первая в жизни менструация
- ациклическое кровотечение
- циклические кровотечения
- обычные месячные

**1073.** Выберите правильный ответ

Альгодисменорея – это

- болезненные месячные
- обильные месячные
- задержка месячных
- нерегулярные месячные

**1074.** Выберите правильный ответ

Воспаление мочеиспускательного канала

- уретрит
- аднексит
- цистит
- бартолинит

**1075.** Выберите правильный ответ

Воспаление мочевого пузыря

- цистит

- уретрит
- аднексит
- бартолинит

**1076.** Выберите правильный ответ

Воспаление большой железы преддверия влагалища

- бартолинит
- аднексит
- вульвит
- сальпингоофорит

**1077.** Выберите правильный ответ

Воспаление наружных половых органов

- вульвит
- бартолинит
- аднексит
- сальпингоофорит

**1078.** Выберите правильный ответ

Воспаление шеечного канала

- эндоцервицит
- кольпит
- эндометрит
- вульвит

**1079.** Выберите правильный ответ

Воспаление слизистого слоя матки

- эндометрит
- бартолинит
- вульвит
- цервицит

**1080.** Выберите правильный ответ

Воспаление яичников

- оофорит
- сальпингит
- параметрит
- аднексит

**1081.** Выберите правильный ответ

Воспаление фаллопиевых труб

- сальпингит
- параметрит
- эндометрит
- аднексит

**1082.** Выберите правильный ответ

Воспаление придатков матки

- аднексит
- параметрит
- сальпингит
- эндометрит

**1083.** Выберите правильный ответ

Воспаление околоматочной клетчатки

- параметрит
- периметрит
- эндометрит
- пельвиоперитонит

**1084.** Выберите правильный ответ

Воспаление тазовой брюшины

- пельвиоперитонит

- периметрит
- параметрит
- эндометрит

**1085.** Выберите правильный ответ

Воспаление наружной оболочки матки

- периметрит
- эндометрит
- параметрит
- пельвиоперитонит

**1086.** Выберите правильный ответ

Группа риска женщин по развитию воспалительных заболеваний

- женщины, ведущие беспорядочную половую жизнь
- женщины, работающие в детских учреждениях
- женщины, не живущие половой жизнью
- здоровые женщины

**1087.** Выберите правильный ответ

Первичный очаг гонореи

- уретра
- влагалище
- шейка матки
- эндометрий

**1088.** Выберите правильный ответ

Пути проникновения возбудителя гонореи

- половой
- воздушно-капельный
- бытовой
- контактный

**1089.** Выберите правильный ответ

Возбудитель трихомоноза

- простейшие, относящиеся к классу жгутиковых
- хламидии
- кокки
- грибы рода кандида

**1090.** Выберите правильный ответ

Восходящая гонорея – поражение

- матки и маточных труб
- влагалища
- бартолиновых желез
- уретры

**1091.** Выберите правильный ответ

Распространение гонорейной инфекции происходит путем

- интраканаликулярным (восходящим)
- гематогенным
- контактным
- лимфогенным

**1092.** Выберите правильный ответ

Характер белей при гонорее

- гнойные, желтого цвета
- пенистые, с запахом
- с примесью крови
- творожистые

**1093.** Выберите правильный ответ

Диспансерное наблюдение за больными гонореей проводится в течение

- 3 месяцев
- 2 месяцев
- 1 месяца
- 4 месяцев

**1094.** Выберите правильный ответ

В патогенезе воспалительных заболеваний женских половых органов особое значение имеет

- наличие раневых входных ворот
- рабочее место женщины
- отсутствие полового партнера
- климатические условия

**1095.** Выберите правильный ответ

Заболевание плодного яйца, характеризующееся перерождением ворсин хориона в пузырьки с жидкостью

- пузырьный занос
- внематочная беременность
- невынашивание
- бесплодие

**1096.** Выберите правильный ответ

У девочек чаще всего бывает гонорейный

- вульвит
- эндометрит
- бартолинит
- сальпингит

**1097.** Выберите правильный ответ

Разрастание эндометрия за пределами внутреннего слоя матки

- эндометриоз
- гарднереллез
- хламидиоз
- уреаплазмоз

**1098.** Выберите правильный ответ

Возбудитель трихомониаза

- простейшие
- бактерии
- вирусы
- грибы

**1099.** Выберите правильный ответ

Для трихомониаза наиболее характерны проявления

- кольпит
- сальпингит
- метрометрит
- пельвеоперитонит

**1100.** Выберите правильный ответ

Выделения, характерные для трихомониаза

- желтовато-зеленые, обильные, пенистые
- творожистые
- голубоватые
- ярко-красные

**1101.** Выберите правильный ответ

Инкубационный период при хламидиозе составляет

- от 5 дней до 1 месяца
- 3 дня
- в среднем 2-3 недели
- полгода

**1102.** Выберите правильный ответ

Пути передачи хламидийной инфекции

- половой
- гематогенный
- лимфогенный
- воздушно-капельный

**1103.** Выберите правильный ответ

Первичный очаг инфекции при хламидиозе развивается, как правило

- в уретре
- в цервикальном канале
- в прямой кишке
- во влагалище

**1104.** Выберите правильный ответ

Основной очаг инфекции при бактериальном вагинозе

- влагалище
- шейка матки
- уретра
- полость матки

**1105.** Выберите правильный ответ

Выделения при бактериальном вагинозе

- серовато-белые, гомогенные, густые
- гнойные
- кровянистые
- сукровичные

**1106.** Выберите правильный ответ

Влагалищное содержимое при бактериальном вагинозе имеет характер

- кислый
- нейтральный
- щелочной
- резко кислый

**1107.** Выберите правильный ответ

Экспресс-тест, используемый для диагностики бактериального вагиноза

- аминотест
- проба с салициловой кислотой
- проба с раствором Люголя
- проба с соляной кислотой

**1108.** Выберите правильный ответ

Осложнение, вызываемые микоплазменной инфекцией у беременных женщин

- невынашивание беременности
- сальпингоофорит
- перенашивание беременности
- поперечное положение плода

**1109.** Выберите правильный ответ

Дезинфекция материала при трихомонозе осуществляется

- 1% раствором хлорамина
- 0,5% раствором хлорамина

- 0,2% раствором хлорамина
- раствором соды

**1110.** Выберите правильный ответ

Урогенитальный кандидоз чаще встречается

- после длительной антибиотикотерапии
- в возрасте 20-40 лет
- у лиц пожилого возраста
- у курящих женщин

**1111.** Выберите правильный ответ

Характер выделений при кандидозе

- беловато-творожистые
- гнойные
- стекловидные
- кровянистые

**1112.** Выберите правильный ответ

Возбудитель остроконечных кондилом

- вирус папилломы человека
- бактерии
- кокки
- простейшие

**1113.** Выберите правильный ответ

Остроконечные кондиломы чаще локализуются в

- преддверии влагалища
- цервикальном канале
- уретре
- полости матки

**1114.** Выберите правильный ответ

Генитальный герпес вызывается

- вирусом простого герпеса
- грибами
- папиллома вирусом
- кишечной палочкой

**1115.** Выберите правильный ответ

Основной фактор, осложняющий течение герпетической инфекции

- снижение иммунного статуса
- заболевания ЖКТ
- несоблюдение правил личной гигиены
- употребление жирной пищи

**1116.** Выберите правильный ответ

При поражении гонореей у девочек всегда возникает гонорейный

- вульвовагинит
- сальпингит
- бартолинит
- стоматит

**1117.** Выберите правильный ответ

Для трихомониаза наиболее характерно развитие

- кольпита
- пельвиоперитонита
- сальпингита
- параметрита

**1118.** Выберите правильный ответ

Фоновое заболевание шейки матки

- псевдоэрозия

- трихомонадный кольпит
- сальпингофорит
- папиллома

**1119.** Выберите правильный ответ

Для диагностики фоновых заболеваний шейки матки имеет значение

- биопсия с гистологией
- УЗИ
- бимануальное исследование
- взятие мазка

**1120.** Выберите правильный ответ

Характерная особенность миомы матки

- доброкачественная гормонально-зависимая опухоль
- чаще встречается в юношеском возрасте
- исходит из соединительной ткани
- склонность к малигнизации

**1121.** Выберите правильный ответ

Наиболее информативный метод диагностики миомы матки

- ультразвуковое исследование
- кольпоскопия
- влагалищное исследование
- биопсия

**1122.** Выберите правильный ответ

Генитальный эндометриоз

- разрастание эндометриоидноподобной ткани за пределами обычной локализации эндометрия
- разрастание мышечной ткани
- опухолевидный процесс
- воспалительный процесс

**1123.** Выберите правильный ответ

Основной клинический симптом эндометриоза

- боли в нижних отделах живота и поясничной области
- гипоменструальный синдром
- обильные бели слизистого характера
- аменорея

**1124.** Выберите правильный ответ

К ретенционным кистам относится

- фолликулярная киста
- дермоидная киста
- цистаденома
- андробластома

**1125.** Выберите правильный ответ

Истинная опухоль яичников

- муцинозная цистаденома
- фолликулярная киста
- лютеиновая киста
- параовариальная киста

**1126.** Выберите правильный ответ

Контактные кровотечения характерны для

- рака шейки матки ранних стадий
- нормальной беременности
- нормальной менопаузы
- эрозии шейки матки

**1127.** Выберите правильный ответ

Выделения типа «мясных помоев» наиболее характерны для

- рака эндометрия
- нормальных месячных
- прерывания шеечной беременности
- молочницы

**1128.** Выберите правильный ответ

Миома матки часто встречается у женщин в возрасте

- 40-50 лет
- 20-25 лет
- 18-20 лет
- 55-60 лет

**1129.** Выберите правильный ответ

Для профилактики быстрого роста миомы матки в последние годы рекомендуются

- гестагенные препараты
- поливитамины
- УВЧ
- сауна

**1130.** Выберите правильный ответ

Каждую обнаруженную опухоль яичника следует рассматривать как

- потенциально злокачественную
- злокачественную
- доброкачественную
- персистенцию фолликула

**1131.** Выберите правильный ответ

Наиболее опасное осложнение доброкачественных опухолей яичников

- озлокачествление
- разрыв капсулы кистомы
- перекрут ножки опухоли
- нагноение

**1132.** Выберите правильный ответ

При выявлении опухоли яичника наиболее рационально

- провести в ближайшее время оперативное лечение
- несколько лет наблюдать опухоль при диспансеризации
- проводить рассасывающую и антибактериальную терапию
- любую опухоль пробовать лечить гормонально

**1133.** Выберите правильный ответ

Дефект в многослойном плоском эпителии в результате химической или механической травмы

- истинная эрозия
- псевдоэрозия
- полип шеечного канала
- лейкоплакия

**1134.** Выберите правильный ответ

Гетеротопия (наползание) цилиндрического эпителия за пределы наружного зева на шейке матки

- псевдоэрозия
- истинная эрозия
- полип шеечного канала
- эктропион

**1135.** Выберите правильный ответ

Утолщение ороговевших клеток многослойного плоского эпителия (паракератоз, гиперкератоз)

- лейкоплакия
- истинная эрозия
- полип шеечного канала
- ложная эрозия

**1136.** Выберите правильный ответ

Выворот слизистой шеечного канала шейки матки в результате разрыва круговых мышц шейки матки

- эктропион
- истинная эрозия
- полип шеечного канала
- ложная эрозия

**1137.** Выберите правильный ответ

Предраковые состояния шейки матки

- дисплазия шейки матки
- ложная эрозия
- врожденная эрозия
- лейкоплакия

**1138.** Выберите правильный ответ

Очаговая гиперплазия слизистой оболочки шеечного канала называется

- полип шеечного канала
- истинная эрозия
- дисплазия шейки матки
- ложная эрозия

**1139.** Выберите правильный ответ

Для ранних стадий рака шейки матки характерны симптомы

- контактные кровотечения
- выделение типа «мясных помоев»
- задержка менструаций
- профузные кровотечения

**1140.** Выберите правильный ответ

Меры профилактики рака шейки матки

- онкоцитологическое исследование 1 раз в год
- диагностическое выскабливание полости матки
- УЗИ
- лапараскопическое исследование

**1141.** Выберите правильный ответ

При диагностике онкологических заболеваний шейки матки большое значение имеет

- мазок на онкоцитологию
- мазок на гормональный фон
- мазок на хламидии
- мазок на степень чистоты влагалища.

**1142.** Выберите правильный ответ

Профилактический осмотр молочных желез

- проводится при профилактическом гинекологическом обследовании женщины
- может проводить только хирург

- может проводить только гинеколог
- может проводить акушерка

**1143.** Выберите правильный ответ

Мастопатия – это

- гормонозависимое заболевание молочных желез
- рак молочной железы
- операция удаления молочной железы
- послеродовый мастит

**1144.** Выберите правильный ответ

Шейка матки имеет вид цветной капусты при

- экзофитной форме рака шейки матки
- эндофитной форме рака шейки матки
- истинной эрозии шейки матки
- псевдоэрозии шейки матки

**1145.** Выберите правильный ответ

Часто встречаемые воспалительные процессы у девочек

- вульвит
- эндометрит
- сальпингит
- пельвиоперитонит

**1146.** Выберите правильный ответ

Симптомы острого вульвовагинита у девочек

- боль и жжение в области вульвы
- головная боль
- боли внизу живота
- кровотечение из половых путей

**1147.** Выберите правильный ответ

Особенности белей при трихомониазе у девочек

- водянистые, зеленоватого цвета, пенистые
- обильные с запахом рыбы
- нет характерных черт
- серые, творожистые

**1148.** Выберите правильный ответ

Особенности белей при кандидозе у девочек

- серые, творожистые
- обильные, гнойные
- нет характерных черт
- слизисто-гнойные

**1149.** Выберите правильный ответ

Особенности белей при гонорее у девочек

- обильные, густые, гнойные
- серые, творожистые
- водянистые, пенистые
- нет характерных черт

**1150.** Выберите правильный ответ

Возбудитель микотического вульвовагинита у девочек

- дрожжеподобные грибы
- кишечная палочка
- гонококк
- трихомонада

**1151.** Выберите правильный ответ

Для лечения микотического вульвовагинита у девочек применяют

- клотримазол
- антибиотики
- глюкокортикоиды
- трихопол

**1152.** Выберите правильный ответ

Наиболее точный метод диагностики вирусных вульвовагинитов

- вирусологический метод
- бактериоскопическое исследование
- общий анализ крови
- кольпоскопия

**1153.** Выберите правильный ответ

Ключевые клетки - это

- клетки плоского эпителия, покрытые грамотрицательными палочками
- клетки слущенного эпителия
- эритроциты
- палочки Додерлейна

**1154.** Выберите правильный ответ

Клинические проявления гонореи у девочек

- гонорейный вульвит
- гонорейный эндометрит
- гонорейный сальпингит
- гонорейный пельвиоперитонит

**1155.** Выберите правильный ответ

Возраст девочки, при котором применяется биологическая провокация

- старше 3 лет
- старше 1 года
- старше 2 лет
- старше 5 лет

**1156.** Выберите правильный ответ

При биологической провокации у девочек гонорейную вакцину вводят в дозе

- 150-200 млн микробных тел
- 500 млн микробных тел
- 100 млн микробных тел
- 300 млн микробных тел

**1157.** Выберите правильный ответ

Закладка наружных половых органов происходит

- на 5-7 неделе беременности
- на 10 неделе беременности
- на 12 неделе беременности
- на 8 неделе беременности

**1158.** Выберите правильный ответ

Влагалище формируется в сроке беременности

- с 8 недели
- на 5 неделе
- на 20 неделе
- на 12 неделе

**1159.** Выберите правильный ответ

Маточные трубы формируются

- с 10 недели беременности
- с 17 недели беременности
- с 5 недели беременности
- с 20 недели беременности

**1160.** Выберите правильный ответ

Препубертатный период - это возраст

- от 8 лет до появления менархе
- от менархе до 16 лет
- от 16 до 18 лет
- с 11 дней до 7 лет

**1161.** Выберите правильный ответ

Пубертатный период - это возраст

- от менархе до 16 лет
- от 8 лет до появления менархе
- от 16 лет до 18 лет
- с 11 дней до 7 лет

**1162.** Выберите правильный ответ

Подростковый возраст

- от 16 лет до 18 лет
- от 8 лет до появления менархе
- от менархе до 16 лет
- с 11 дней до 7 лет

**1163.** Выберите правильный ответ

Для проведения аминного теста необходим

- 10% раствор КОН
- 10% раствор хлористого кальция
- 0,2% раствор перманганата калия
- 25% раствор сернокислой магнезии

**1164.** Выберите правильный ответ

Альгодисменорея у девочек - это

- боли внизу живота во время менструации
- беспорядочные кровянистые выделения из половых путей
- бели
- зуд вульвы во время менструации

**1165.** Выберите правильный ответ

Возбудитель неспецифического воспаления у девочек

- стафилококк
- гонококк
- трихомонада
- кандиды

**1166.** Выберите правильный ответ

Возбудитель специфического воспаления у девочек

- гонококк
- стафилококк
- стрептококк
- условно патогенная флора

**1167.** Выберите правильный ответ

Бактериоскопический метод - это

- микроскопия мазков
- кольпоскопия
- выскабливание полости матки
- культуральный метод

**1168.** Выберите правильный ответ

Тест функциональной диагностики

- симптом «зрачка»
- микроскопия мазков
- кольпоскопия

проба Шиллера

**1169.** Выберите правильный ответ

Наиболее современный неинвазивный метод диагностики в детской гинекологии

- УЗИ
- гистероскопия
- лапароскопия
- кульдоскопия

**1170.** Выберите правильный ответ

Эндоскопический метод исследования

- кольпоскопия
- УЗИ
- микроскопия мазка
- биопсия

**1171.** Выберите правильный ответ

Система организации гинекологической помощи девочкам состоит из

- 3 уровней
- 2 уровней
- 5 уровней
- 4 уровней

**1172.** Выберите правильный ответ

Диспансеризация девочек предусматривает распределение их

- по 3 диспансерным группам
- по 2 диспансерным группам
- по 4 диспансерным группам
- по 5 диспансерным группам

**1173.** Выберите правильный ответ

Вагиноскопия - это

- осмотр влагалища с помощью осветительных систем
- осмотр полости матки с помощью осветительных систем
- осмотр шейки матки в зеркалах
- осмотр органов малого таза с помощью осветительных систем

**1174.** Выберите правильный ответ

Мазок для бактериоскопического исследования у девочек берут

- из влагалища и уретры
- из влагалища и цервикального канала
- из цервикального канала и уретры
- из цервикального канала

**1175.** Выберите правильный ответ

Показание к выскабливанию полости матки у девочек

- гемоглобин ниже 50 г/л, подозрение на злокачественный процесс
- кровотечение из половых путей
- воспаление матки
- жалобы на бели

**1176.** Выберите правильный ответ

Искусственное прерывание беременности

- проводится при наличии медицинских показаний
- независимо от срока беременности

- до 22 недель
- до 32 недель
- до 12 недель

**1177.** Выберите правильный ответ

При обнаружении дисплазии шейки матки III степени показана консультация

- онколога
- венеролога
- дерматолога
- гинеколога

**1178.** Выберите правильный ответ

Антибактериальная терапия при генитальном хламидиозе назначается со срока беременности

- 20-22 недели
- с момента диагностики беременности
- 30 недель
- 12 недель

**1179.** Выберите правильный ответ

Беременная с подтверждённым диагнозом сифилис наблюдается

- акушером-гинекологом и дерматовенерологом
- инфекционистом по месту жительства
- акушером-гинекологом
- дерматовенерологом

**1180.** Выберите правильный ответ

При подозрении на диагноз сифилис у беременной необходимо

- выписать направление к дерматовенерологу и проконтролировать явку
- провести профилактический курс лечения антибиотиками пенициллинового ряда амбулаторно с последующей консультацией у дерматовенеролога
- выписать направление к инфекционисту и проконтролировать явку
- провести профилактический курс лечения антибиотиками пенициллинового ряда в инфекционном стационаре с последующей консультацией у дерматовенеролога

## МДК.02.06. Патологическое акушерство

**1181.** Выберите правильный ответ

Особенности ведения родов при резус-конflikте

- быстро отделить ребенка от матери
- дождаться прекращения пульсации пуповины
- быстро приложить ребенка к груди
- взять кровь из пуповины через 1 час

**1182.** Выберите правильный ответ

Развитию многоплодия чаще всего способствует

- применение ЭКО на фоне лечения кломифеном
- применение барьерной контрацепции
- применение внутриматочной контрацепции
- применение сохраняющих средств

**1183.** Выберите правильный ответ

Для беременности двойней наиболее характерно

- недонашивание
- перенашивание
- развитие крупных плодов
- бурная родовая деятельность

**1184.** Выберите правильный ответ

Довольно редко при многоплодии бывает

- перенашивание
- анемия
- преэклампсия
- послеродовая субинволюция матки

**1185.** Выберите правильный ответ

Беременная с двойней должна быть госпитализирована в родильный дом при нормальном течении беременности

- за 2-3 недели до родов
- в 40 недель
- сразу же после отхождения вод
- с началом срочных родов

**1186.** Выберите правильный ответ

Лечебная физкультура для коррекции тазового предлежания противопоказана

- при наличии рубца на матке
- при сроке беременности 30-35 недель
- у беременных старше 30 лет
- у беременных с миопией средней степени

**1187.** Выберите правильный ответ

Для рвоты беременной характерно

- потеря веса
- отеки
- гипертензия
- брадикардия

**1188.** Выберите правильный ответ

При неукротимой рвоте беременных обычно появляется

- тахикардия
- брадикардия
- гипертензия
- гипотермия

**1189.** Выберите правильный ответ

При рвоте средней степени тяжести

- показано лечение беременной в стационаре
- лечение беременной может быть амбулаторным
- всегда требуется срочное прерывание беременности
- из-за риска эмбриопатии лекарственные средства не назначают

**1190.** Выберите правильный ответ

При рвоте беременной средней тяжести наиболее вероятно

- ацетонурия
- пиурия
- лейкоцитурия
- бактериоурия

**1191.** Выберите правильный ответ

К редким формам осложнения беременности относится

- острая желтая атрофия печени
- птоализм
- слюнотечение
- рвота беременных

**1192.** Выберите правильный ответ

Рвота беременных реже и легче протекает у женщин

- полных
- юного возраста
- курящих
- худых

**1193.** Выберите правильный ответ

Для легкой формы рвоты беременных характерно

- отсутствие ацетона в моче
- потеря массы тела 8-10 кг
- рвота 20 раз в сутки
- температура 37,5 градусов

**1194.** Выберите правильный ответ

Наиболее тяжелая стадия рвоты беременных

- дистрофическая
- токсическая
- аллергическая
- невротическая

**1195.** Выберите правильный ответ

Противорвотным действием обладает

- церукал
- цепорин
- цифран
- цитрамон

**1196.** Выберите правильный ответ

К редким формам осложнения беременности относятся

- остеомаляция
- отеки беременных
- рвота беременной
- нефропатия

**1197.** Выберите правильный ответ

Признак отеков, связанных с беременностью

- патологическая прибавка веса
- гипотония
- тахикардия
- обезвоживание

**1198.** Выберите правильный ответ

Для гипертензионных расстройств характерно

- протеинурия
- пиурия
- лейкоцитурия
- бактериурия

**1199.** Выберите правильный ответ

В триаду признаков Цангенмейстера при гипертензионных расстройствах входит

- гипертензия
- рвота
- кетонурия
- гипертертия

**1200.** Выберите правильный ответ

Для выявления белка в моче применяют

- сульфасалициловую кислоту
- первомур

- хлорамин
- хлоргексидин

**1201.** Выберите правильный ответ

Для гипертензионных расстройств наиболее характерно

- гипотрофия плода
- макросомия плода
- крупный плод
- перенашивание

**1202.** Выберите правильный ответ

При выполнении магниальной терапии АД измеряют

- до и после введения магнeзии
- 2 раза в сутки.
- до введения магнeзии
- после введения магнeзии

**1203.** Выберите правильный ответ

Препарат, обладающий одновременно седативным, мочегонным, гипотензивным, спазмолитическим и противосудорожным действием

- сернокислая магнезия
- кордиамин
- дибазол
- папаверин

**1204.** Выберите правильный ответ

Во время беременности патологическими изменениями следует считать

- гемоглобин 96 г/л
- СОЭ 12 мм/час
- СОЭ 18 мм/час
- лейкоцитоз 8,0 x 10 в 9/л

**1205.** Выберите правильный ответ

Необходимо исследовать кровь и мочу на сахар у беременных, имевших

- роды крупным плодом
- запоздалые роды
- 2 аборта
- быстрые роды

**1206.** Выберите правильный ответ

Основная задача диспансерного наблюдения женщин в период беременности

- предупреждение и ранняя диагностика возможных осложнений беременности, родов, послеродового периода и патологии новорожденных
- выявление беременности в ранние сроки
- профилактика непланируемой беременности
- санитарно-просветительная работа

**1207.** Выберите правильный ответ

При инсулинозависимом диабете

- необходимо планировать беременность и родоразрешение после консультаций акушера и эндокринолога
- женщина может сама планировать беременность
- женщина должна наблюдаться во время беременности только у эндокринолога
- степень риска осложнений у матери и у ребенка незначительна

**1208.** Выберите правильный ответ

Сохранение беременности противопоказано при наличии

- тиреотоксикоза
- начавшегося выкидыша
- умеренной анемии
- миопии средней степени

**1209.** Выберите правильный ответ

Декомпенсация сердечной деятельности во время беременности наиболее всего вероятна

- при пороках «синего типа»
- через 2 года после митральной комиссуротомии
- недостаточности митрального клапана
- при вегето-сосудистой дистонии по гипотоническому типу

**1210.** Выберите правильный ответ

Недостаточность кровообращения при сердечной патологии чаще всего возникает

- во 2-м и 3-м триместрах беременности и в родах
- в первую неделю беременности
- в первый месяц беременности
- до 12 недель беременности

**1211.** Выберите правильный ответ

При синдроме сдавления нижней полой вены

- затруднен возврат крови к сердцу из нижних конечностей
- наблюдается гипертензия
- повышается ОЦК
- самочувствие не страдает

**1212.** Выберите правильный ответ

Пиурия и бактериурия является у беременной признаком

- пиелонефрита
- раннего гестоза
- позднего гестоза
- диабета

**1213.** Выберите правильный ответ

При лечении острого пиелонефрита во время беременности нежелательно применение

- гентамицина
- фитолизина
- отвара медвежьих ушек
- настойки толокнянки

**1214.** Выберите правильный ответ

Беременность противопоказана при

- склеродермии и системной волчанке
- миопии средней степени
- умеренной анемии
- хроническом аднексите

**1215.** Выберите правильный ответ

При заболевании крови у беременной план ведения беременности и родов

- родоразрешение только методом кесарева сечения
- всегда назначается стерильная пункция
- роды проводить в наблюдательном отделении
- после заключения гематолога и данных коагулограммы

**1216.** Выберите правильный ответ

Для лечения анемии беременных назначают

- ферроплекс и феррум-лек
- фурагин и фурудонин
- фитолизин
- финоптин

**1217.** Выберите правильный ответ

Наиболее высокий риск развития уродства плода возникает в случае заболевания беременной при сроке до 13-14 недель

- краснухой
- острым ринитом
- острым трахеитом
- ветряной оспой

**1218.** Выберите правильный ответ

При заболевании беременной сифилисом

- имеется риск врожденного сифилиса у новорожденного
- заболевание не может передаваться плоду
- лечение антибиотиками противопоказано из-за риска осложнений
- роды можно проводить в индивидуальной палате физиологического родильного отделения

**1219.** Выберите правильный ответ

При пузырном заносе размеры матки

- больше, чем следует при данном сроке
- соответствуют сроку беременности
- меньше, чем следует при данном сроке
- не учитывают, как информативный признак

**1220.** Выберите правильный ответ

Для беременности, осложненной пузырным заносом, характерно

- кровомазанье
- макросомия плода
- многоплодие
- переносимость

**1221.** Выберите правильный ответ

Следствием пузырного заноса бывает заболевание матки

- хорионэпителиома
- аденокарцинома
- эндометриоз
- саркома

**1222.** Выберите правильный ответ

Женщина, имевшая злокачественную форму пузырного заноса, должна состоять на учете у специалиста

- онколога
- венеролога
- нефролога
- невропатолога

**1223.** Выберите правильный ответ

Информативный показатель для критерия излеченности после пузырного заноса

- анализ мочи и крови на хорионический гонадотропин
- уровень сахара в крови
- количество лейкоцитов в моче
- анализ крови на гемоглобин

**1224.** Выберите правильный ответ

Женщине, получавшей после пузырного заноса лечение, включающее цитостатики, следует предохраняться от беременности

- 3 года
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год

**1225.** Выберите правильный ответ

При сахарном диабете количество околоплодных вод чаще всего

- увеличено
- нормальное
- понижено
- очень мало

**1226.** Выберите правильный ответ

Риск развития резус-конфликта

- высокий при резус-положительной крови отца и отрицательной у матери
- уменьшается с каждой беременностью
- отсутствует при первой и второй беременности
- отсутствует при резус-положительной крови матери и отрицательной у отца

**1227.** Выберите правильный ответ

Контроль крови на антитела при вероятности резус-конфликта проводится

- 1 раз в месяц
- 1 раз за беременность
- 1 раз в триместр
- ежедневно

**1228.** Выберите правильный ответ

С целью профилактики резус-конфликта при второй беременности в течение 24 часов после первых родов или аборта вводят

- иммуноглобулин человека антирезус RHO(D)
- антибиотики
- гемостатические средства
- глюкокортикоиды

**1229.** Выберите правильный ответ

Профилактика незаращения позвоночника и верхнего неба у плода прием

- фолиевой кислоты
- антибиотиков
- прогестерона
- аскорбиновой кислоты

**1230.** Выберите правильный ответ

Наиболее информативный в отношении заболеваний плода анализ у матери

- кровь на уровень сывороточных маркеров А(РАРР-А) и бета ХГ
- кровь на гемоглобин
- моча на белок
- моча на сахар

**1231.** Выберите правильный ответ

Наиболее вероятно уродство плода при воздействии повреждающих факторов при беременности

- в срок 3-10 недель
- в срок 1-2 недели
- в срок 12-16 недель

- в срок 16-20 недель

**1232.** Выберите правильный ответ

Для угрожающего выкидыша характерно

- ноющие боли внизу живота
- кровотечение
- схваткообразные боли внизу живота
- укорочение шейки матки

**1233.** Выберите правильный ответ

Следующая клиническая стадия выкидыша после угрожающего

- неразвивающаяся беременность
- полный
- неполный
- в ходу

**1234.** Выберите правильный ответ

Мазок на выявление гормональной недостаточности берется

- с боковой стенки влагалища
- с поверхности шейки
- из цервикального канала
- из заднего свода

**1235.** Выберите правильный ответ

При неполном выкидыше

- показано выскабливание полости матки
- возможно сохранение беременности
- проводится выжидательная тактика
- более рационально лечение в дневном стационаре

**1236.** Выберите правильный ответ

Типичные сроки выкидыша при истмико-цервикальной недостаточности

- 16-18 недель
- до 3-х недель
- 4-6 недель
- 7-11 недель

**1237.** Выберите правильный ответ

Наложение шва при истмико-цервикальной недостаточности рационально провести

- при беременности 11-14 недель
- до беременности
- сразу после задержки месячных
- при беременности 18-26 недель

**1238.** Выберите правильный ответ

Снятие шва, наложенного при истмико-цервикальной недостаточности, проводится при сроке беременности

- 36-37 недель
- 30 недель
- 32 недели
- 39-40 недель

**1239.** Выберите правильный ответ

К наиболее редким формам аномалии таза относится

- кососмещенный таз
- общеравномерносуженный таз
- поперечносуженный таз
- простой плоский таз

**1240.** Выберите правильный ответ

Таз с наружными размерами 23-25-28-18

- общеравномерносуженный
- поперечносуженный
- плоскорихитический
- простой плоский

**1241.** Выберите правильный ответ

Поперечносуженный таз имеет размеры

- 22-24-26-21
- 25-28-31-21
- 28-28-32-17
- 25-28-31-18

**1242.** Выберите правильный ответ

Для плоскорихитического таза характерны размеры

- 29-28-33-17
- 25-28-31-21
- 21-23-28-19
- 23-25-28-22

**1243.** Выберите правильный ответ

Степени сужения плоского таза определяются по размерам

- истинной конъюгаты
- индекса Соловьева
- поперечного размера плоскости входа
- поперечного размера плоскости выхода

**1244.** Выберите правильный ответ

По истинной конъюгате нельзя судить о степени сужения

- поперечносуженного таза
- простого плоского таза
- плоскорихитического таза
- общеравномерносуженного таза

**1245.** Выберите правильный ответ

При 4 степени сужения таза истинная конъюгата равна

- 6 см
- 12 см
- 10 см
- 8 см

**1246.** Выберите правильный ответ

Степень сужения таза при истинной конъюгате равной 8,5 см

- 2-я
- 1-я
- 3-я
- 4-я

**1247.** Выберите правильный ответ

При четвертой степени сужения таза роды заканчивают путем

- операции кесарева сечения
- наложения акушерских щипцов
- родостимуляции
- вакуум-экстрации плода

**1248.** Выберите правильный ответ

При сроке беременности 16 недель жалоб нет, дно матки на середине между пупком и лобком, шевеление и сердцебиение не определяется. Заключение акушерки

- произошла антенатальная гибель плода
- беременность протекает без осложнения
- рост матки отстает от срока беременности

- показана срочная госпитализация

**1249.** Выберите правильный ответ

У беременной при восьми неделях желанной беременности на приеме в женской консультации жалобы на кровомазанье и ноющие боли внизу живота - это

- угрожающий выкидыш
- нормальные месячные
- начавшиеся преждевременные роды
- нормальное течение беременности

**1250.** Выберите правильный ответ

Болезненное мочеиспускание у беременной

- свидетельствует о воспалении мочевыводящих путей
- характерно для нормальной беременности
- вызвано сдавлением мочевого пузыря головкой и является нормой в конце беременности
- является показанием к цистографии

**1251.** Выберите правильный ответ

Беременная при сроке 25 недель, необходимо назначить

- калия йодид 200-250 мг
- санацию влагалища
- препараты магния
- начать подготовку родовых путей к родам

**1252.** Выберите правильный ответ

Амниоцентез во время беременности

- выполняется при подозрении на патологию развития плода под контролем УЗИ
- необходимо профилактически проводить всем беременным
- может выполнять акушерка
- всегда приводит к прерыванию беременности

**1253.** Выберите правильный ответ

Витамины во время беременности

- как любые лекарственные средства, должны назначаться акушером
- можно принимать без консультации врача
- не могут причинить вред плоду в период эмбриогенеза
- не следует назначать из-за опасности возникновения фетопатологии

**1254.** Выберите правильный ответ

Гинекологическая патология

- является причиной многих осложнений во время беременности, родов и послеродового периода
- не учитывается, если с момента заболевания прошло 5 лет
- не учитывается, если после неё были нормальные роды
- не может проявляться во время беременности

**1255.** Выберите правильный ответ

Наиболее безопасная диагностика фетоплацентарной недостаточности проводится при помощи

- УЗИ и КТГ
- пункции плаценты
- кордоцентеза

- амниоцентеза

**1256.** Выберите правильный ответ

Заболевания, передающиеся половым путем

- могут вызвать уродство или гибель плода
- не влияют на вынашивание беременности
- не лечатся во время беременности
- не могут быть диагностированы во время беременности.

**1257.** Выберите правильный ответ

Профилактика привычного невынашивания будет эффективной, если её начинать

- до беременности
- с 1-го триместра беременности
- со 2-го триместра
- с момента взятия женщины на учет по беременности

**1258.** Выберите правильный ответ

Анализ крови внутриутробного плода и внутриутробное переливание крови плоду

- проводится для лечения резус-конфликта с хорошим эффектом в крупных перинатальных центрах

- практически пока не осуществляется
- может быть проведено в любом родильном доме
- пока не имеет положительных результатов и всегда приводит к осложнениям

**1259.** Выберите правильный ответ

Цель госпитализации беременной в сроке 36-37 недель при наличии у нее сахарного диабета

- решение вопроса о родоразрешении
- мониторинг течения беременности и сахарного диабета
- компенсация углеводного обмена
- решение вопроса о целесообразности пролонгирования беременности, подбора терапии

**1260.** Выберите правильный ответ

Мазки на онкоцитологическое исследование во время беременности

- назначаются женщинам с эрозией шейки матки
- назначаются всем женщинам
- назначаются только женщинам, желающим прервать беременность
- не назначаются

**1261.** Выберите правильный ответ

Мазки на гормональный фон во время беременности

- назначают женщинам из группы риска по невынашиванию
- назначают всем беременным
- не назначают
- берут из цервикального канала

**1262.** Выберите правильный ответ

При двурогой и седловидной матке

- часто бывает невынашивание и аномалии положения
- роды через естественные родовые пути невозможны

- беременной следует обязательно прервать беременность

- во время беременности диагноз подтверждается рентгенологическим исследованием

**1263.** Выберите правильный ответ

Причиной возникновения аномалий половых органов являются повреждающие факторы в период

- первых трех месяцев внутриутробного развития
- 3-го триместра беременности
- первого года жизни
- препубертатного возраста

**1264.** Выберите правильный ответ

При диагностике гонореи во время беременности не используется

- провокация с гоновакциной
- бактериоскопия
- культуральный посев
- алиментарная провокация

**1265.** Выберите правильный ответ

Для местного лечения трихомониаза у беременных во втором триместре применяют

- трихопол
- овестин
- осарбон
- сарсол

**1266.** Выберите правильный ответ

Для санации влагалища перед родами применяют свечи

- полижинакс
- свечи с красавкой
- свечи с простагландинами
- свечи с анестезином

**1267.** Выберите правильный ответ

Для диагностики нарушений гормонального обмена во время беременности нельзя применять

- рентгенодиагностику области турецкого седла
- тесты функциональной диагностики
- ультразвуковую диагностику
- исследование концентрации гормонов в крови

**1268.** Выберите правильный ответ

Фитотерапия

- разрешается для применения в акушерской практике по назначению врача
- не разрешается в акушерской практике
- является оптимальным методом при профилактике и лечении любых акушерских осложнений

- не вызывает побочных эффектов и осложнений у беременных и рожениц

**1269.** Выберите правильный ответ

Тест на беременность при внематочной беременности

- положителен
- отрицателен
- не используется в дифференциальной диагностике
- не считается надежным методом исследования

**1270.** Выберите правильный ответ

При диагностике рака шейки матки 1-ой стадии при сроке беременности 10 недель рекомендуется

- беременность прервать и проводить лечение заболевания
- лечение проводить после родоразрешения
- провести диатермокоагуляцию во время беременности
- провести лечение эрозии лазером во время беременности

**1271.** Выберите правильный ответ

При диагностике эрозии шейки матки у беременной, заинтересованной в сохранении беременности, рекомендуется провести

- кольпоскопию
- диатермокоагуляцию
- диатермоэксцизию
- криодеструкцию.

**1272.** Выберите правильный ответ

Заинтересованной в сохранении беременности пациентке при эрозии шейки матки противопоказано

- диатермокоагуляция
- взятие мазка на онкоцитологию
- кольпоскопия
- взятие мазка на степень чистоты

**1273.** Выберите правильный ответ

Для лечения кандиозного кольпита у беременных применяют

- клион-Д
- настой календулы
- свечи с лактобактерином
- вобензим

**1274.** Выберите правильный ответ

Гломерулонефрит у беременных

- рано осложняется развитием гипертензивных расстройств
- чаще встречается в острой стадии
- считается одной из причин предлежания плаценты
- при благоприятном течении является показанием к госпитализации за 3 недели до родов

**1275.** Выберите правильный ответ

Пиелонефрит у беременных

- чаще встречается во второй половине беременности
- протекает бессимптомно
- сопровождается тяжелой анемией
- является противопоказанием для катетеризации мочеочника

**1276.** Выберите правильный ответ

Острый пиелонефрит беременных

- может осложняться развитием бактериально-токсического шока
- обычно не сопровождается выраженной интоксикацией
- не представляет сложностей в дифференциальной диагностике
- является противопоказанием к катетеризации мочеочников

**1277.** Выберите правильный ответ

Пиелонефрит беременных

- повышает риск послеродовых гнойно-септических осложнений
- при наличии частых обострений является показанием к прерыванию беременности
- характеризуется быстрым регрессом после прерывания беременности
- обычно обостряется на 4-6 и 12-14 день послеродового периода

**1278.** Выберите правильный ответ

Выкидышем называется прерывание беременности до

- 22 недель
- 12 недель
- 28 недель
- 25 недель

**1279.** Выберите правильный ответ

Беременность вынашивать можно при степени тяжести гипертонической болезни (ГБ)

- ГБ I-ГБ IIА
- ГБ II Б
- ГБ III А
- ГБ III Б

**1280.** Выберите правильный ответ

Сроки плановой госпитализации беременной, больной сахарным диабетом для родоразрешения

- 35-36 недель
- 38 недель
- 39 недель
- 34 недель

**1281.** Выберите правильный ответ

Rh-конфликт во время беременности может развиваться при

- беременности Rh-отрицательной женщины Rh-положительным плодом
- беременности Rh-отрицательной женщины Rh-отрицательным плодом
- беременности Rh-положительной женщины Rh-отрицательным плодом
- беременности Rh-положительной женщины Rh-положительным плодом

**1282.** Выберите правильный ответ

Общеравномерно суженный таз - это

- таз, все размеры которого уменьшены равномерно на 2 см и более
- таз, прямые размеры которого уменьшены равномерно на 2 см и более
- таз, поперечные размеры которого уменьшены равномерно на 2 см и более
- таз, у которого размеры плоскости входа в малый таз уменьшены на 2 см и более

**1283.** Выберите правильный ответ

Плоский таз - это

- таз, прямые размеры которого уменьшены во всех плоскостях
- таз, поперечные размеры которого уменьшены во всех плоскостях

таз, прямые размеры которого уменьшены в плоскости входа

таз, прямые размеры которого уменьшены в плоскости выхода

**1284.** Выберите правильный ответ

Плоскорихитический таз - это

таз, у которого сужен только прямой размер входа

таз, прямые размеры которого уменьшены во всех плоскостях

таз, поперечные размеры которого уменьшены во всех плоскостях

таз, прямые размеры которого уменьшены в плоскости выхода

**1285.** Выберите правильный ответ

Во входе общесуженного плоского таза больше других уменьшен размер

прямой

поперечный

косой

прямой и поперечный

**1286.** Выберите правильный ответ

Признак внутриутробной гипоксии

учащение сердцебиения плода свыше 160 уд. в мин

шум пуповины

выслушивание сердцебиения плода ниже пупка

отсутствие шевеления плода

**1287.** Выберите правильный ответ

Показания для госпитализации при рвоте беременных

рвота более 10 раз в сутки и потеря массы тела более 3 кг за 1-1,5 недель

рвота более 5 раз в сутки

потеря массы тела 0,5 кг за неделю

рвота 8 раз в сутки

**1288.** Выберите правильный ответ

Противорецидивные препараты при герпесе

беременных назначаются со срока беременности

36 недель

16 недель

20 недель

26 недель

**1289.** Выберите правильный ответ

Беременные с туберкулезом госпитализируются

в противотуберкулезный диспансер

в инфекционную больницу

в наблюдательное отделение родильного дома

в специализированный родильный дом

**1290.** Выберите правильный ответ

Профилактика врожденного сифилиса проводится со срока беременности

16 недель

12 недель

20 недель

30 недель

**1291.** Выберите правильный ответ

Показания для госпитализации при токсоплазмозе

лихорадка более 7 дней

внутриутробная гипоксия плода

проводится в сроке 30 недель

проводится за 2 недели до родов с профилактической целью

**1292.** Выберите правильный ответ

Госпитализация при хронической ревматической болезни сердца показана при сроке беременности

до 10 недель, в 28-32 недели, в 38 недель

в 12 и 32 недели

в 20 и 38 недель

в 36 недель

**1293.** Выберите правильный ответ

Цель госпитализации беременных с

ревматическими заболеваниями сердца в 10 недель

для решения вопроса о возможности

продолжения беременности

с целью обследования и коррекции проводимой терапии

для решения вопроса о методе родоразрешения

для подготовки к родоразрешению

**1294.** Выберите правильный ответ

Цель госпитализации беременных с

ревматическими заболеваниями сердца в 28-30 недель

с целью обследования и коррекции проводимой терапии

для решения вопроса о возможности

продолжения беременности

для подготовки к родоразрешению

для решения вопроса о состоянии

внутриутробного плода

**1295.** Выберите правильный ответ

Цель госпитализации беременных с

ревматическими заболеваниями сердца в 38 недель

для подготовки к родоразрешению, выбора

тактики и способа родоразрешения

для решения вопроса о состоянии

внутриутробного плода

с целью обследования и коррекции проводимой терапии

для решения вопроса о возможности

продолжения беременности

**1296.** Выберите правильный ответ

При тазовом предлежании показана

плановая госпитализация в 37 недель

плановая операция кесарева сечения

поворот плода на ножку

досрочное вскрытие плодного пузыря

**1297.** Выберите правильный ответ

Цель госпитализации беременных при сахарном диабете в сроке 10-12 недель

для решения вопроса о целесообразности

продолжения беременности, подбора терапии

для компенсации углеводного обмена

для мониторинга течения беременности и

сахарного диабета

для решения вопроса о родоразрешении

**1298.** Выберите правильный ответ

Цель госпитализации беременных при сахарном диабете в сроке 21-24 недели

- для компенсации углеводного обмена
- для решения вопроса о целесообразности пролонгирования беременности, подбора терапии
- для мониторинга течения беременности и сахарного диабета
- для решения вопроса о родоразрешении

**1299.** Выберите правильный ответ

Цель госпитализации беременных при сахарном диабете в сроке 32 недели

- для мониторинга течения беременности и сахарного диабета
- для компенсации углеводного обмена
- для решения вопроса о целесообразности пролонгирования беременности, подбора терапии
- для решения вопроса о родоразрешении

**1300.** Выберите правильный ответ

Женщины, родившие в машине скорой помощи, поступают

- в наблюдательное отделение родильного дома
- в физиологическое послеродовое отделение
- в физиологическое родильное отделение
- в инфекционную больницу

**1301.** Выберите правильный ответ

Госпитализация в наблюдательное отделение родильного дома показана при наличии у роженицы

- кондиломатоза
- нейродермита
- витилиго
- псориаза

**1302.** Выберите правильный ответ

Гнойно-воспалительные заболевания новорожденных и родильниц считаются за акушерским стационаром, если они возникли

- в период пребывания в роддоме или в течение 7 дней после выписки
- через 3 недели после выписки из роддома
- в период декретного послеродового отпуска
- в период первых 6 месяцев после родов

**1303.** Выберите правильный ответ

Вариант аномалии родовой деятельности

- чрезмерно сильная родовая деятельность
- запоздалое излитие околоплодных вод
- недонашивание беременности
- запоздалые роды

**1304.** Выберите правильный ответ

Аномалия родовой деятельности

- слабость родовых сил
- схватки-предвестники
- раннее излитие околоплодных вод
- многоплодие

**1305.** Выберите правильный ответ

Дискоординированная родовая деятельность является

- вариантом аномалии родовой деятельности
- родами двойней
- преждевременным излитием околоплодных вод

- схватками 4-5 за 10 минут

**1306.** Выберите правильный ответ

Патологический прелиминарный период

- аномалия родовой деятельности
- запоздалое излитие околоплодных вод
- перенашивание беременности
- схватки предвестники

**1307.** Выберите правильный ответ

Ятрогенные факторы риска аномалий родовой деятельности

- неадекватное обезболивание и грубые манипуляции в родах
- влагалищные исследования в родах через 4-6 часов
- введение спазмолитических средств
- постановка очистительной клизмы

**1308.** Выберите правильный ответ

Факторы риска развития аномалий родовой деятельности

- несвоевременное вскрытие плодного пузыря и несвоевременное применение родостимуляции
- частые влагалищные исследования в родах
- предоставление роженице медикаментозного сна-отдыха
- проведение кардиотокографии

**1309.** Выберите правильный ответ

Факторы риска развития аномалий родовой деятельности со стороны плода

- задержка развития плода, перезрелый плод
- плод мужского пола
- головное предлежание плода
- гипотрофия плода

**1310.** Выберите правильный ответ

Признаки патологического прелиминарного периода

- наличие нерегулярных болезненных сокращений матки при отсутствии структурных изменений шейки матки
- сглаживание шейки матки и медленное раскрытие маточного зева
- скорость раскрытия шейки матки 0,35см/час
- наличие регулярных схваток и открытие шейки матки на 4 см

**1311.** Выберите правильный ответ

Возможные осложнения стремительных родов

- преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
- выпадение петель пуповины
- продолжительность родов более 8 часов
- запущенное поперечное положение плода

**1312.** Выберите правильный ответ

Стремительные роды могут осложняться

- глубокими разрывами мягких тканей родовых путей
- образованием узлов пуповины
- задним видом затылочного предлежания плода
- запоздалым вскрытием плодного пузыря

**1313.** Выберите правильный ответ

Симптомы первичной слабости родовой деятельности

- схватки редкие, короткие, слабые, возбудимость и тонус матки снижены
- наличие регулярных схваток
- прогрессирующее раскрытие шейки матки
- полноценный плодный пузырь

**1314.** Выберите правильный ответ

Признак первичной слабости родовой деятельности

- недостаточная скорость раскрытия шейки матки
- болезненные схватки
- скорость раскрытия шейки матки составляет 2 см/час
- дородовое излитие околоплодных вод

**1315.** Выберите правильный ответ

Тактика при первичной слабости родовой деятельности

- амниотомия, родостимуляция
- родовозбуждение
- применение токолитиков
- динамическое наблюдение

**1316.** Выберите правильный ответ

Осложнения при слабости родовой деятельности

- утомление роженицы, гипоксия плода
- тошнота, рвота
- неустойчивое положение плода
- синклитическое вставление головки плода

**1317.** Выберите правильный ответ

Длительный безводный период, развитие хориоамнионита в родах возможны при

- слабости родовой деятельности
- повышении АД
- болезненных, частых схватках
- формировании пояса прилегания

**1318.** Выберите правильный ответ

Симптомы дискоординированной родовой деятельности

- болезненность схваток, отсутствие динамики раскрытия шейки матки
- периодичность и сила схваток сохранены
- предлежащая часть плода в полости малого таза
- слабые, малоэффективные схватки

**1319.** Выберите правильный ответ

Основная причина развития поздних преждевременных родов

- перерастяжение матки
- хромосомная патология эмбриона
- интенсивное курение
- приём витаминов для беременных

**1320.** Выберите правильный ответ

Наиболее частая причина преждевременных родов в сроке беременности 22-27 недель

- истмико-цервикальная недостаточность
- недостаточность функции желтого тела
- сахарный диабет
- пол ребёнка

**1321.** Выберите правильный ответ

Показание для активной тактики при преждевременных родах

- начавшиеся преждевременные роды
- угрожающие преждевременные роды
- целый плодный пузырь
- головное предлежание плода

**1322.** Выберите правильный ответ

Показание для операции кесарева сечения при преждевременных родах

- поперечное положение плода или ножное предлежание плода (до 32 недель беременности)
- острое многоводие
- врожденный порок развития плода
- раннее излитие околоплодных вод

**1323.** Выберите правильный ответ

Преждевременные роды следует закончить операцией кесарева сечения при

- эклампсии
- маловодии
- пороке развития плода
- раннем отхождении вод

**1324.** Выберите правильный ответ

Клинические признаки угрожающих преждевременных родов

- тянущие или тупые боли внизу живота и в поясничной области
- выраженные схваткообразные боли
- прогрессирующее сглаживание шейки матки
- головка большим сегментом во входе в малый таз

**1325.** Выберите правильный ответ

Клинические признаки начавшихся преждевременных родов

- регулярная родовая деятельность, прогрессирующее сглаживание шейки матки
- периодический тонус матки
- предлежащая часть плода над входом в малый таз
- тянущие боли внизу живота

**1326.** Выберите правильный ответ

Особенности ведения преждевременных родов

- ручное пособие без защиты промежности
- ранняя амниотомия
- наложение акушерских щипцов
- извлечение плода за ножку

**1327.** Выберите правильный ответ

Основная задача ведения I периода преждевременных родов - профилактика

- чрезмерно сильной родовой деятельности
- кровотечения
- разрывов промежности
- гипоксии плода

**1328.** Выберите правильный ответ

Основная причина преждевременного разрыва плодных оболочек

- инфицирование нижнего полюса плодного пузыря
- изменения в системе гемостаза материнского организма

- хромосомная патология плода
- гормональные нарушения материнского организма

**1329.** Выберите правильный ответ

Основная жалоба беременных при преждевременном разрыве плодных оболочек

- появление жидких выделений из половых путей
- чувство давления и распирания во влагалище
- схваткообразные боли внизу живота и в поясничной области
- учащенное мочеиспускание

**1330.** Выберите правильный ответ

Диагностика преждевременного разрыва плодных оболочек

- нитразиновый тест
- направление беременной женщины на КТГ
- анализ результатов окситоцинового теста
- анализ мочи на белок

**1331.** Выберите правильный ответ

Лабораторная диагностика преждевременного разрыва плодных оболочек

- мазок на определение элементов околоплодных вод (нитрозиновое тестирование)
- мазок на онкоцитологию
- мазок на степень чистоты содержимого влагалища
- мазок на гормональное зеркало

**1332.** Выберите правильный ответ

У роженицы с двойней послеродовой декретный отпуск составляет

- 110 дней
- 86 дней
- 70 дней
- 140 дней

**1333.** Выберите правильный ответ

Наибольший риск для здоровья матери и ребенка возникает при родоразрешении

- в домашних условиях
- в условиях наблюдательного родильного дома
- в акушерском отделении многопрофильной больницы
- в условиях специализированного родильного дома.

**1334.** Выберите правильный ответ

Акушерке разрешается выполнять в отсутствие врача при срочной необходимости операцию

- ручное обследование полости матки
- искусственный аборт
- акушерские щипцы
- кесарево сечение

**1335.** Выберите правильный ответ

В послеродовом периоде акушерке запрещено проводить беседы на тему

- методы прерывания беременности
- гигиена и питание родильницы
- профилактика послеродовых осложнений
- контрацепция и вред аборта

**1336.** Выберите правильный ответ

Роды двойней протекают с меньшими осложнениями при

- головном предлежании 1-го и 2-го плодов
- поперечном положении 2 плода и головном 1-го
- ножном предлежании первого плода и головном 2-го
- поперечном предлежании двух плодов

**1337.** Выберите правильный ответ

При ножном предлежании 1-ого плода и головном предлежании 2-ого плода моноамниотической двойни

- имеется риск коллизии плодов
- нет риска для осложнений
- роды вести через естественные родовые пути
- показан поворот 1-го плода

**1338.** Выберите правильный ответ

После рождения первого из двойни плода нужно в первую очередь

- проверить наружными приемами положение, предлежание, сердцебиение второго плода и произвести влагалищное исследование
- ввести внутривенно метилэргометрин
- оценить характер схваток
- ничего не предпринимать

**1339.** Выберите правильный ответ

Пособие по Цовьянову 1 проводится при

- чисто ягодичном предлежании
- ножном предлежании
- поперечном положении
- косом положении плода

**1340.** Выберите правильный ответ

Для профилактики спазма маточного зева при тазовом предлежании в начале второго периода родов внутривенно вводят

- дротаверин
- метилэргометрин
- окситоцин
- промедол

**1341.** Выберите правильный ответ

Пособие по Цовьянову 1 применяется с целью

- сохранения членорасположения плода
- исправления положения плода
- родостимуляции
- профилактики кровотечения.

**1342.** Выберите правильный ответ

При тазовом предлежании головка прорезывается

- малым косым размером
- средним косым размером
- большим косым размером
- прямым размером

**1343.** Выберите правильный ответ

При запущенном поперечном положении плода и мертвом плоде показано произвести

- плодоразрушающую операцию
- кесарево сечение
- поворот по Архангельскому
- поворот плода на ножку

**1344.** Выберите правильный ответ

Для выведения головки при ягодичном и ножном предлежании применяется метод

- Мориссо-Левре
- Кюстнера-Чукалова
- Креде-Лазаревича
- Уилта-Иванова

**1345.** Выберите правильный ответ

Выпадение пуповины наиболее вероятно в случае отхождения вод при

- поперечном положении плода
- головном предлежании
- чисто ягодичном предлежании
- смешанном тазовом предлежании

**1346.** Выберите правильный ответ

При запрокидывании передней ручки в родах в тазовом предлежании необходимо

- перевести переднюю ручку в заднюю и извлечь её умывательным движением
- её нужно извлечь из-под лона
- применить метод Крестеллера
- применить бинт Вербова

**1347.** Выберите правильный ответ

В случае родов при ножном предлежании и массе плода 3800 г наиболее рационально применение

- операции кесарево сечение
- родостимуляции
- перинеотомии
- классического акушерского пособия

**1348.** Выберите правильный ответ

При родах двойней после рождения 1-ого плода

- имеется риск преждевременной отслойки плаценты
- надо положить холод на матку
- нужно внутривенно ввести метилэргометрин
- можно не опасаться за естественное родоразрешение второго плода

**1349.** Выберите правильный ответ

При ведении родов на фоне преэклампсии средней тяжести рекомендуется проводить

- укорочение периода изгнания
- позднее вскрытие плодного пузыря
- применение вакуум-экстракции
- ручное отделение плаценты

**1350.** Выберите правильный ответ

Роды у женщины с диабетом должны проводиться в

- специализированном роддоме
- родильном доме общего профиля
- наблюдационном отделении
- в домашних условиях

**1351.** Выберите правильный ответ

При миопии 2-ой степени (-5-6 диоптрий) показано

- укорочение периода изгнания путем перинеотомии
- естественное родоразрешение без оперативных вмешательств
- исключение потуг методом наложения акушерских щипцов
- кесарево сечение

**1352.** Выберите правильный ответ

При многоводии в родах вскрытие плодного пузыря следует производить

- при раскрытии шейки на 2 см вне схватки
- на высоте схватки
- не раньше раскрытия шейки матки на 8 см
- при полном раскрытии

**1353.** Выберите правильный ответ

Признак начавшейся внутриутробной гипоксии плода

- зеленые околоплодные воды
- частота сердцебиения плода 130 уд/мин
- сукровичные выделения
- гемоглобин у матери 102 г/л

**1354.** Выберите правильный ответ

Запоздалыми считаются роды, начиная со срока беременности

- 295 дней
- 270 дней
- 280 дней
- 256 дней

**1355.** Выберите правильный ответ

При перенашивании

- увеличивается процент оперативных вмешательств в родах
- количество вод, как правило увеличивается
- роды проходят точно так же, как и срочные
- невозможны роды через естественные родовые пути

**1356.** Выберите правильный ответ

Слабость и дискоординированная родовая деятельность реже бывает у женщин

- после психопрофилактической подготовки к родам
- юного возраста
- получавших сохраняющую терапию
- проходивших гормональную терапию по поводу нарушения менструального цикла

**1357.** Выберите правильный ответ

Причина слабости родовой деятельности

- заболевания матки
- повышение выработки эстрадиола
- понижение выработки окситоцина
- повышение концентрации простагландинов

**1358.** Выберите правильный ответ

Преждевременным называется отхождение вод

- до начала родовой деятельности
- с началом родовой деятельности
- при открытии шейки 3 см
- при открытии шейки 6 см

**1359.** Выберите правильный ответ

В случае преждевременного отхождения вод и отсутствия схваток в динамике следует начать родостимуляцию не позднее

- 6 часов
- 12 часов
- суток
- 30 минут

**1360.** Выберите правильный ответ

При затягивании безводного периода антибактериальная терапия назначается не позднее

- 12 часов
- 3 часов
- 1 часа
- 24 часов

**1361.** Выберите правильный ответ

При подготовке к проведению родостимуляции акушерка разводит в 500 мл физ. раствора

- 1 мл (5 ЕД) окситоцина
- 5 мл (1 ЕД) окситоцина
- 10 мл окситоцина
- 1 мл метилэргометрина

**1362.** Выберите правильный ответ

Родостимуляцию следует начинать с введения стандартно разведенного окситоцина со скоростью

- 4-6 капель в минуту
- 20-30 капель в минуту
- 40-60 капель в минуту
- струйно

**1363.** Выберите правильный ответ

В целях родостимуляции можно использовать

- простенон
- прогестерон
- партусистен
- папаверин

**1364.** Выберите правильный ответ

С целью родостимуляции применяют

- энзопрост
- эуфиллин
- эссенциале
- этимизол

**1365.** Выберите правильный ответ

Для снятия гипертонуса матки применяют

- гинипрал
- динопрост
- синестрол
- хлористый кальций

**1366.** Выберите правильный ответ

При слабости потуг во 2 периоде срочных родов при головке в полости малого таза и гипоксии плода показано

- наложение акушерских щипцов
- чревосечение
- кесарево сечение
- применение кожно-головных щипцов

**1367.** Выберите правильный ответ

Из последствий слабости родовой деятельности исключается

- истинное приращение плаценты
- асфиксия плода
- длительный безводный период
- кровотечение в последовом периоде

**1368.** Выберите правильный ответ

При переутомлении роженицы, целых водах и слабости родовой деятельности в латентной фазе родов противопоказано применять

- родостимуляцию
- введение раствора глюкозы с витамином С

- введение спазмолитиков
- медикаментозный сон-отдых

**1369.** Выберите правильный ответ

Длительное низкое стояние стреловидного шва в поперечном размере таза наблюдается при

- плоском тазе
- поперечносуженном тазе
- нормальном тазе
- тазе с размерами 25-28-31-21

**1370.** Выберите правильный ответ

Высокое прямое стояние стреловидного шва наблюдается при

- поперечносуженном тазе
- нормальном тазе
- простом плоском тазе
- общеравномерносуженном тазе

**1371.** Выберите правильный ответ

Узкий лонный угол наблюдается

- при общеравномерносуженном тазе
- при нормальном тазе
- при простом плоском тазе
- при широком тазе

**1372.** Выберите правильный ответ

В родах головка чрезмерно сгибается и конфигурирует при

- общеравномерносуженном тазе
- тазе с размерами 25-28-32-22
- нормальном тазе
- плоском тазе

**1373.** Выберите правильный ответ

Разгибание является первым моментом биомеханизма родов при

- переднетеменном вставлении
- переднем виде затылочного вставления
- заднем виде затылочного вставления
- поперечносуженном тазе

**1374.** Выберите правильный ответ

Крайняя степень разгибания головки наблюдается на входе в малый таз при

- лицевом вставлении
- лобном вставлении
- переднеголовном вставлении
- заднем виде затылочного вставления

**1375.** Выберите правильный ответ

При переднеголовном предлежании головка прорезывается

- прямым размером
- малым косым размером
- большим косым размером
- вертикальным размером

**1376.** Выберите правильный ответ

Проводная точка при переднеголовном вставлении

- большой родничок
- малый родничок
- корень носа
- подбородок

**1377.** Выберите правильный ответ

Головка прорезывается вертикальным размером при

- лицевом предлежании
- лобном предлежании
- переднеголовном предлежании
- тазовом предлежании

**1378.** Выберите правильный ответ

Точка фиксации при лицевом предлежании

- подъязычная кость
- подзатылочная ямка
- переносица
- верхняя челюсть

**1379.** Выберите правильный ответ

При переднеголовном вставлении сгибание происходит относительно точки фиксации

- переносица
- граница волосистой части
- подбородок
- подзатылочная ямка

**1380.** Выберите правильный ответ

Роды наиболее травматичны через естественные родовые пути при

- лобном вставлении
- заднем виде затылочного предлежания
- переднем виде затылочного предлежания
- переднетеменном вставлении

**1381.** Выберите правильный ответ

При лицевом предлежании первым из половой щели прорезывается

- рот
- нос
- лоб
- большой родничок

**1382.** Выберите правильный ответ

При переднем асинклитизме стреловидный шов

- отклоняется к мысу
- отклоняется к лону
- отклоняется кпереди
- остается по проводной оси таза

**1383.** Выберите правильный ответ

Факторы риска развития послеродовых инфекций

- задержка частей последа в полости матки
- грудное вскармливание
- своевременное опорожнение кишечника после родов

- быстрые роды

**1384.** Выберите правильный ответ

Входные ворота послеродовой инфекции

- плацентарная площадка
- околоплодные воды
- пуповина
- тазовое дно

**1385.** Выберите правильный ответ

Факторы риска развития послеродовых инфекций во время родов

- многократные влагалищные исследования в родах
- отхождение слизистой пробки
- своевременное излитие околоплодных вод
- выделение отделившегося последа по методу Абуладзе

**1386.** Выберите правильный ответ

Осложнения на фоне длительного безводного промежутка

- послеродовый эндометрит
- аномалии родовой деятельности
- клинически узкий таз
- приращение плаценты

**1387.** Выберите правильный ответ

Послеродовые инфекционные заболевания экстрагенитальной локализации

- тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних конечностей
- железодефицитная анемия
- послеродовая депрессия
- разрыв лонного сочленения

**1388.** Выберите правильный ответ

Разрыв шейки от 2 см до сводов

- 2 степени
- 1 степени
- 3 степени
- 4 степени

**1389.** Выберите правильный ответ

Разрывы шейки зашивают

- кетгутом
- лавсаном
- шелком
- капроном

**1390.** Выберите правильный ответ

Разрыв промежности, при котором происходит разрыв наружного сфинктера прямой кишки

- 3 степени
- 2 степени
- 1 степени
- 4 степени

**1391.** Выберите правильный ответ

После зашивания промежности запрещено сидеть

- 2 недели
- 2 дня
- 5 дней
- только при разрыве 3 степени

**1392.** Выберите правильный ответ

Родильнице со швами на промежности полагается послеродовый декретный отпуск

- 70 дней
- 56 дней
- 86 дней
- 84 дня

**1393.** Выберите правильный ответ

Послеродовый декретный отпуск 70 дней выдается после

- амниотомии
- ручного обследования полости матки
- эклампсии
- кесарева сечения

**1394.** Выберите правильный ответ

Вид травмы мягких родовых путей встречающийся наиболее часто

- разрывы влагалища
- разрыв матки

- разрыв шейки матки III степени
- разрыв лонного сочленения

**1395.** Выберите правильный ответ

Сине-багровая опухоль в области большой половой губы после рождения плода свидетельствует о

- наличия гематомы вульвы или влагалища
- бартолините
- кисте бартолиновой железы
- вульвите

**1396.** Выберите правильный ответ

При быстро нарастающей гематоме вульвы или влагалища следует предпринять

- вскрыть гематому, прошить сосуд, ушить рану
- положить пузырь со льдом
- наблюдать в течение двух часов
- осмотреть родовые пути

**1397.** Выберите правильный ответ

Разрыв промежности при изгнании плода происходит

- в момент прорезывании головки плода при разгибательных предлежаниях
- при рождении переднего плечика
- после рождения головки плода
- при врезывании головки

**1398.** Выберите правильный ответ

Разрыв промежности I степени

- разрыв кожи в области задней спайки
- разрыв задней стенки влагалища, кожи и мышц промежности
- разрыв тканей промежности и стенки прямой кишки или наружного сфинктера
- разрыв слизистой влагалища

**1399.** Выберите правильный ответ

Разрыв промежности II степени

- разрыв кожи промежности и мышц тазового дна
- разрыв кожи в области задней спайки и слизистой нижней трети влагалища
- разрыв тканей промежности и стенки прямой кишки или наружного сфинктера
- разрыв клитора

**1400.** Выберите правильный ответ

Разрыв промежности III степени

- разрыв кожи промежности, мышц тазового дна и наружный сфинктер прямой кишки
- разрыв задней стенки влагалища, кожи и мышц промежности
- разрыв кожи в области задней спайки и слизистой нижней трети влагалища
- разрыв половой губы

**1401.** Выберите правильный ответ

Угрожающий разрыв промежности характеризуется

- появлением синюшной окраски или побледнением кожи промежности, отёком
- отсутствием каких-либо характерных признаков
- гиперемией промежности
- пигментацией

**1402.** Выберите правильный ответ

Наиболее частая локализация разрыва шейки матки

- боковые отделы
- передняя губа шейки матки
- задняя губа шейки матки
- отрыв шейки матки от сводов влагалища

**1403.** Выберите правильный ответ

Данные, достаточные для диагностики разрыва шейки матки

- обнаружение разрыва шейки матки при осмотре с помощью зеркал
- появление кровотечения из половых путей
- наличие разрыва промежности II степени
- боли внизу живота

**1404.** Выберите правильный ответ

Хориоамнионит является

- противопоказанием к операции «кесарево сечение»
- абсолютным показанием к операции «кесарево сечение»
- относительным показанием к операции «кесарево сечение»
- воспалением брюшины

**1405.** Выберите правильный ответ

Зашивание разрыва промежности проводится с использованием анестезии

- местная инфильтрационная и регионарная
- эндотрахеальный наркоз
- парацервикальная
- масочный наркоз

**1406.** Выберите правильный ответ

При лечении трещин сосков рационально применение мази

- актовегиновой
- ихтиоловой
- гидрокортизоновой
- Вишневского

**1407.** Выберите правильный ответ

Показание к подавлению лактации

- недостаточность кровообращения при болезни сердца
- субинволюция матки
- кесарево сечение
- нежелание женщины кормить ребенка

**1408.** Выберите правильный ответ

При лактостазе показано

- активное кормление и сцеживание
- согревающий компресс
- подавление лактации
- УВЧ

**1409.** Выберите правильный ответ

При серозном мастите применяют

- антибиотики
- полное подавление лактации
- хирургическое вмешательство
- согревающие компрессы

**1410.** Выберите правильный ответ

Послеродовый симфизит возникает чаще всего на фоне

- остеомаляции
- нефропатии

- гепатоза
- невынашивания

**1411.** Выберите правильный ответ

При отеке промежности на 1-2 сутки после родов применяют местно

- лед
- пластырь
- горчичники
- УВЧ

**1412.** Выберите правильный ответ

При частичном расхождении швов для лучшего отхождения гноя вводят в рану турунду

- с гипертоническим раствором
- с йодом
- с облепиховым маслом
- с фурацилиновой мазью

**1413.** Выберите правильный ответ

Послеродовый метрэндометрит относится к этапу распространения септической инфекции

- 1-ый этап - инфекция ограничена областью раны
- 2-ой этап - инфекция ограничивается в основном полостью малого таза
- 3-ий этап - инфекция по клиническим проявлениям сходна с генерализованной инфекцией
- 4-ый этап - генерализованные формы общей септической инфекции

**1414.** Выберите правильный ответ

Для лечения послеродового тромбоза применяется

- гепариновая мазь
- фурацилиновая мазь
- тетрациклиновая мазь
- синтомициновая мазь

**1415.** Выберите правильный ответ

Послеродовый параметрит относится к этапу распространения септического процесса

- 2-ой этап - инфекция ограничивается полостью малого таза
- 1-ый этап - инфекция ограничена областью раны
- 3-ий этап - инфекция по клиническим проявлениям сходна с генерализованной
- 4-ый этап - генерализованные формы общей септической инфекции

**1416.** Выберите правильный ответ

Клинические проявления параметрита начинаются после родов

- на 5-6 сутки
- на 1-2 сутки
- на 10-12 сутки
- на 3-4 сутки

**1417.** Выберите правильный ответ

Из осложнений параметрита исключается

- хорионэпителиома
- гнойный инфильтрат
- свищ
- сепсис

**1418.** Выберите правильный ответ

Для пельвиоперитонита характерно

- слабо положительные симптомы раздражения брюшины
- кровянистые выделения из влагалища
- повышение артериального давления
- отсутствие жалоб

**1419.** Выберите правильный ответ

Окрашивание околоплодных вод меконием при головных предлежаниях свидетельствует

- о гипоксии плода
- о пороках развития плода
- о гемолитической болезни плода
- о внутриутробной инфекции плода

**1420.** Выберите правильный ответ

К признакам переносимости плода относится

- симптом «пачки»
- масса плода более 4500 г
- повышенная мягкость костей черепа
- окружность головки плода более 35 см

**1421.** Выберите правильный ответ

Первый период первых срочных родов. Чистое ягодичное предлежание плода. Раннее излитие околоплодных вод. Выпадение пуповины.

Показано

- срочное родоразрешение путём операции кесарево сечение
- экстракции плода за тазовый конец
- наружного профилактического поворота плода
- акушерские щипцы

**1422.** Выберите правильный ответ

Роды первые, срочные в 36 лет, в тазовом предлежании плода. Упорная слабость родовой деятельности. Безводный период 6 часов. Роды необходимо

- закончить операцией кесарево сечение
- предоставить естественному течению
- вести консервативно с назначением родостимулирующей терапии
- закончить извлечением плода за тазовый конец

**1423.** Выберите правильный ответ

Второй период первых срочных родов.

Аntenатальная гибель плода. Гидроцефалия плода.

Роды закончить путем операции

- краниотомия
- наложение акушерских щипцов
- кесарево сечение
- декапитация

**1424.** Выберите правильный ответ

Первый период третьих срочных родов. Ранее излитие вод. Поперечное положение плода.

Показано окончание родов путём

- операции кесарево сечение
- декапитация
- проведения наружно-внутреннего поворота плода на ножку
- наложения акушерских щипцов

**1425.** Выберите правильный ответ

При ведении родов у женщин, страдающих сердечно-сосудистой патологией, необходимо

раннее вскрытие плодного пузыря, укорочение периода изгнания

целесообразно роды вести консервативно-выжидательно

наиболее оптимальным является родоразрешение операцией кесарева сечения

провести родостимуляцию

**1426.** Выберите правильный ответ

Досрочное родоразрешение показано беременным

с врожденными пороками сердца

с синдромом сдавления нижней полой вены

имеющим стабилизацию гемодинамических показателей после отека легких и тромбоэмболии

с тазовым предлежанием плода

**1427.** Выберите правильный ответ

Роды у женщин с митральным стенозом или комбинированным митральным пороком с преобладанием стеноза

чаще имеют неблагоприятный прогноз, сопровождаются декомпенсацией сердечной деятельности

имеют благоприятный прогноз

редко сопровождаются декомпенсацией сердечной деятельности

не требуют терапии

**1428.** Выберите правильный ответ

Беременность и роды при недостаточности митрального клапана

обычно имеют благоприятный прогноз, редко сопровождается декомпенсацией сердечной деятельности

имеют неблагоприятный прогноз

часто сопровождаются декомпенсацией сердечной деятельности

часто сопровождаются обострением ревматического процесса

**1429.** Выберите правильный ответ

При ведении первого периода родов у рожениц, страдающих гипертонической болезнью, следует применять

обезболивание родов

своевременную амниотомию

родостимулирующую терапию

консервативно-выжидательное ведение родов

**1430.** Выберите правильный ответ

При ведении второго периода родов у рожениц, страдающих гипертонической болезнью, необходимо

измерять АД после каждой потуги, проводить укорочение второго периода

использовать сердечные гликозиды

использовать магниальную терапию

проводить витаминотерапию

**1431.** Выберите правильный ответ

К типичным осложнениям в послеродовом периоде у рожениц с сердечно-сосудистой патологией относится

нарастание недостаточности кровообращения, тромбоэмболия

гипогалактия

анемия

лохиометра

**1432.** Выберите правильный ответ

При полном раскрытии маточного зева установлено лобное вставление у доношенного живого плода. Роды необходимо закончить

операцией кесарева сечения

операцией наложения акушерских щипцов

операцией вакуум-экстракции плода

естественным путем

**1433.** Выберите правильный ответ

Осложнения в родах для матери при слабости родовой деятельности

затяжные роды, инфицирование

разрыв матки

плотное прикрепление плаценты

разрыв лонного сочленения

**1434.** Выберите правильный ответ

Анатомические изменения в матке, влияющие на её сократительную способность

пороки развития матки

крупный плод

многоводие

многоплодие

**1435.** Выберите правильный ответ

Плод, рождающийся в тазовом предлежании, начинает испытывать гипоксию с рождения

до пупка

туловища

ягодиц

головки

**1436.** Выберите правильный ответ

Ведущая точка при чисто ягодичном предлежании

передняя ягодица

задняя ягодица

левая ножка

правая ножка

**1437.** Выберите правильный ответ

Ведение родильниц после зашивания разрыва в послеродовом периоде

сухая обработка швов

мазевые прокладки

спринцевания

отказ от обработки швов

**1438.** Выберите правильный ответ

Характеристика схваток типичная для слабости родовой деятельности

слабые и кратковременные

сильные и частые

3-4 схватки за 10 минут по 40-45 секунд

потужного характера

**1439.** Выберите правильный ответ

Ведение родильницы после зашивания разрыва в послеродовом периоде

очистительная клизма перед снятием швов

самостоятельное опорожнение кишечника

- выведение мочи катетером
- швы не снимаются

**1440.** Выберите правильный ответ

Функциональный фактор, понижающий сократительную способность матки

- многоводие
- масса плода 3000 г
- тазовое предлежание плода
- головное предлежание плода

**1441.** Выберите правильный ответ

Дискоординированная родовая деятельность характеризуется

- схватки регулярные и болезненные, но раскрытие зева происходит медленно, продвижение предлежащей части задерживается
- схватки слабые, короткие, неэффективные
- сильные, частые, болезненные и эффективные схватки
- схватки регулярные нарастающие по силе и продолжительности

**1442.** Выберите правильный ответ

Чрезмерно сильная родовая деятельность характеризуется

- сильными, частыми, болезненными схватками, приводящими к быстрому завершению родового процесса
- схватки слабые, короткие, неэффективные
- предвестники родов, переходящие в регулярную родовую деятельность
- схватки регулярные и болезненные, но раскрытие зева происходит медленно, продвижение предлежащей части задерживается

**1443.** Выберите правильный ответ

Ригидность шейки матки отмечается у женщин

- перенесших воспалительные заболевания шейки матки, у возрастных первородящих
- повторнородящих
- с менструальным циклом 24-26 дней
- после удаления кисты яичника

**1444.** Выберите правильный ответ

Второй момент биомеханизма родов при тазовом предлежании

- боковое сгибание позвоночника в поясничном отделе
- внутренний поворот ягодиц
- внутренний поворот головки
- сгибание позвоночника в шейно-грудном отделе и рождение плечиков

**1445.** Выберите правильный ответ

Третий момент биомеханизма родов при тазовом предлежании

- внутренний поворот плечиков и связанный с этим наружный поворот туловища
- сгибание позвоночника в шейно-грудном отделе и рождение плечиков
- внутренний поворот головки
- боковое сгибание поясничной части позвоночника плода

**1446.** Выберите правильный ответ

Четвертый момент биомеханизма родов при тазовом предлежании

- сгибание позвоночника в шейно-грудном отделе и рождение плечиков
- боковое сгибание поясничной части позвоночника плода
- внутренний поворот ягодиц
- внутренний поворот головки

**1447.** Выберите правильный ответ

Влияние ригидности шейки матки на течение родов

- тормозит процесс раскрытия шейки и замедляет течение родов
- ускоряет процесс родов
- не влияет на течение родов
- снижает болезненность схваток

**1448.** Выберите правильный ответ

При самопроизвольных родах и преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты контрольное ручное обследование послеродовой матки проводить

- не обязательно
- в зависимости от уровня артериального давления
- в зависимости от величины кровопотери
- по желанию роженицы

**1449.** Выберите правильный ответ

Преждевременные роды осложняются

- неправильным вставлением головки плода
- формированием тазового предлежания
- чрезмерно сильной родовой деятельностью
- угрожающим разрывом промежности

**1450.** Выберите правильный ответ

Первый метод остановки кровотечения в раннем послеродовом периоде

- холод на низ живота, катетеризация мочевого пузыря, введение средств, сокращающих матку
- прижатие аорты, наложение клемм на шейку матки по Бакшееву
- введение сокращающих средств, ручное обследование стенок послеродовой матки
- осмотр мягких тканей и родовых путей, введение сокращающих средств

**1451.** Выберите правильный ответ

К оказанию пособия по Цовьянову I приступают после

- прорезывания ягодиц
- рождения плода до пупка
- рождения плода до нижних углов лопаток
- опущения предлежащей части на тазовое дно

**1452.** Выберите правильный ответ

Акушерке разрешается выполнять в отсутствие врача при срочной необходимости

- пособие по Цовьянову
- искусственный аборт
- мини-аборт
- кесарево сечение

**1453.** Выберите правильный ответ

Характерный признак полного плотного прикрепления плаценты

- отсутствие признаков отделения плаценты
- боль в животе
- кровотечение
- высота стояния дна матки выше уровня пупка после рождения плода

**1454.** Выберите правильный ответ

При кровотечении в 3 периоде родов и наличии признаков отделения плаценты необходимо

- выделить послед наружными приёмами
- вывести мочу катетером
- провести ручное отделение плаценты
- положить лёд на низ живота

**1455.** Выберите правильный ответ

Прием Морисо-Левре

- применяется для выведения головки при тазовых предлежаниях плода
- применяется для выведения ручек
- способствует переводу ножного предлежания в головное
- способствует переводу ножного предлежания в смешанное ягодичное

**1456.** Выберите правильный ответ

Симптом клинического несоответствия размеров головки плода и таза роженицы

- положительный признак Вастена и Цангемейстера
- целый плодный пузырь
- головка плода в узкой части полости малого таза
- головка плода на тазовом дне

**1457.** Выберите правильный ответ

Из осложнений в I периоде родов при тазовом предлежании плода следует исключить

- травматическое повреждение плода
- несвоевременное излитие околоплодных вод
- слабость родовой деятельности
- выпадение петель пуповины

**1458.** Выберите правильный ответ

Из особенностей биомеханизма родов при плоскорихитическом тазе следует исключить

- отсутствие внутреннего поворота головки в полости малого таза
- некоторое разгибание головки плода во входе в малый таз
- длительное стояние головки плода во входе в малый таз стреловидным швом в поперечном размере
- асинклитическое вставление головки плода

**1459.** Выберите правильный ответ

Из плодовых факторов риска аномалий родовой деятельности следует исключить

- головное предлежание плода
- внутриутробные инфекции плода
- перезрелый плод
- пороки развития плода

**1460.** Выберите правильный ответ

Из возможных осложнений стремительных родов следует исключить

- запущенное поперечное положение плода
- преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
- глубокие разрывы мягких тканей родовых путей
- родовые травмы новорожденного

**1461.** Выберите правильный ответ

Роды через естественные родовые пути при нормальных размерах таза и средней величины плода невозможны при

- лобном предлежании
- лицевом предлежании
- тазовом предлежании
- затылочном предлежании

**1462.** Выберите правильный ответ

Естественное родоразрешение при тазовых предлежаниях затруднено при

- крупном плоде
- хорошей родовой деятельности
- нормальных размерах плода
- средних размерах плода

**1463.** Выберите правильный ответ

Из патологии III периода родов следует исключить

- неправильное положение плода
- спазм маточного зева и ущемление последа
- нарушение отделения плаценты
- патология прикрепления плаценты

**1464.** Выберите правильный ответ

Число стадий распространения послеродовых гнойно-септических заболеваний

- 4
- 1
- 3
- 5

**1465.** Выберите правильный ответ

Продолжительность быстрых родов у повторнородящих

- до 4 часов
- 5-6 часов
- 2-3 часа
- 1-2 часа

**1466.** Выберите правильный ответ

Продолжительность стремительных родов у повторнородящих

- до 2 часов
- 4-5 часов
- до 1 часа
- 5-6 часов

**1467.** Выберите правильный ответ

При разрыве мягких тканей родовых путей в последовом периоде

- кровотечение возникает сразу после рождения ребенка
- кровотечение прекращается после введения маточных сокращающих средств
- кровь выделяется при массаже матки
- кровотечение отсутствует

**1468.** Выберите правильный ответ  
Исключение из особенностей современного течения послеродовых инфекций составляет  
 исчезновение клинических симптомов сразу после начала лечения  
 полиэтиологичность  
 наличие стертой клиники заболеваний  
 высокая устойчивость микроорганизмов к антибактериальной терапии

**1469.** Выберите правильный ответ  
Осложнения на фоне длительного безводного промежутка

- воспалительные заболевания матки
- нарушение биомеханизма родов
- аномалии родовой деятельности
- аномалии развития плода

**1470.** Выберите правильный ответ  
Внутриматочный лаваж с помощью антисептических растворов показан

- при эндометрите
- после каждых срочных родов
- при эндометриозе
- после гистерэктомии

**1471.** Выберите правильный ответ  
Период родов, при котором чаще наблюдается вторичная слабость родовой деятельности

- конец периода раскрытия и начало периода изгнания
- последовый период
- прелиминарный период
- начало первого периода родов

**1472.** Выберите правильный ответ  
Продолжительность быстрых родов у первородящих

- 4-6 часов
- 1-2 часа
- 2-3 часа
- 0,5-1 час

**1473.** Выберите правильный ответ  
Продолжительность стремительных родов у первородящих

- 2-3 часа
- 4-5 часов
- 5-6 часов
- 6-7 часов

**1474.** Выберите правильный ответ  
Длительное стояние головки в одной плоскости в периоде изгнания опасно

- угрозой образования мочеполовых свищей
- не опасно
- ранним излитием околоплодных вод
- обвитием пуповины вокруг шеи плода

### **ПМ.03. Осуществление организационной, профилактической работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение**

#### **МДК.03.01. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам**

**1475.** Выберите правильный ответ  
Метод психопрофилактической подготовки к родам

- рекомендуется всем беременным для уменьшения болевых ощущений в родах
- проводится только для женщин из группы высокого риска
- позволяет полностью избежать болевых ощущений в родах
- показал свою полную неэффективность

**1476.** Выберите правильный ответ  
Метод психопрофилактической подготовки был предложен

- Вельвовским и Платоновым
- Альфельдом
- Строгановым
- Симпсоном

**1477.** Выберите правильный ответ  
Физиопсихопрофилактическая подготовка к родам включает

- индивидуальные беседы и групповые занятия специальной гимнастикой
- исследование глазного дна
- антропометрию
- консультацию психиатра

**1478.** Выберите правильный ответ

Психопрофилактическая подготовка к родам направлена на

- снятие страха у беременной перед родами и родовыми болями
- определение патологии плода
- выявление скрытых инфекционных заболеваний у беременной
- организацию ухода за больными на основе этапов сестринского процесса

**1479.** Выберите правильный ответ

- Психопрофилактическая подготовка к родам
- уменьшает родовые боли, способствует благоприятному течению беременности и родов
  - ухудшает состояние внутриутробного плода
  - повышает артериальное давление
  - не влияет на течение беременности и родов

**1480.** Выберите правильный ответ  
Цель физиопсихопрофилактики при беременности

- получение родового сертификата
- восприятия родов как физиологического процесса и обучение навыкам поведения в родах
- оформление обменной карты
- выявление соматической патологии

**1481.** Выберите правильный ответ

При проведении бесед с беременными во втором триместре акушерке запрещено проводить беседы на тему

- пороки развития у плода
- половая гигиена во время беременности
- уход за новорожденным и естественное вскармливание
- питание беременной

**1482.** Выберите правильный ответ

При первом контакте с беременной в «Школе материнства» необходимо выяснить

- отношение ее к беременности, представление беременной о родах
- уровень образования
- перенесённые операции и травмы
- размер одежды

**1483.** Выберите правильный ответ

Занятия с беременной в «Школе материнства» целесообразно начинать с

- 33-34 недель беременности
- 28-30 недель беременности
- 37-38 недель беременности
- 24 недель беременности

**1484.** Выберите правильный ответ

Интерьер кабинета для групповых занятий в «Школе материнства» должен

- создавать у пациентки психологический комфорт
- не иметь мягкой мебели
- быть в яркой цветовой гамме
- иметь 2-3 окна

**1485.** Выберите правильный ответ

Применение элементов пальцевого самомассажа в родах способствует

- уменьшению родовой боли, нормализации схваток, иммобилизации родовых усилий
- ослаблению родовой деятельности
- учащению сердцебиения плода
- не влияет на течение родового процесса

**1486.** Выберите правильный ответ

Роженица должна применять приемы релаксации и способы снятия боли

- поглаживание нижних отделов живота
- поглаживание обеих рук
- поглаживание стоп
- поглаживание затылка

**1487.** Выберите правильный ответ

На первом занятии по психопрофилактической подготовке к родам необходимо

- рассмотреть анатомо-физиологические изменения в организме женщины во время беременности

- освоить приёмы самообезболивания
- научить беременных правильно дышать во время схваток и снимать мышечное напряжение между схватками
- объяснить физиологию первого периода родов

**1488.** Выберите правильный ответ

На втором занятии по психопрофилактической подготовке к родам акушерка

- объясняет физиологию первого периода родов, механизм схваток
- проводят тренировки с задержкой дыхания
- рассказывает беременным, как нужно тужиться
- информирует о послеродовом и раннем послеродовом периоде

**1489.** Выберите правильный ответ

На третьем занятии по психопрофилактической подготовке к родам

- предлагают приемы для уменьшения болезненности схваток, учат правильно дышать во время схваток
- повторяют пройденный на первых занятиях материал
- знакомят с приёмами самообезболивания
- знакомят с распределением сил в родах

**1490.** Выберите правильный ответ

Основная задача психопрофилактической подготовки беременной к родам

- устранение психогенного компонента родовой боли
- профилактика аномалии родовой деятельности
- профилактика невынашивания беременности
- проведение бесед по контрацепции

**1491.** Выберите правильный ответ

Иммуноглобулин человека антирезус RHO(D) при резус-положительной принадлежности крови отца необходимо ввести в сроке беременности

- 28-30 недель
- 34 недель
- 36 недель
- 25 недель

**1492.** Выберите правильный ответ

Занятия физкультурой во время беременности

- проводятся у здоровых женщин по специальным методикам
- противопоказаны всем беременным
- не могут использоваться для коррекции аномалий положения
- могут проводиться без ограничения для всех желающих

## МДК.03.02. Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи

**1493.** Выберите правильный ответ

ВМС вводится на срок

- 5 лет
- 3 месяца
- 1,5 года
- 6 месяцев

**1494.** Выберите правильный ответ

Норплант гарантирует контрацепцию на срок

- 5 лет
- 5 месяцев
- 1,5 года
- полгода

**1495.** Выберите правильный ответ

Депо Провера гарантирует контрацептивный эффект на срок

- 3 месяца
- 3 года
- 1,5 года
- 1 месяц

**1496.** Выберите правильный ответ

В состав комбинированных противозачаточных средств входят

- эстрогены
- андрогены
- АКТГ
- окситоцин

**1497.** Выберите правильный ответ

Оральный контрацептив, содержащий только гестагены

- Эксклютон
- Мини-Пили
- Ригевидон
- Нон-Овлон

**1498.** Выберите правильный ответ

Трехступенчатый гормональный контрацептив

- Три-Мерси
- Марвелон
- Ригевидон
- Чарозетта

**1499.** Выберите правильный ответ

В случае появления кровотечения на фоне приема 10-й таблетки ОК, нужно

- продолжить прием таблеток по схеме
- отменить ОК
- увеличить дозу
- уменьшить дозу

**1500.** Выберите правильный ответ

Механизм КОК основан на

- блокаде овуляции
- вычислении «опасного периода»
- спермицидном эффекте
- целибате

**1501.** Выберите правильный ответ

Механизм химической барьерной контрацепции основан на

- спермицидном эффекте
- вычислении «опасного периода»
- блокаде овуляции

целибате

**1502.** Выберите правильный ответ

Физиологический метод (ритм-метод) основан на

- вычислении «опасного периода»
- спермицидном эффекте
- блокаде овуляции
- супрессии эндометрия, затрудняющей имплантацию

**1503.** Выберите правильный ответ

Механизм действия чистых гестагенов основан на

- супрессии эндометрия, затрудняющей имплантацию
- блокаде овуляции
- спермицидном эффекте
- вычислении «опасного периода»

**1504.** Выберите правильный ответ

Диана-35 - препарат первого выбора для женщин при

- повышенном количестве андрогенов
- пониженном количестве андрогенов
- повышенном количестве эстрогенов
- нормальном количестве эстрогенов

**1505.** Выберите правильный ответ

Укажите гестаген, который входит в состав «Мирены»

- левоноргестрел
- гестоден
- прогестерон
- дезогестрел

**1506.** Выберите правильный ответ

С целью профилактики экспульсий ВМС и болевого синдрома рекомендуется использовать

- но-шпу
- антибиотики
- индометацин
- димедрол

**1507.** Выберите правильный ответ

После введения ВМС первый врачебный осмотр должен проводиться через

- 7-10 дней
- день
- год
- полгода

**1508.** Выберите правильный ответ

Двойной голландский метод

- применение ОК совместно с презервативом
- применение ВМС с презервативом
- применение ВМС совместно с КОК
- применение презерватива со спермицидами

**1509.** Выберите правильный ответ

К факторам, ослабляющим действие КОК, относится

- прием антибиотиков и снотворных
- прием поливитаминов
- прием алкоголя
- прием жирной пищи

**1510.** Выберите правильный ответ

Депо-Провера вводится с целью контрацепции в режиме

- 150 мг 1 раз в 3 месяца
- 150 мг 1 раз в 3 недели
- 150 мг 1 раз в 2 месяца
- 150 мг 1 раз в 4 недели

**1511.** Выберите правильный ответ

После искусственного аборта с целью реабилитации назначают КОК

- сразу после выскабливания
- через 2 месяца
- через 3 месяца
- через 1 месяц.

**1512.** Выберите правильный ответ

После родов ВМС вводится через

- 8 недель
- 5 месяцев
- 8 месяцев
- 1 год

**1513.** Выберите правильный ответ

При экстренной контрацепции используют КОК, содержащие 50 мг этинилэстрадиола и 0,25 мг левоноргестрела в режиме

- 2 таблетки, через 12 часов еще 2 таблетки
- 3 таблетки, через 12 часов еще 3 таблетки
- 2 таблетки, через 72 часа еще 2 таблетки
- 1 таблетка, через 72 часа еще 1 таблетка

**1514.** Выберите правильный ответ

Противопоказание к приему гормональных контрацептивов

- тромбофлебит
- миопия средней степени
- обильные месячные
- 2 аборта в анамнезе

**1515.** Выберите правильный ответ

Комбинированные оральные контрацептивы

- уменьшают количество менструальной крови
- увеличивают количество менструальной крови
- не влияют на характер менструальной кровопотери
- не имеют противопоказаний

**1516.** Выберите правильный ответ

К трехфазным гормональным контрацептивным средствам относится

- Триквилар
- Фемоден
- Депо-Провера
- Марвелон

**1517.** Выберите правильный ответ

В период лактации можно назначать

- Экслютон
- Силест
- Фемоден
- Тризистон

**1518.** Выберите правильный ответ

Внутриматочные контрацептивы

- повышают риск воспалительных заболеваний
- снижают риск воспалительных заболеваний
- не влияют на возникновение воспалений

не имеют противопоказаний.

**1519.** Выберите правильный ответ

Препарат для лечения атрофических изменений слизистой влагалища в климаксе

- Овестин
- Фарматекс
- Лютенурин
- Контрацептин

**1520.** Выберите правильный ответ

Вазэктомия является методом

- стерилизации мужчины
- кастрации
- стерилизации женщины
- дающим эффект сразу же после операции

**1521.** Выберите правильный ответ

Наиболее эффективный метод контрацепции

- окклюзия труб
- предохранение только в критические дни
- барьерный
- прерванный половой акт

**1522.** Выберите правильный ответ

Нерожавшим здоровым женщинам с целью контрацепции противопоказано

- стерилизация
- презервативы
- диафрагмы
- спермициды

**1523.** Выберите правильный ответ

Наиболее опасный метод для планирования семьи

- аборт
- барьерная контрацепция
- гормональная контрацепция
- ВМС

**1524.** Выберите правильный ответ

Преградиварная подготовка - это

- комплекс профилактических мероприятий, направленных на минимизацию рисков при реализации репродуктивной функции конкретной супружеской пары
- профилактическое консультирование пациентки
- оценка факторов риска пациентки
- профилактика преждевременных родов

**1525.** Выберите правильный ответ

Лактационную аменорею следует считать надежным методом контрацепции

- только в первые 6 месяцев при условии грудного вскармливания без допаивания и докорма
- через 6 месяцев после родоразрешения
- при частичном грудном вскармливании
- при грудном вскармливании

**1526.** Выберите правильный ответ

Период покоя после выкидыша

- 3-6 месяцев
- 1 год
- 8 месяцев
- 2 года

**1527.** Выберите правильный ответ

Преградиварное консультирование следует осуществлять как минимум за

- 3 месяца до планируемого зачатия
- 6 месяцев до планируемого зачатия
- 8 месяцев до планируемого зачатия
- 1 год до планируемого зачатия

**1528.** Выберите правильный ответ

Прегавидарную подготовку необходимо проводить

- всем женщинам репродуктивного возраста
- женщинам группы риска по невынашиванию беременности
- женщинам старше 35 лет
- женщинам, перенесшим кесарево сечение

**1529.** Выберите правильный ответ

Интергенетический интервал должен составлять

- от 2 до 5 лет
- 6 месяцев
- 1 год
- 10 лет

**1530.** Выберите правильный ответ

Наилучший период для наступления последующей беременности после самопроизвольного аборта

- 3-6 месяцев
- 1 год
- 2 года
- 9 месяцев

**1531.** Выберите правильный ответ

Акушерский и перинатальный риски минимальны у пациенток в возрастной группе

- 19-35 лет
- 20-35 лет
- 19-40 лет
- 19-40 лет

**1532.** Выберите правильный ответ

Оптимальный метод контрацепции для кормящей женщины с рубцом на матке

- презерватив
- комбинированные гормональные контрацептивы
- кормление грудью каждые 3 часа 6 раз в сутки с ночным перерывом 6 часов
- внутриматочная спираль

### МДК.03.03. Общественное здоровье и здравоохранение

**1533.** Выберите правильный ответ

Здоровье по определению ВОЗ - это

- состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
- нормальное функционирование систем организма
- отсутствие болезней или физических дефектов
- состояние организма человека, когда его функции уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения

**1534.** Выберите правильный ответ

Уровень общественного здоровья зависит от групп факторов

- биологических, природно-климатических, социально-экономических
- психологических, географических, исторических
- питание населения, уровень культуры, образ жизни населения
- доступность медицинской помощи, вредные привычки, генетический риск

**1535.** Выберите правильный ответ

Демография - это наука о

- народонаселении
- здоровье населения
- показателях здравоохранения
- социальной медицине

**1536.** Выберите правильный ответ

Демографическим показателем является

- рождаемость
- заболеваемость с утратой трудоспособности
- летальность
- качество медицинской помощи

**1537.** Выберите правильный ответ

Численный состав населения на определенный (критический) момент времени - это

- статика
- динамика
- кинетика
- статистика

**1538.** Выберите правильный ответ

Движение и изменение количества населения - это

- динамика
- статика
- статистика
- диагностика

**1539.** Выберите правильный ответ

Наиболее достоверный источник о численном составе населения

- перепись
- рождаемость
- миграция
- смертность

**1540.** Выберите правильный ответ

Показатель, определяющий естественное движение населения

- рождаемость
- заболеваемость
- миграция
- инвалидность

**1541.** Выберите правильный ответ

Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает

- образ жизни населения
- окружающая среда
- генетический риск
- уровень и качество медицинской помощи

**1542.** Выберите правильный ответ

Универсальный интегрированный показатель здоровья населения

- средняя продолжительность жизни
- рождаемость
- смертность
- естественный прирост/убыль

**1543.** Выберите правильный ответ

Демографическая ситуация в РФ характеризуется

- естественным приростом населения
- естественной убылью населения
- нулевым естественным приростом населения
- волнообразностью демографического процесса

**1544.** Выберите правильный ответ

Демографическая политика в РФ предполагает

- оптимизацию естественного прироста населения
- снижение рождаемости
- снижение смертности
- повышение рождаемости

**1545.** Выберите правильный ответ

Во всем мире на первом месте смертность от заболеваний

- сердечно-сосудистых
- онкологических
- инфекционных
- травм и отравления

**1546.** Выберите правильный ответ

Младенческая смертность - это смертность

- на первом году жизни
- на первом месяце жизни
- до 4 лет
- до 14 лет

**1547.** Выберите правильный ответ

Ведущая причина младенческой смертности

- перинатальная
- патология беременности
- экологическая обстановка
- низкий уровень акушерской помощи

**1548.** Выберите правильный ответ

Материнская смертность - это смертность от

- причин, связанных с беременностью
- несчастного случая
- материального положения женщины
- суицида

**1549.** Выберите правильный ответ

Здравоохранение

- социальная функция общества и медицины по охране и укреплению здоровья
- система социального страхования граждан
- специализированная медицинская помощь населению
- стационарная медицинская помощь населению

**1550.** Выберите правильный ответ

Одна из наиболее острых проблем здоровья населения

- высокий уровень общей смертности
- низкая санитарная культура
- миграция населения и связанная с этим инфекционная заболеваемость

низкий охват детей профилактическими прививками

**1551.** Выберите правильный ответ

Процессы формирования здоровья населения отражают

- общие тенденции социально-экономического развития страны
- климатогеографическое положение
- стихийные бедствия и войны
- состояние здравоохранения

**1552.** Выберите правильный ответ

Коэффициенты рождаемости и смертности рассчитываются на

- 1000 человек
- 100 человек
- 10000 человек
- 100000 человек

**1553.** Выберите правильный ответ

Общий уровень рождаемости в стране

- низкий
- средний
- выше среднего
- высокий

**1554.** Выберите правильный ответ

МКБ - это

- международная классификация болезней, травм и причин смерти
- перечень заболеваний
- упорядоченный список болезней
- научно-обоснованная группировка болезней

**1555.** Выберите правильный ответ

Родовой сертификат заполняется и выдается женщине с одноплодной беременностью при сроке

- 30 недель
- 28 недель
- 32 недели
- свыше 30 недель

**1556.** Выберите правильный ответ

Родовой сертификат состоит из

- шести частей
- четырех частей
- пяти частей
- трех частей

**1557.** Выберите правильный ответ

Родовой сертификат заполняется медицинским работником женской консультации при предъявлении женщиной

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, страхового полиса ОМС, СНИЛС
- страхового полиса обязательного медицинского страхования
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования

**1558.** Выберите правильный ответ

Родовой сертификат работающим женщинам при многоплодной беременности выдается при сроке беременности

- 28 недель
- 30 недель
- 32 недели
- свыше 30 недель

**1559.** Выберите правильный ответ

Родовой сертификат выдается при условии непрерывного наблюдения и ведения женщины на амбулаторно-поликлиническом этапе не менее

- 12 недель
- 10 недель
- 20 недель
- 22 недели

**1560.** Выберите правильный ответ

При преждевременных родах родовой сертификат может быть выдан

женской консультацией в более ранние сроки при получении из родильного дома информации о состоявшихся родах

- не выдается
- родильным домом
- детской поликлиникой

**1561.** Выберите правильный ответ

При наблюдении на амбулаторно-поликлиническом этапе в нескольких женских консультациях оплате региональным отделением фонда подлежит

- талон №1, выданный женской консультацией, наблюдавшей беременную наиболее длительное время
- талон №1, выданный женской консультацией, взявшей беременную на учет
- талон №1, выданный женской консультацией, выдавшей дородовой отпуск
- талон №1, выданный женской консультацией по выбору беременной

**1562.** Выберите правильный ответ

Анализ общей заболеваемости проводят на основании

- статистического талона или талона амбулаторного пациента
- больничного листа
- экстренного извещения об инфекционном заболевании
- выписки из истории болезни

**1563.** Выберите правильный ответ

К амбулаторно-поликлиническим учреждениям здравоохранения относятся

- женские консультации
- дома ребенка
- родильные дома
- станции скорой помощи

**1564.** Выберите правильный ответ

В женской консультации оказывают женщинам помощь

- первичную лечебно-профилактическую
- социальную

- стационарную
- санитарно-противоэпидемическую

**1565.** Выберите правильный ответ

С целью раннего выявления злокачественных новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях организуются

- смотровой кабинет
- онкологический кабинет (отделение)
- кабинет профилактики злокачественных новообразований
- хоспис

**1566.** Выберите правильный ответ

Профилактические медицинские осмотры способствуют выявлению заболеваний

- на ранних стадиях
- хронических
- инфекционных
- острых

**1567.** Выберите правильный ответ

Профилактические медицинские осмотры являются основой

- диспансеризации
- первичной медико-санитарной помощи
- реабилитации
- экспертизы трудоспособности

**1568.** Выберите правильный ответ

В целях повышения эффективности качества акушерской и неонатологической помощи необходимо

- развитие перинатальных центров, сети дневных стационаров, стационар замещающих технологий
- строительство новых детских больниц
- увеличение количества врачей-неонатологов
- увеличение количества среднего медицинского персонала

**1569.** Выберите правильный ответ

Интегральный показатель, отражающий здоровье матерей, качество медицинской помощи женщинам и детям

- младенческая смертность
- материнская смертность
- акушерская помощь в родах
- число нормальных родов

**1570.** Выберите правильный ответ

Действия акушерки на первом этапе консультирования и обучения пациентки

- оценка исходного уровня знаний и умений пациентки
- определение методов обучения
- оценка результатов процесса обучения
- составление плана обучения

**1571.** Выберите правильный ответ

Заполнение журнала учета госпитализируемых пациенток проводится

- в приемном отделении
- в ЦСО
- в лечебно-диагностическом отделении
- в ординаторской

**1572.** Выберите правильный ответ

Учреждение здравоохранения, относящееся к системе охраны материнства и детства

- родильный дом
- диспансер
- станция скорой помощи
- амбулатория

**1573.** Выберите правильный ответ

Философия акушерского дела - это система взглядов на взаимоотношения между

- акушеркой, семьей, обществом и окружающей средой

- обществом и окружающей средой
- акушеркой и пациентом
- акушеркой и обществом

**1574.** Выберите правильный ответ

В рамках концепции охраны материнства и семьи основная роль акушерки в неонатологии - это

- обучение семьи уходу за новорожденными
- уход за новорожденным
- лечение
- реабилитация

## ПМ.04. Оказание медицинской помощи в экстренной форме

### МДК.04.01. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии

**1575.** Выберите правильный ответ

Эктопической беременностью считается беременность, развивающаяся

- вне полости матки
- в полости матки
- у женщин старше 40 лет
- у пациенток с миомой матки

**1576.** Выберите правильный ответ

Возможная локализация эктопической беременности

- брюшная полость
- влагалище
- уретра
- бартолиновые железы

**1577.** Выберите правильный ответ

Наиболее частая локализация внематочной беременности

- маточная труба
- шейка матки
- яичник
- брюшина

**1578.** Выберите правильный ответ

Вероятный исход при развитии беременности в ампулярной части трубы

- трубный аборт
- разрыв маточной трубы
- рождение недоношенного ребёнка
- разрыв яичника

**1579.** Выберите правильный ответ

Типичный исход при развитии беременности в истмическом отделе трубы

- разрыв трубы
- трубный аборт
- развитие беременности до 18 недель
- рождение недоношенного ребёнка

**1580.** Выберите правильный ответ

Экстренная госпитализация в гинекологический стационар показана в случаях

- перекрута ножки опухоли яичника
- предменструального синдрома
- хронического воспаления придатков матки
- кандидозного кольпита

**1581.** Выберите правильный ответ

Абсолютным показанием к операции в гинекологии является

- внутрибрюшное кровотечение
- фолликулярная киста яичника
- хронический сальпингооофорит
- дисфункциональное маточное кровотечение

**1582.** Выберите правильный ответ

Перечислите противопоказания к медицинскому аборту

- 3 и 4 степень чистоты влагалищного отделяемого
- медицинский аборт в анамнезе
- срок беременности более 8 недель
- врожденный вывих бедра

**1583.** Выберите правильный ответ

Определите объем неотложной доврачебной помощи при недавно произошедшей травме влагалища и промежности

- холод на промежность, тугая тампонада влагалища
- введение антибиотиков
- ушивание разрывов влагалища, восстановление целостности промежности
- переливание крови

**1584.** Выберите правильный ответ

При перекруте ножки опухоли яичника наблюдаются

- сильные боли внизу живота
- кровотечение из половых путей
- гнойные выделения из влагалища
- положительная реакция на ХГЧ

**1585.** Выберите правильный ответ

При прервавшейся трубной беременности показано

- экстренная операция
- выскабливание полости матки
- консервативное лечение
- гистероскопия

**1586.** Выберите правильный ответ

Осложнения трубной беременности

- внутрибрюшное кровотечение
- нарушение мочеиспускания
- геморрагический шок
- апоплексия яичника

**1587.** Выберите правильный ответ

Нарушение внематочной беременности по типу разрыва трубы сопровождаются

- внезапный приступ боли в одной из подвздошных областей
- повышение температуры тела
- тошнота (рвота)
- гнойные выделения из половых путей

**1588.** Выберите правильный ответ

Перечисленные симптомы сопровождают нарушенную трубную беременность

- односторонняя боль в нижней части живота с иррадиацией в прямую кишку
- гнойные выделения из половых путей
- ректальное кровотечение
- гипотензия

**1589.** Выберите правильный ответ

Заболевания, с которыми следует дифференцировать прервавшуюся трубную беременность

- апоплексия яичника
- АМК
- хронический сальпингооофорит
- маточаточную беременность

**1590.** Выберите правильный ответ

Причины внутрибрюшного кровотечения

- апоплексия яичника
- тубоовариальная опухоль
- перекрут ножки опухоли яичника
- перитонит

**1591.** Выберите правильный ответ

Причины острого живота в гинекологии

- внутрибрюшные кровотечения
- хронический аднексит
- АМК
- синдром поликистозных яичников

**1592.** Выберите правильный ответ

Апоплексия яичника чаще наступает

- в период овуляции
- при маточной беременности
- в период менструации
- при трубной беременности

**1593.** Выберите правильный ответ

Для апоплексии яичника характерно

- боли внизу живота с иррадиацией в прямую кишку
- повышение АД
- положительные реакции на беременность
- выраженный лейкоцитоз

**1594.** Выберите правильный ответ

Основные клинические симптомы геморрагического шока

- низкое артериальное давление
- повышенное АД
- повышение температуры тела
- гнойные выделения из половых путей

**1595.** Выберите правильный ответ

С целью остановки при АМК репродуктивного периода назначают

- выскабливание полости матки
- гемотрансфузию
- гормональный гемостаз
- противовоспалительную терапию

**1596.** Выберите правильный ответ

Для уточнения прерывания внематочной беременности по типу разрыва трубы необходимо

- провести пункцию заднего свода влагалища
- провести зондирование полости матки
- провести выскабливание полости матки
- лапароскопию

**1597.** Выберите правильный ответ

Внутреннее кровотечение возникает в случае

- разрыва яичника
- неполного выкидыша
- предлежания плаценты
- эрозии шейки матки

**1598.** Выберите правильный ответ

При внутреннем кровотечении женщину необходимо уложить

- с опущенным головным концом
- с поднятым головным концом
- оставить в положении стоя
- оставить в положении сидя

**1599.** Выберите правильный ответ

Тактика при клинике «острого живота» на догоспитальном этапе

- холод на живот, срочная госпитализация
- обезболивание
- очистительная клизма
- проведение гемотрансфузии

**1600.** Выберите правильный ответ

При аномальном маточном кровотечении пременопаузального периода гемостаз производится

- диагностическим выскабливанием полости матки
- назначением эстроген-гестагенных препаратов
- гемотрансфузией
- утеротониками

**1601.** Выберите правильный ответ

Головная боль и ухудшение зрения характерны для

- тяжелой преэклампсии
- отеков, связанных с беременностью
- рвоты беременных
- легкой преэклампсии

**1602.** Выберите правильный ответ

Наблюдение за беременной, у которой имеется триада признаков Цангенмейстера и боли в эпигастральной области, должно проводиться

- в палате интенсивной терапии родильного отделения
- амбулаторно
- в дневном стационаре
- в обычной палате родового отделения.

**1603.** Выберите правильный ответ

Следующая стадия гипертензионных расстройств после отеков, связанных с беременностью

- преэклампсия

- эклампсия
- прегестоз
- отеки

**1604.** Выберите правильный ответ

О тяжелой стадии гипертензионных расстройств свидетельствует

- анасарка и анурия
- патологическая прибавка веса
- появление отеков стоп
- появление отеков голеней

**1605.** Выберите правильный ответ

Во время типичного приступа эклампсии вслед за фибриллярными подергиваниями следуют

- тонические судороги
- клонические судороги
- кома
- улучшение состояния

**1606.** Выберите правильный ответ

Развитие приступа эклампсии исключено

- на ранних сроках беременности
- в родах
- в послеродовом периоде
- на поздних сроках беременности

**1607.** Выберите правильный ответ

Во вторую фазу эклампсии

- дыхание форсировано
- дыхание нормальное
- апноэ
- тахипноэ

**1608.** Выберите правильный ответ

Наименее вероятное осложнение в случае преэклампсии

- перенашивание
- гипоксия плода
- ухудшение плацентарно-маточного кровообращения
- кровотечение в раннем послеродовом периоде

**1609.** Выберите правильный ответ

При тяжелой преэклампсии при беременности 37 недель показано

- подготовка к досрочному родоразрешению
- лечение в дневном стационаре
- госпитализация при тенденции к перенашиванию
- ожидание срочных родов

**1610.** Выберите правильный ответ

После приступа эклампсии у беременной следует

- обеспечить проходимость дыхательных путей и лечебно-охранительный режим
- начать родовозбуждение
- провести кесарево сечение
- начать магнезиальную терапию

**1611.** Выберите правильный ответ

Форма осложнений беременности, при которой нарушены функции печени и свертывания крови

- HELLP-синдром
- остеомаляция
- тетания
- гепатит

**1612.** Выберите правильный ответ

Редкая форма осложнения беременности

- бронхиальная астма
- остеомиелит
- остеопороз
- остеопения

**1613.** Выберите правильный ответ

При увеличении шейки и эксцентрическом расположении наружного зева следует заподозрить

- шеечную беременность
- предлежание плаценты
- истмико-цервикальную недостаточность
- трубную беременность

**1614.** Выберите правильный ответ

Наружное кровотечение при отсутствии болей характерно для

- предлежания плаценты
- отслойки плаценты
- начавшегося выкидыша
- угрожающего выкидыша

**1615.** Выберите правильный ответ

Наиболее вероятно предлежание плаценты

- после нескольких аборт
- при первой беременности
- при второй беременности после нормальных первых родов
- вследствие сохраняющей терапии.

**1616.** Выберите правильный ответ

При кровотечении в связи с предлежанием плаценты влагалищное исследование нужно проводить

- при развернутой операционной
- в женской консультации
- в приемном покое
- в предродовой палате

**1617.** Выберите правильный ответ

Симптомы трубного аборта

- приступообразные боли внизу живота
- повышение температуры тела
- метеоризм
- обильное, длительное кровотечение из половых путей

**1618.** Выберите правильный ответ

Прерывание внематочной беременности чаще происходит на сроке

- 5-6 недель
- 2-3 недели
- 10-11 недель
- 8-9 недель

**1619.** Выберите правильный ответ

Способ выделения из матки неотделившегося последа

- ручное отделение плаценты и выделение последа
- потягивание за пуповину
- метод Креде-Лазаревича
- метод Абуладзе

**1620.** Выберите правильный ответ

Исключением из факторов риска разрыва матки является

- истмико-цервикальная недостаточность
- рубец на матке
- узкий таз
- перерастяжение матки, крупный плод

**1621.** Выберите правильный ответ

Предлежание плаценты можно предполагать в случае

- безболезненных кровянистых выделений из половых путей
- дородового излития околоплодных вод
- повышенного тонуса матки
- острой боли внизу живота

**1622.** Выберите правильный ответ

Диагноз клинически узкого таза

- можно установить только в родах
- можно поставить в конце беременности
- идентичен диагнозу анатомического сужения таза
- не препятствует нормальному родоразрешению

**1623.** Выберите правильный ответ

При четвертой степени сужения таза роды заканчивают путем

- операции кесарева сечения
- наложения акушерских щипцов
- родостимуляции
- вакуум-экстракции плода

**1624.** Выберите правильный ответ

Матка Кювелера возникает

- вследствие преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты
- после каждых родов
- при слабости родовой деятельности
- при дискоординации родовой деятельности

**1625.** Выберите правильный ответ

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты менее всего вероятна при

- слабой родовой деятельности
- гипертонзивных расстройствах при беременности
- многоводии
- бурной родовой деятельности

**1626.** Выберите правильный ответ

При возникновении «матки Кювелера» показано

- экстирпация матки
- кесарево сечение
- выскабливание полости матки
- консервативное наблюдение

**1627.** Выберите правильный ответ

Грудное вскармливание абсолютно противопоказано при наличии у матери

- открытой формы туберкулеза
- дизентерии
- сальмонеллеза
- острой респираторной инфекции

**1628.** Выберите правильный ответ

Генерализованная форма послеродовой гнойно-септической инфекции

- сепсис
- перитонит
- флебит тазовых вен
- лактационный мастит

**1629.** Выберите правильный ответ

Положительный признак Вастена свидетельствует о

- клиническом несоответствии размеров таза и головки
- совершившемся разрыве матки
- наличии беременности
- предлежании плаценты

**1630.** Выберите правильный ответ

Матка приобретает форму «песочных часов»

- при угрозе разрыва матки
- при совершившемся разрыве матки
- во время нормальной схватки
- в промежутках между схватками

**1631.** Выберите правильный ответ

При совершившемся разрыве матки

- схватки прекращаются
- схватки усиливаются
- схватки становятся дискоординированными
- плод не страдает

**1632.** Выберите правильный ответ

Операция вскрытия плодного пузыря

- амниотомия
- амниоцентез
- амниоскопия
- амнионит

**1633.** Выберите правильный ответ

Зашивание промежности

- перинеорафия
- перинеотомия
- эпизиотомия
- пубиотомия

**1634.** Выберите правильный ответ

Досрочное вскрытие плодного пузыря показано в родах при

- преэклампсии
- тазовом предлежании
- ножном предлежании
- полном предлежании плаценты

**1635.** Выберите правильный ответ

Медиолатеральная эпизиотомия производится

- на высоте потуги, когда из половой щели показывается участок головки диаметром 3–4 см
- при головке, находящейся в полости малого таза
- между потугами
- при головке, находящейся на тазовом дне

**1636.** Выберите правильный ответ

При антенатальной гибели плода и гидроцефалии при головном предлежании производят

- краниотомию
- декапитацию
- спондилотомию
- кляйдотомию

**1637.** Выберите правильный ответ

При наложении акушерских щипцов сначала следует

- введение левой ложки
- пробная тракция
- введение правой ложки
- замыкание замка

**1638.** Выберите правильный ответ

Плодоразрушающие операции производят

- под масочным или внутривенным наркозом
- под пудендальной анестезией
- без обезболивания
- под парацервикальной анестезией

**1639.** Выберите правильный ответ

Наиболее предпочтительный при операции кесарева сечения разрез матки

- поперечный в области нижнего сегмента
- т-образный
- продольный в области нижнего сегмента
- корпоральный

**1640.** Выберите правильный ответ

Противопоказание к операции «кесарево сечение»

- длительный безводный период
- отслойка плаценты
- предлежание плаценты
- приращение плаценты

**1641.** Выберите правильный ответ

Абсолютное показание к операции «кесарево сечение»

- полное предлежание плаценты
- тазовое предлежание
- миопия средней степени
- ложное прикрепление плаценты

**1642.** Выберите правильный ответ

При наличии полного предлежания плаценты и субфебрильной температуры нужно

- произвести экстраперитонеальное кесарево сечение
- вести роды через естественные родовые пути
- выполнить интраперитонеальное кесарево сечение
- наложить акушерские щипцы

**1643.** Выберите правильный ответ

Перед плановой операцией кесарева сечения премедикация

- проводится вечером и утром
- не проводится
- включает только наркотические анальгетики
- проводится только вечером

**1644.** Выберите правильный ответ

При неосложненной операции «кесарево сечение» кровопотеря чаще всего составляет

- 500 мл
- 350 мл
- 200 мл
- 800 мл

**1645.** Выберите правильный ответ

Швы после операции «кесарево сечение» снимают

- на 7 сутки
- на 5 сутки

на 3 сутки

на 9 сутки

**1646.** Выберите правильный ответ

Антибактериальная терапия после кесарева сечения

- является разумной профилактической мерой
- показана только при высокой температуре
- показана только при абсолютных показаниях
- показана только при длительном безводном периоде

**1647.** Выберите правильный ответ

Обезболивающие средства при неосложненном кесаревом сечении назначаются

- 3 дня
- 1 день
- 7 дней
- до выписки

**1648.** Выберите правильный ответ

Для профилактики пареза кишечника на 2-3 сутки после кесарева сечения нужно применить

- прозерин
- прогестерон
- партусистен
- папазол

**1649.** Выберите правильный ответ

При истинном приращении плаценты показано

- удаление матки
- выскабливание полости матки
- прижигание области плацентарной площадки
- ограничиться ручным обследованием полости матки.

**1650.** Выберите правильный ответ

При подготовке к плановой операции «кесарево сечение» акушерка должна вечером перед сном

- выполнить назначения анестезиолога и способствовать обеспечению сна и эмоционального покоя женщины перед операцией
- подробно рассказать обо всех этапах операции
- дать женщине слабительное
- накормить женщину ужином

**1651.** Выберите правильный ответ

Ручное обследование полости матки проводится под обезболиванием

- внутривенный наркоз
- пудендальная анестезия
- местная инфильтрационная анестезия
- парацервикальная анестезия

**1652.** Выберите правильный ответ

Ручное обследование полости матки проводится после родов

- у женщины с рубцом на матке
- в тазовом предлежании
- с применением родостимуляции
- после проведения пособия по Цовьянову 1

**1653.** Выберите правильный ответ

После операции ручного обследования полости матки рекомендуется назначать

- антибиотики и сокращающие средства
- ненаркотические анальгетики

- наркотические анальгетики
- гипотензивные и мочегонные средства

**1654.** Выберите правильный ответ

Для выполнения плодоразрушающей операции исключается использование инструмента

- конхотом
- перфоратор Бло
- перфоратор Феноменова
- краниокласт

**1655.** Выберите правильный ответ

Противопоказание к наложению акушерских щипцов

- узкий таз
- миопия высокой степени
- преэклампсия
- начавшаяся асфиксия плода

**1656.** Выберите правильный ответ

Противопоказанием к рассечению промежности является

- варикозное расширение вен промежности
- миопия средней степени
- угрожающий разрыв промежности
- угрожающая гипоксия плода

**1657.** Выберите правильный ответ

Экстирпация матки не показана при возникновении

- субинволюции матки
- матки Кювелера
- сепсиса на фоне криминального вмешательства с разрывом матки

генерализованной инфекции на фоне послеродового метрометрита

**1658.** Выберите правильный ответ

К генерализованной септической инфекции относится

- септицемия
- параметрит
- послеродовая язва
- пельвеоперитонит

**1659.** Выберите правильный ответ

При разлитом перитоните положительным симптомом

- Щеткина-Блюмберга
- Кюстнера-Чукалова
- Гентера-Гегара
- Креде-Лазаревича

**1660.** Выберите правильный ответ

При лечении послеродовых септических осложнений до результатов посева отдают предпочтение

- цефалоспорином третьего поколения
- тетрациклин
- стрептоциду
- эритромицину

**1661.** Выберите правильный ответ

Для профилактики осложнений антибактериальной терапии применяют

- линекс
- лидазу
- левомицетин
- лидокаин

**1662.** Выберите правильный ответ

Удаление матки проводят

- при перитоните
- после каждой операции «кесарево сечение»
- только после плановой операции «кесарево сечение»
- после каждых родов

**1663.** Выберите правильный ответ

К родоразрешающим операциям относится

- кесарево сечение
- перинеотомия
- эпизиотомия
- амниотомия

**1664.** Выберите правильный ответ

Медиолатеральная эпизиотомия производится

- из центра в сторону седалищного бугра под углом 45 градусов
- из центра под углом 90 градусов
- из центра в сторону ануса
- отступя 2 см от центра в сторону под углом 45 градусов

**1665.** Выберите правильный ответ

Оптимальным способом является амниотомия при помощи

- амниотома
- пальца
- неразъемных пулевых щипцов
- пинцета

**1666.** Выберите правильный ответ

Ранняя амниотомия производится при

- плоском плодном пузыре
- высоком подвижном стоянии головки
- ножном предлежании
- угрозе преждевременных родов

**1667.** Выберите правильный ответ

Акушерке запрещено выполнять операцию

- по прерыванию беременности
- рассечению промежности в родах
- восстановления промежности после родов
- ручного обследования полости матки при кровотечении

**1668.** Выберите правильный ответ

Наиболее распространенные родоразрешающие операции

- кесарево сечение
- ручное отделение плаценты и выделение последа
- наложение акушерских щипцов
- плодоразрушающие

**1669.** Выберите правильный ответ

Чаще всего в акушерских стационарах производят операции

- подготавливающие родовые пути
- кесарева сечения
- ручное обследование полости матки
- по исправлению положения плода

**1670.** Выберите правильный ответ

На 1-ые сутки после родов легче себя чувствует родильница после операции

- амниотомии
- ручного обследования полости матки
- перинеорафии
- кесарева сечения

**1671.** Выберите правильный ответ

Родоразрешение через естественные родовые пути невозможно при

- миоме шейки матки
- срочных родах
- 1-ой степени сужения таза
- преждевременных родах

**1672.** Выберите правильный ответ

Коллизия плодов может быть вызвана

- неправильным течением и ведением родов при многоплодии
- назначением медикаментов во время беременности
- назначением родостимуляции
- инфекцией

**1673.** Выберите правильный ответ

Гибель плода в родах называется

- интранатальной
- перинатальной
- постнатальной
- антенатальной

**1674.** Выберите правильный ответ

По величине АД, частоте пульса родильницы можно в большей степени оценить

- степень геморрагического шока
- степень сужения таза
- вид аномалии родовой деятельности
- степень гипоксии плода

**1675.** Выберите правильный ответ

После гемотрансфузии родильнице измеряют температуру

- через час не менее 3-4 раз и затем через 3 часа
- 2 раза в день
- 4 раза в день
- через 3 часа

**1676.** Выберите правильный ответ

После гемотрансфузии родильнице обязательным анализом является

- общий анализ мочи
- анализ крови на сахар
- анализ мочи на ацетон
- анализ крови на посев

**1677.** Выберите правильный ответ

После гемотрансфузии у родильницы акушерка должна

- проводить контроль почасового или суточного диуреза
- перепроверить группу крови
- взять кровь на посев
- проконтролировать ЭКГ

**1678.** Выберите правильный ответ

При позднем послеродовом кровотечении и большой кровопотере акушерка при отсутствии врача запрещено

- проводить выскабливание полости матки

- переливать кровозаменители
- вводить сокращающие средства
- вводить гемостатические средства

**1679.** Выберите правильный ответ

Акушерские родоразрешающие операции

- акушерские щипцы
- перинеотомия
- вскрытие плодного пузыря
- эпизиорафия

**1680.** Выберите правильный ответ

Метод инструментального исследования, применяемый в родах

- осмотр шейки матки с помощью зеркал
- зондирование полости матки
- гистероскопия
- биопсия

**1681.** Выберите правильный ответ

Противопоказания для операции кесарева сечения

- инфекционные, воспалительные заболевания любой этиологии
- тазовое предлежание плода
- многоплодие
- поперечное положение плода

**1682.** Выберите правильный ответ

Проведение вагинального исследования при предлежании плаценты осуществляется

- при развернутой операционной на операционном столе
- в предоперационной
- в родильном зале
- в смотровой комнате

**1683.** Выберите правильный ответ

Метод родоразрешения при полном предлежании плаценты

- кесарево сечение
- вакуум-экстракция плода
- акушерские щипцы
- перинеотомия

**1684.** Выберите правильный ответ

Полный разрыв матки

- разрыв, проникающий через все слои стенки матки
- разрыв стенки матки, не проникающий в брюшную полость
- разрыв шейки матки I степени
- разрыв шейки матки II степени

**1685.** Выберите правильный ответ

Неполный разрыв матки

- разрыв стенки матки, не проникающий в брюшную полость
- разрыв, проникающий через все слои стенки матки
- разрыв шейки матки I степени
- разрыв шейки матки II степени

**1686.** Выберите правильный ответ

Наиболее частая локализация разрыва матки

- нижний сегмент
- дно матки
- область трубного угла матки

задняя стенка матки

**1687.** Выберите правильный ответ

Характер схваток при типичном угрожающем разрыве матки

- судорожные болезненные схватки
- слабые схватки по 25 секунд
- схватки умеренной силы
- боли в пояснице

**1688.** Выберите правильный ответ

Высокое стояние и косое направление контракционного кольца свидетельствует об

- угрожающем разрыве матки
- угрозе разрыва промежности
- угрозе преждевременных родов
- угрозе разрыва шейки матки

**1689.** Выберите правильный ответ

Отек шейки матки и вульвы при головке, прижатой ко входу в малый таз, и длительном периоде изгнания свидетельствует

- о клиническом несоответствии между тазом матери и головкой плода
- о нормальном течении второго периода родов
- о первом моменте биомеханизма родов переднего вида затылочного предлежания
- о слабости родовой деятельности

**1690.** Выберите правильный ответ

Появление кровянистых выделений из влагалища при поперечном положении плода в периоде изгнания свидетельствует

- о начавшемся разрыве матки
- о разрыве влагалища
- о разрыве промежности
- о разрыве задней спайки

**1691.** Выберите правильный ответ

Родовая деятельность при совершившемся разрыве матки

- прекращается
- становится чрезмерно сильной
- слабые редкие схватки
- схватки умеренной силы через 3-4 минуты

**1692.** Выберите правильный ответ

Форма матки при полном разрыве

- матка уменьшается в размерах и приобретает неправильную форму
- овоидной формы
- седловидной формы
- матка увеличивается в размерах

**1693.** Выберите правильный ответ

Ruptura uteri - это

- разрыв матки
- выпадение матки
- выворот матки
- выпадение пуповины

**1694.** Выберите правильный ответ

Роды через естественные родовые пути возможны при локализации миоматозного узла в области

- дна матки
- нижнего сегмента матки
- шейки матки

области перешейка

**1695.** Выберите правильный ответ

Противопоказание для проведения окситоцинового теста

- центральное предлежание плаценты
- гипертензивные расстройства при беременности
- задержка развития плода
- резус-конфликт

**1696.** Выберите правильный ответ

Метод родоразрешения, показанный первородящей 35 лет с ОАА и упорной первичной слабостью родовой деятельности

- операция кесарево сечение
- родоразрешение через естественные родовые пути
- вакуум-экстракция плода
- акушерские щипцы

**1697.** Выберите правильный ответ

Положение головки при наложении выходных акушерских щипцов

- в плоскости выхода малого таза
- прижата к входу в малый таз
- в плоскости широкой части малого таза
- над входом в малый таз

**1698.** Выберите правильный ответ

Условие, являющееся противопоказанием для наложения акушерских щипцов

- мертвый плод
- соответствие размеров таза матери и головки плода
- вторичная слабость при живом плоде
- головка плода находится на тазовом дне

**1699.** Выберите правильный ответ

Операция отделение головки плода от туловища в области шейных позвонков

- декапитация
- эвисцерация
- клейдотомия
- спондилотомия

**1700.** Выберите правильный ответ

Операция уменьшения объема плечевого пояса плода

- клейдотомия
- декапитация
- эвисцерация
- спондилотомия

**1701.** Выберите правильный ответ

Операция опорожнения от внутренностей грудной и брюшной полости плода

- эвисцерация
- клейдотомия
- декапитация
- спондилотомия

**1702.** Выберите правильный ответ

Операция рассечения позвоночника плода

- спондилотомия
- эвисцерация
- клейдотомия
- декапитация

**1703.** Выберите правильный ответ

Показание для декапитации

- запущенное поперечное положение мертвого плода
- головное предлежание плода
- косое положение плода
- тазовое предлежание плода

**1704.** Выберите правильный ответ

Задний асинклитизм

- во входе в малый таз стреловидный шов отклонен к лону
- стреловидный шов в прямом размере плоскости выхода малого таза
- стреловидный шов в косом размере плоскости входа в малый таз
- во входе в малый таз стреловидный шов отклонен к мысу

**1705.** Выберите правильный ответ

При развитии неотложной ситуации акушерка

- через посредника вызывает помощь на себя
- анализирует сложившуюся ситуацию и принимает решения по самостоятельному ведению пациентки
- проводит занятия по лечебной гимнастике
- выполняет профилактические мероприятия

**1706.** Выберите правильный ответ

При развитии неотложной ситуации акушерка

- в обязательном порядке констатирует факт времени развития неотложной ситуации
- повышает профессиональный уровень знаний, умений и навыков
- анализирует сложившуюся ситуацию и принимает решения по самостоятельному ведению пациентки
- оценивает собственные действия

**1707.** Выберите правильный ответ

При развитии неотложной ситуации акушерка

- оказывает доврачебную медицинскую помощь
- выполняет санитарно-просветительные мероприятия
- овладевает коммуникативными навыками общения
- анализирует сложившуюся ситуацию и принимает решения по самостоятельному ведению пациентки

**1708.** Выберите правильный ответ

Показания досрочного родоразрешения

- тяжелая преэклампсия, эклампсия
- беременность 38-39 недель
- анемия беременных I степени
- тазовое предлежание плода

**1709.** Выберите правильный ответ

Метод родоразрешения при неполном предлежании плаценты, кровотечении из родовых путей до 200 мл и открытии маточного зева на 5-6 см

- путём операции кесарево сечение
- через естественные родовые пути с ранней амниотомией и родостимуляцией

через естественные родовые пути с гемотрансфузией

через естественные родовые пути с ранней амниотомией

**1710.** Выберите правильный ответ

Метод родоразрешения при ножном предлежании доношенного плода средних размеров и выявлении хронической гипоксии

- кесарево сечение
- амниотомия и стимуляция родовой деятельности простагландинами
- роды через естественные родовые пути с последующей экстракцией плода за тазовый конец
- роды через естественные родовые пути с применением перидуральной анестезии

**1711.** Выберите правильный ответ

Осложнение гипертензивных расстройств при беременности

- преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
- сепсис
- отек легких
- перитонит

**1712.** Выберите правильный ответ

Кровотечение в послеродовом периоде при разрыве мягких тканей родовых путей имеет признаки

- характер кровотечения непрерывный, матка плотная, хорошо сократившаяся
- кровотечение усиливается при введении маточных сокращающих средств
- кровь выделяется порциями после наружного массажа матки
- признаки отделения плаценты отсутствуют

**1713.** Выберите правильный ответ

Из показаний к ручному обследованию послеродовой матки следует исключить

- разрыв шейки матки I-II степени
- кровопотеря, превышающая физиологическую
- наличие рубца на матке
- задержка частей последа

**1714.** Выберите правильный ответ

Из причин задержки частей последа в полости матки следует исключить

- применение в родах спазмолитических средств
- нарушение сократительной способности миометрия
- плотное прикрепление плаценты
- чрезмерно активное ведение третьего периода родов

**1715.** Выберите правильный ответ

Из причин гипотонического кровотечения в раннем послеродовом периоде следует исключить

- раннее излитие околоплодных вод
- аномалии родовой деятельности
- многоплодие
- крупный плод

**1716.** Выберите правильный ответ

При отсутствии признаков отделения плаценты и отсутствии кровотечения к ручному отделению плаценты и выделению последа приступают через

- 30 минут
- 15 минут
- 1 час
- 1,5 часа

**1717.** Выберите правильный ответ

К операции ручного отделения плаценты и выделения последа следует приступить при

- отсутствии признаков отделения плаценты и появлении кровотечения
- наличии признаков отделения плаценты и появлении кровотечения
- наличии признаков отделения плаценты через 1 час
- отсутствии признаков отделения плаценты в течение 15 минут

**1718.** Выберите правильный ответ

Причиной кровотечения в раннем послеродовом периоде может быть

- гипотоническое и атоническое состояние миометрия
- преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
- предлежание плаценты
- раннее излитие околоплодных вод

**1719.** Выберите правильный ответ

Беременность 37 недель. Эклампсия. Показано

- срочное родоразрешение путём операции кесарево сечение
- акушерские щипцы
- краниотомия
- вакуум-экстракция плода

**1720.** Выберите правильный ответ

Клинически узкий таз обычно диагностируется

при полном или почти полном раскрытии маточного зева

- в начале первого периода родов
- во время беременности
- при отрицательном признаке Вастена

**1721.** Выберите правильный ответ

Основной принцип лечения атонического кровотечения

- чревосечение, экстирпация матки
- ручное обследование полости матки
- наружный массаж матки
- инфузионно-трансфузионная терапия

**1722.** Выберите правильный ответ

Предлежание плаценты можно предполагать в случае

- при безболезненных кровянистых выделениях из половых путей
- дородового излития околоплодных вод
- если при пальпации предлежащая часть плода – головка
- при острой боли внизу живота

**1723.** Выберите правильный ответ

Клиника атонии матки

- матка полностью теряет тонус, кровотечение массивное, не прекращается
- матка периодически теряет тонус
- кровотечение повторяющееся, со сгустками
- при проведении массажа матки и введения сокращающих средств матка сокращается

**1724.** Выберите правильный ответ

Последствия разрыва промежности III степени

- несостоятельность мышц тазового дна
- нарушения менструального цикла
- невынашивание беременности
- бесплодие

## МДК.04.02. Хирургические болезни

**1725.** Выберите правильный ответ

Метод лечения неосложненной паховой грыжи

- плановая операция
- экстренная операция
- массаж живота
- ношение бандажа

**1726.** Выберите правильный ответ

Дренаж в гнойную рану вводят для

- обеспечения оттока отделяемого
- остановки кровотечения
- ускорения эпителизации
- произведения тампонады

**1727.** Выберите правильный ответ

При остром перитоните выполняется операция

- экстренная
- плановая
- срочная
- диагностическая

**1728.** Выберите правильный ответ

При синдроме острого живота необходимо

применить холод, экстренно госпитализировать больного

- ввести обезболивающее
- промыть желудок
- сделать очистительную клизму

**1729.** Выберите правильный ответ

Противопоказание к операции при остром аппендиците

- отсутствует
- беременность
- гипертоническая болезнь
- острая пневмония

**1730.** Выберите правильный ответ

Необходимое обследование при подозрении на острый живот

- пальпация живота
- определение тургора кожи
- аускультация сердца
- перкуссия грудной клетки

**1731.** Выберите правильный ответ

Тактика при подозрении на кишечную непроходимость

- срочная госпитализация
- грелка на живот
- дать обезболивающее
- поставить клизму

**1732.** Выберите правильный ответ

Тактика акушерки при подозрении на ущемленную грыжу

- срочная госпитализация
- грелка на живот
- вправление грыжи
- дать обезболивающее

**1733.** Выберите правильный ответ

При почечной колике в моче наблюдается

- макрогематурия
- лейкоцитурия
- глюкозурия
- бактериурия

**1734.** Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при почечной колике

- дротаверин, баралгин
- дибазол, папаверин
- кордиамин, кофеин
- инсулин, глюкоза

**1735.** Выберите правильный ответ

Особенность транспортировки пациента с травмой поясничного отдела позвоночника для профилактики осложнений

- обеспечить положение пациента на щите, на спине
- придать пациенту положение полусидя
- транспортировать стоя
- оказать помощь на месте происшествия

**1736.** Выберите правильный ответ

Способ транспортировки хирургического пациента определяет

- врач скорой помощи
- участковый врач
- медицинская сестра
- врач приемного отделения

**1737.** Выберите правильный ответ

Основные способы транспортировки больных в хирургическое отделение

- на каталке лежа
- сидя
- пешком
- в кресле-каталке

**1738.** Выберите правильный ответ

Транспортировка больных, находящихся в тяжелом состоянии осуществляется

- на каталке
- на лифте
- пешком
- сидя

**1739.** Выберите правильный ответ

При переломах позвоночника транспортировка больных в отделение осуществляется

- на носилках с жестким ложем

- на каталке
- на носилках
- пешком

**1740.** Выберите правильный ответ

При кровоизлиянии в головной мозг транспортировка больных в отделение осуществляется

- на носилках голова набок
- на каталке
- на носилках
- пешком

**1741.** Выберите правильный ответ

Транспортировка пациента на носилках вниз по лестнице

- вверх ногами
- вниз ногами
- вниз головой
- идти в ногу

**1742.** Выберите правильный ответ

Перед началом транспортировки пострадавшему необходимо в первую очередь

- ввести обезболивающее средство
- оказать первую помощь
- провести внешний осмотр
- измерить АД

**1743.** Выберите правильный ответ

Транспортировка пострадавших с повреждением грудной клетки осуществляется

- в положении полусидя
- лёжа на боку
- лёжа на спине
- лежа на животе

**1744.** Выберите правильный ответ

Транспортировка пострадавших в бессознательном состоянии осуществляется

- лежа на спине с приподнятыми нижними конечностями и опущенной головой
- лежа на животе или на боку
- в положении полусидя, с ногами, согнутыми в коленных суставах
- лежа на спине с полусогнутыми в тазобедренных и коленных суставах и разведенными в стороны ногами (поза «лягушки»)

**1745.** Выберите правильный ответ

Пострадавших перемещать «волоком» допускается

- с травмами позвоночника
- с травмами опорно-двигательного аппарата
- с травмами костей таза
- с травмой головы

**1746.** Выберите правильный ответ

При подъеме в гору во время переноски пострадавших на носилках нужно придерживаться правила

- идущий впереди максимально опускает носилки, а идущий сзади - максимально их поднимает
- подъем осуществляется так же, как и движение по ровной поверхности

идущий впереди держит носилки как обычно, а идущий сзади - слегка их приподнимает

пострадавший не шевелится

**1747.** Выберите правильный ответ

Транспортировка пострадавших в положении

"лягушка" допускается при травмах

перелом костей таза

живота

при подозрении на перелом позвоночника и повреждение костного мозга

при подозрении на перелом верхней трети бедренной кости

**1748.** Выберите правильный ответ

Транспортировка пострадавших в положении только сидя или полусидя допускается при травмах

проникающие ранения грудной клетки

ранения шеи

при затрудненном дыхании после утопления

при проникающих ранениях брюшной полости

**1749.** Выберите правильный ответ

Транспортировку пострадавшего с черепно-мозговой травмой необходимо осуществлять в положении

лежа на боку

лежа на спине

сидя

полусидя

**1750.** Выберите правильный ответ

Транспортировку пострадавшего с травматическим шоком осуществляют

на носилках с приподнятым ножным концом

только на щите

в полусидячем положении

на носилках

**1751.** Выберите правильный ответ

Пострадавший с повреждением грудной клетки, находящийся в сознании, транспортируется в положении

полусидя

на спине

на боку

на животе

**1752.** Выберите правильный ответ

Транспортировка только на животе

в случаях ожогов спины и ягодиц

при частой рвоте

в состоянии комы

при подозрении на повреждение спинного мозга, когда в наличии есть только брезентовые носилки

**1753.** Выберите правильный ответ

Транспортировка только на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами

при большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение

при проникающих ранениях брюшной полости

при переломах нижних конечностей

при травме головы

**1754.** Выберите правильный ответ

Лечение острого аппендицита во время беременности

оперативное на любом сроке беременности

консервативно-выжидательная тактика

операция после 12 недель беременности

прервать беременность и затем провести аппендектомию

### МДК.04.03. Реаниматология

**1755.** Выберите правильный ответ

Основные мероприятия при выведении из клинической смерти

одновременное проведение ИВЛ и закрытого массажа сердца

проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

проведение закрытого массажа сердца

дать понюхать нашатырный спирт

**1756.** Выберите правильный ответ

При проведении непрямого массажа сердца компрессию на грудину взрослого человека производят

проксимальной частью ладони

всей ладонью

тремя пальцами

одним пальцем

**1757.** Выберите правильный ответ

Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации взрослому человеку одним лицом

на 2 вдоха - 30 компрессий

на 2 вдоха - 4 компрессии

на 3 вдоха - 6 компрессий

на 1 вдох - 5 компрессий

**1758.** Выберите правильный ответ

При остановке сердца применяется сочетание препаратов

адреналин, атропин, гидрокарбонат натрия, кальция хлорид

эуфиллин, калия хлорид, гидрокарбонат натрия

атропин, мезатон, гидрокарбонат натрия

кальция хлорид, лидокаин, мезатон

**1759.** Выберите правильный ответ

При проведении закрытого массажа сердца поверхность, на которой лежит пациент, обязательно должна быть

жесткой

мягкой

наклонной

неровной

**1760.** Выберите правильный ответ

«Тройной» прием для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей включает

- положение на спине, голова отогнута кзади, нижняя челюсть выдвинута вперед
- положение на спине, голова повернута на бок, нижняя челюсть выдвинута вперед
- положение на спине, голова согнута кпереди, нижняя челюсть прижата к верхней
- положение на спине, под лопатки подложен валик, нижняя челюсть прижата к верхней

**1761.** Выберите правильный ответ

Признак эффективности реанимационных мероприятий

- появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков
- зрачки широкие
- отсутствие пульсовой волны на сонной артерии
- отсутствие экскурсий грудной клетки

**1762.** Выберите правильный ответ

Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации взрослому человеку двумя лицами

- на 2 вдоха - 30 компрессий
- на 1 вдох - 10 компрессий
- на 1 вдох - 5 компрессий
- на 1 вдох - 2 компрессии

**1763.** Выберите правильный ответ

ИВЛ новорожденному в условиях родильного зала проводится

- методом «изо рта в рот и нос»
- с помощью мешка Амбу
- методом «изо рта в рот»
- эндотрахеальным способом

**1764.** Выберите правильный ответ

Продолжительность проведения аппаратной ИВЛ при реанимации, если не появляется спонтанное дыхание

- 20 минут
- 15 минут
- 10 минут
- решается коллегиально, через несколько дней

**1765.** Выберите правильный ответ

Для предупреждения западения корня языка при проведении реанимации голова пострадавшего должна быть

- запрокинута назад
- повернута на бок
- согнута вперед
- в исходном положении

**1766.** Выберите правильный ответ

Продолжительность клинической смерти в условиях нормотермии

- 5-7 минут
- 1-2 минуты
- 25-30 минут
- 8-10 минут

**1767.** Выберите правильный ответ

Число дыханий в 1 минуту при проведении ИВЛ взрослому человеку

- 12-16 в 1 минуту
- 30-32 в 1 минуту

- 8-10 в 1 минуту
- 20-24 в 1 минуту

**1789.** Выберите правильный ответ

Длительность 1 этапа реанимации при асфиксии составляет

- 30 сек
- 20 сек
- 40 сек
- 60 сек

**1790.** Выберите правильный ответ

Общая продолжительность реанимации при асфиксии составляет

- 7 мин
- 5 мин
- 40 мин
- 20 мин

**1791.** Выберите правильный ответ

При проведении реанимации при асфиксии подсчет ЧСС проводят за

- 6 секунд
- одну минуту
- 10 секунд
- 30 секунд

**1768.** Выберите правильный ответ

Признаки клинической смерти

- дыхание не нарушено
- потеря сознания и отсутствие дыхания
- спутанность сознания и возбуждение
- нитевидный пульс на сонных артериях

**1769.** Выберите правильный ответ

Основное осложнение, возникающее при проведении закрытого массажа сердца

- перелом ребер
- перелом ключицы
- повреждение трахеи
- перелом позвоночника

**1770.** Выберите правильный ответ

При проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить

- на границе средней и нижней трети грудины
- на границе верхней и средней трети грудины
- на верхней трети грудины
- в пятом межреберном промежутке слева

**1771.** Выберите правильный ответ

Закрытый массаж сердца новорожденному проводят

- двумя пальцами рук
- четырьмя пальцами правой руки
- проксимальной частью кисти правой руки
- кистями обеих рук

**1772.** Выберите правильный ответ

Глубина продавливания грудины при проведении закрытого массажа сердца взрослому человеку

- 5-6 см
- 1-2 см
- 7-8 см
- 9-10 см

- 1773.** Выберите правильный ответ  
Глубина продавливания грудной клетки при проведении закрытого массажа сердца новорожденному
- 1/3 передне-заднего диаметра грудной клетки
  - 4-6 см
  - 5-6 см
  - 7-8 см
- 1774.** Выберите правильный ответ  
Показания к прекращению реанимации
- появление признаков биологической смерти
  - отсутствие самостоятельного дыхания
  - отсутствие признаков эффективного кровообращения
  - широкие зрачки
- 1775.** Выберите правильный ответ  
Правильная укладка больного при сердечно-легочной реанимации
- положить на твердую ровную поверхность
  - приподнять головной конец
  - приподнять ножной конец
  - опустить головной конец
- 1776.** Выберите правильный ответ  
Для клинической смерти не характерно
- патологическое дыхание
  - отсутствие пульса на сонной артерии
  - отсутствие сознания
  - отсутствие самостоятельного дыхания
- 1777.** Выберите правильный ответ  
Препарат, применяемый при остановке сердца
- адреналин
  - дроперидол
  - кордиамин
  - фуросемид
- 1778.** Выберите правильный ответ  
Если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимационные мероприятия можно прекратить через
- 30-40 мин
  - 3-6 мин
  - 2 часа
  - 15-20 мин
- 1779.** Выберите правильный ответ  
Достоверный признак биологической смерти
- расширение зрачка
  - прекращение сердечной деятельности
  - прекращение дыхания
  - симптом «кошачьего глаза»
- 1780.** Выберите правильный ответ  
Признак эффективности реанимационных мероприятий
- появление пульса на сонной артерии
  - зрачок широкий
  - отсутствие пульса на сонной артерии
  - отсутствие экскурсий грудной клетки
- 1781.** Выберите правильный ответ  
При проведении ИВЛ при асфиксии концентрация кислорода (%)
- 30-40

- 15-20
  - 50-60
  - 80-100
- 1782.** Выберите правильный ответ  
Цель первого этапа реанимации при асфиксии новорожденного восстановление
- проходимости дыхательных путей
  - гемодинамики
  - метаболических нарушений
  - мышечного тонуса
- 1783.** Выберите правильный ответ  
Цель второго этапа реанимации при асфиксии восстановление
- внешнего дыхания
  - гемодинамики
  - метаболических нарушений
  - мышечного тонуса
- 1784.** Выберите правильный ответ  
Оценка состояния новорожденного при проведении реанимации при асфиксии
- каждые 30 сек
  - каждые 15 сек
  - каждые 60 сек
  - каждые 10 сек
- 1785.** Выберите правильный ответ  
При проведении сердечно-легочной реанимации у новорожденного в родильном зале соотношение дыханий и ЧСС
- 1:3
  - 1:2
  - 1:4
  - 2:5
- 1786.** Выберите правильный ответ  
При проведении сердечно-легочной реанимации число сердечных компрессий
- 90 в 1 минуту
  - 110 в 1 минуту
  - 60 в 1 минуту
  - 100-120 в 1 минуту
- 1787.** Выберите правильный ответ  
При проведении реанимации при асфиксии вентиляцию начинают
- 100% кислородом
  - воздухом
  - 60% кислородом
  - 80% кислородом
- 1788.** Выберите правильный ответ  
Непрямой массаж сердца при асфиксии новорожденного показан при ЧСС (уд в 1 минуту)
- менее 60
  - 100
  - 80
  - 90
- 1789.** Выберите правильный ответ  
Длительность 1 этапа реанимации при асфиксии составляет
- 30 сек
  - 20 сек
  - 40 сек

60 сек

**1790.** Выберите правильный ответ

Общая продолжительность реанимации при асфиксии составляет

10 мин

5 мин

40 мин

20 мин

**1791.** Выберите правильный ответ

При проведении реанимации при асфиксии подсчет ЧСС проводят за

6 секунд

одну минуту

10 секунд

30 секунд