

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для самостоятельной работы

выпускников базового уровня специальности «Лечебное дело»

для подготовки к 1-му этапу государственной итоговой аттестации

**г. Новосибирск
2025**

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тематическая структура

	стр.
ПМ.01. Осуществление профессионального ухода за пациентами	
МДК.01.01. Обеспечение безопасной среды для пациента и персонала	3
МДК.01.02. Оказание медицинских услуг по уходу	8
ПМ.02. Осуществление лечебно-диагностической деятельности	
МДК.02.01. Технология оказания простых медицинских услуг	11
МДК.02.02. Пропедевтика клинических дисциплин	16
МДК.02.03. Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля	22
МДК.02.04. Клиническая фармакология	35
МДК.02.05. Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля	39
МДК.02.06. Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля	47
МДК.02.07. Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля	53
ПМ.03. Осуществление медицинской реабилитации и абилитации	
МДК.03.01. Проведение мероприятий по медицинской реабилитации и абилитации	63
ПМ.04. Осуществление профилактической деятельности	
МДК.04.01. Основы профилактики	72
МДК.04.02. Профилактическая деятельность фельдшера в терапии	76
МДК.04.03. Профилактическая деятельность фельдшера в педиатрии	85
МДК.04.04. Профилактическая деятельность фельдшера при инфекционных заболеваниях	88
МДК.04.05. Профилактическая деятельность фельдшера в акушерстве	91
ПМ.05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации	
МДК.05.01. Реаниматология	92
МДК.05.02. Осуществление скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	95
ПМ.06. Осуществление организационно-аналитической деятельности	
МДК.06.01. Организация здравоохранения	111
МДК.06.02. Правовые основы профессиональной деятельности	116

Содержание тестовых материалов

ПМ.01. Осуществление профессионального ухода за пациентами

МДК.01.01 Обеспечение безопасной среды для пациента и персонала

1. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы классифицируются по уровню своей опасности на

- 5 классов: А, Б, В, Г, Д
- 4 класса: А, Б, В, Г
- 3 класс: А, Б, В
- 2 класса: А, Б

2. Выберите правильный ответ

Класс медицинских отходов, к которому относится разбитый ртутный термометр

- класс Г
- класс Б
- класс В
- класс А

3. Выберите правильный ответ

Класс медицинских отходов, к которому относятся салфетки, загрязненные кровью

- класс Б
- класс А
- класс В
- класс Г

4. Выберите правильный ответ

Класс медицинских отходов, к которому относится бумажная упаковка лекарственного препарата

- класс А
- класс Б
- класс В
- класс Г

5. Выберите правильный ответ

Класс медицинских отходов, к которому относятся просроченные лекарственные средства

- класс Г
- класс Б
- класс В
- класс А

6. Выберите правильный ответ

Класс медицинских отходов, помещаемых в контейнеры желтого цвета

- класс Б
- класс А
- класс В
- класс Г

7. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы класса А

- неопасные отходы, которые не имели контакта с биологическими жидкостями больных, с инфекционными больными
- материалы и инструменты, которые были в процессе использования загрязнены выделениями пациентов, в том числе кровью

все материалы и инструменты, которые имели контакт с пациентами, болеющими особо опасными инфекциями

отходы, которые по своему химическому составу близки к промышленным отходам

8. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы класса Б

материалы и инструменты, которые были в процессе использования загрязнены выделениями пациентов, в том числе кровью

неопасные отходы, которые не имели контакта с биологическими жидкостями больных, с инфекционными больными

все материалы и инструменты, которые имели контакт с пациентами, болеющими особо опасными инфекциями

отходы, которые по своему химическому составу близки к промышленным отходам

9. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы класса В

все материалы и инструменты, которые имели контакт с пациентами, болеющими особо опасными инфекциями

неопасные отходы, которые не имели контакта с биологическими жидкостями больных, с инфекционными больными

материалы и инструменты, которые были в процессе использования загрязнены выделениями пациентов, в том числе кровью

отходы, которые по своему химическому составу близки к промышленным отходам

10. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы класса Г

отходы, которые по своему химическому составу близки к промышленным отходам

неопасные отходы, которые не имели контакта с биологическими жидкостями больных, с инфекционными больными

материалы и инструменты, которые были в процессе использования загрязнены выделениями пациентов, в том числе кровью

все материалы и инструменты, которые имели контакт с пациентами, болеющими особо опасными инфекциями

11. Выберите правильный ответ

Медицинские отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациента, относятся к медицинским отходам

- класса А
- класса Б
- класса В
- класса Г

12. Выберите правильный ответ

Материалы и инструменты, которые были в процессе использования загрязнены выделениями пациентов, в том числе кровью, относятся к медицинским отходам

- класса Б
- класса В
- класса Г
- класса А

13. Выберите правильный ответ

Одноразовые пакеты для сбора отходов медицинских отходов, относящихся классу Б, должны иметь окраску

- желтую
- красную
- белую
- черную

14. Выберите правильный ответ

Одноразовые пакеты для сбора отходов МО, относящихся к классу В, должны иметь окраску

- красную
- черную
- белую
- желтую

15. Выберите правильный ответ

При положительной пробе с суданом-3 появляется окрашивание

- жёлтое
- розовое
- бурое
- сине-фиолетовое

16. Выберите правильный ответ

Химический метод контроля качества стерилизации (с использованием химических индикаторов) применяется

- при каждом цикле стерилизации
- не реже 2 раз в год
- при запуске нового стерилизатора
- после ремонта

17. Выберите правильный ответ

При термическом методе стерилизации без упаковки инструменты хранятся на стерильном столе не более

- 6 часов
- 3 часов
- 12 часов
- 24 часов

18. Выберите правильный ответ

Обучение правилам инфекционной безопасности пациентов и их родственников в отделении - это задача

- постовой медсестры
- главной медсестры
- диетсестры
- главного врача

19. Выберите правильный ответ

Использование медицинских масок во всех отделениях стационара обязательно

- в период эпидемиологического неблагополучия
- на усмотрение администрации
- на усмотрение эпидемиолога
- постоянно

20. Выберите правильный ответ

Индикатором для контроля наличия масляных загрязнений на инструментах является проба

- с суданом-3
- азопирамовая
- амидопириновая
- фенолфталеиновая

21. Выберите правильный ответ

К инфекциям, связанным с оказанием медицинской помощи, относят

- любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, поражающее пациента при поступлении в больницу или медработников, медицинских учреждений
- любое инфекционное заболевание
- любое клинически распознаваемое заболевание, с которым пациент поступил в стационар
- инфекции, передающиеся половым путем

22. Выберите правильный ответ

Медицинский персонал меняет одноразовые медицинские маски

- каждые 2 часа
- после каждой манипуляции
- раз в 6 часов
- 1 раз в смену

23. Выберите правильный ответ

Медицинский персонал меняет одноразовые медицинские перчатки

- после каждой манипуляции
- при нарушении их целостности
- не меняются, двукратно протираются спиртом
- не меняются, однократно протираются спиртом

24. Выберите правильный ответ

Одноразовые медицинские изделия перед утилизацией подвергаются

- дезинфекции
- ополаскиванию проточной водой
- предстерилизационной очистке
- стерилизации

25. Выберите правильный ответ

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшей концентрации

- кровь
- спинномозговая жидкость
- слюна
- слезная жидкость

26. Выберите правильный ответ

Дезинфекция, проводимая в очаге в присутствии источника инфекции, называется

- текущей

- заключительной
- физической
- профилактической

27. Выберите правильный ответ

Стерилизацией называется

- комплекс мероприятий, направленных на уничтожение вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов на изделиях медицинского назначения
- система мероприятий, направленных на уничтожение патогенной микрофлоры в окружающей среде
- свод мероприятий, направленный на удаление белковых загрязнений
- блок мероприятий, направленный на удаление всех лекарственных загрязнений

28. Выберите правильный ответ

Стерилизация с применением автоклавов относится к методу

- паровому
- воздушному
- химическому
- газовому

29. Выберите правильный ответ

Термический метод дезинфекции

- кипячение
- ультрафиолетовое облучение
- двукратное протирание дезинфицирующим раствором
- погружение в моющий раствор

30. Выберите правильный ответ

Действующим нормативным документом для выполнения санитарно-противоэпидемического режима медицинской организации является

- СанПиН 3.36.86-21
- Трудовой Кодекс РФ
- Конституция РФ
- Этический Кодекс медицинской сестры России

31. Выберите правильный ответ

Целью дезинфекции рук персонала после инфекционного контакта является

- профилактика профессионального заражения
- обеспечение кратковременной стерильности
- создание продолжительной стерильности
- удаление бытового загрязнения

32. Выберите правильный ответ

Метод стерилизации эндоскопической аппаратуры

- химический
- физический
- паровой
- воздушный

33. Выберите правильный ответ

Контрольной пробой на наличие крови на инструментах является

- азопирамовая
- амидопириновая

- с суданом-3
- с суданом-4

34. Выберите правильный ответ

Клизменные наконечники после использования подлежат

- дезинфекции
- протиранию салфеткой
- обработке спиртом
- мытью под проточной водой

35. Выберите правильный ответ

Обработка кожи при попадании на нее биологической жидкости проводится

- 70% спиртом
- 3% раствором перекиси водорода
- 6% раствором перекиси водорода
- 96% спиртом

36. Выберите правильный ответ

Фактор передачи вирусного гепатита В

- препараты крови
- руки
- пылевые частицы
- предметы обихода

37. Выберите правильный ответ

Путь передачи ВИЧ-инфекции

- половой
- алиментарный
- воздушно-капельный
- трансмиссивный

38. Выберите правильный ответ

При попадании биологической жидкости в глаза необходимо промыть глаза

- проточной водой
- 0,05% раствором калия перманганата
- 0,02% раствором риванола
- 2% раствором соды

39. Выберите правильный ответ

Уничтожение в окружающей человека среде возбудителей инфекционных заболеваний называется

- дезинфекцией
- дезинсекцией
- дератизацией
- стерилизацией

40. Выберите правильный ответ

Облучение ультрафиолетовыми излучателями для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях относится к методу дезинфекции

- физическому
- механическому
- химическому
- комбинированному

41. Выберите правильный ответ

Пузырь для льда, грелка дезинфицируются методом

- двукратного протирания
- полного погружения

- однократного протирания
- орошения

42. Выберите правильный ответ

Кушетку, которую используют для осмотра пациента, необходимо дезинфицировать

- двукратным протиранием с интервалом 15 минут после каждого пациента
- протиранием после каждого пациента с интервалом 5 минут
- в конце смены
- протиранием после каждого пациента

43. Выберите правильный ответ

После выписки (смерти) пациента постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла) подвергают

- камерной дезинфекции
- стерилизации
- профилактической дезинфекции
- очаговой дезинфекции

44. Выберите правильный ответ

Чехлы матрасов из полимерной пленки и клеенки после выписки (смерти) пациента дезинфицируют способом

- протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства
- погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой
- двукратного протирания с интервалом 15 минут
- камерной дезинфекции

45. Выберите правильный ответ

Медицинские термометры дезинфицируют способом

- погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой
- протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства
- двукратного протирания с интервалом 15 минут
- камерной дезинфекции

46. Выберите правильный ответ

Срок сохранения стерильности изделий зависит от

- упаковки
- метода стерилизации
- вида изделия медицинского назначения
- характера манипуляции

47. Выберите правильный ответ

Использование одной пары перчаток для ухода за двумя и более пациентами

- не допускается
- допускается во всех случаях
- допускается по решению главной медицинской сестры
- отдается на усмотрение персонала

48. Выберите правильный ответ

При положительной азопирамовой пробе появляется окрашивание раствора

- фиолетовое, переходящее в розово-сиреневое

- зелёное, переходящее в фиолетовое
- фиолетовое, переходящее в зелёное
- синее, переходящее в фиолетовое

49. Выберите правильный ответ

Для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

- ставят азопирамовую пробу
- используют термовременные индикаторы
- используют биотесты
- делают смывы с различных поверхностей

50. Выберите правильный ответ

Количество инструментов для контроля качества предстерилизационной очистки при децентрализованной обработке

- 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц
- 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену
- 3 инструмента каждого наименования
- 5% от одновременно обработанной партии

51. Выберите правильный ответ

Фенолфталеиновая проба ставится с целью обнаружения остаточных количеств

- моющего средства
- крови
- жировых загрязнений
- лекарственных веществ

52. Выберите правильный ответ

Многоразовые медицинские изделия после инвазивных манипуляций подвергаются

- дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации
- только предстерилизационной очистке
- только дезинфекции
- только стерилизации

53. Выберите правильный ответ

Для стерилизации белья используют стерилизатор

- паровой
- воздушный
- плазменный
- газовый

54. Выберите правильный ответ

Для совмещения в один этап дезинфекции и предстерилизационной очистки можно использовать дезинфицирующие средства, обладающие действием

- дезинфицирующим и моющим
- моющим и дезодорирующим
- дезинфицирующим и стерилизующим
- дезинфицирующим и дезодорирующим

55. Выберите правильный ответ

Для мытья рук предпочтительно использовать

- жидкое мыло в дозаторе (диспенсере)
- индивидуальное мыло
- мыльницу с решеткой
- губки с моющим раствором

56. Выберите правильный ответ

Фактор искусственной передачи внутрибольничной инфекции

- медицинские инструменты и оборудование
- продукты питания
- вода
- насекомые

57. Выберите правильный ответ

Универсальные меры безопасности акцентируют внимание персонала на

- средствах индивидуальной защиты
- медикаментах и медицинском оборудовании
- пациентах
- средствах дезинфекции и стерилизации

58. Выберите правильный ответ

«Золотым» стандартом кожных антисептиков являются

- спиртовые
- водные
- гелеобразные
- анионные

59. Выберите правильный ответ

Гигиеническая обработка рук предусматривает использование

- антисептиков (жидкого мыла)
- туалетного мыла
- мыла, с повышенным содержанием глицерина
- специальных косметических средств

60. Выберите правильный ответ

Уровни мытья рук зависят от

- характера манипуляции
- степени загрязнения
- вида используемых антисептиков (дезинфектантов)
- наличия перчаток

61. Выберите правильный ответ

Самым распространенным резервуаром возбудителей на теле человека являются

- руки
- мочевыводящие пути
- кишечник
- кровь

62. Выберите правильный ответ

Основой профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, является

- соблюдение медицинским персоналом санитарно-гигиенических норм и правил
- использование дезинфицирующих средств
- сокращение числа инвазивных процедур
- использование технологий уничтожения возбудителей

63. Выберите правильный ответ

В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы, потенциально опасной в плане инфицирования, необходимо

- составить акт о несчастном случае на производстве установленной формы
- составить протокол о несчастном случае на производстве произвольной формы
- обратиться к врачу
- обратиться в Управление Роспотребнадзора

64. Выберите правильный ответ

Для дезинфекции помещений медицинской организации применяются бактерицидные облучатели

- открытого, закрытого, комбинированного типов
- только закрытого типа
- только открытого типа
- щелевидного типа

65. Выберите правильный ответ

Моющий раствор подлежит замене

- при изменении его окраски
- каждые три часа
- при снижении температуры раствора ниже 50 град С
- через сутки

66. Выберите правильный ответ

Дезинфекцией называют комплекс мероприятий, направленный на уничтожение

- микроорганизмов
- грызунов
- насекомых
- членистоногих

67. Выберите правильный ответ

Свойство дезинфицирующего средства обеспечивать уничтожение грибов

- фунгицидное
- бактерицидное
- вирулицидное
- бактериостатическое

68. Выберите правильный ответ

Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивать уничтожение вирусов

- вирулицидное
- бактерицидное
- фунгицидное
- бактериостатическое

69. Выберите правильный ответ

Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивать уничтожение бактерий

- бактерицидное
- фунгицидное
- бактериостатическое
- инсектицидное

70. Выберите правильный ответ

Свойство препаратов задерживать рост микроорганизмов

- микробостатическое
- бактерицидное
- вирулицидное
- спороцидное

71. Выберите правильный ответ

Уничтожение на изделиях или в изделиях микроорганизмов всех видов, в том числе споровых форм является целью

- стерилизации
- дезинфекции
- дезинсекции
- дератизации

72. Выберите правильный ответ

Механический метод дезинфекции

- протирание
- кипячение
- обжигание
- пастеризация

73. Выберите правильный ответ

Физический метод дезинфекции

- кипячение
- протирание
- проветривание
- вытряхивание

74. Выберите правильный ответ

Резистентные формы микроорганизмов могут возникать при неправильном применении

- антибиотиков, антисептиков и дезинфектантов
- только антибиотиков
- антибиотиков и антисептиков
- дезинфектантов и антисептиков

75. Выберите правильный ответ

Асептикой называется

- комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране
- уничтожение болезнетворных микробов
- уничтожение всего живого

76. Выберите правильный ответ

Антисептикой называется

- комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме
- комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- уничтожение болезнетворных микробов
- мероприятия по обеззараживанию помещений

77. Выберите правильный ответ

Первое место в структуре инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, занимают

- гнойно-септические инфекции
- инфекции кожных покровов
- кишечные инфекции
- инфекция мочевыводящих путей

78. Выберите правильный ответ

Показания к использованию медицинских перчаток

- асептические процедуры, контакт с кровью и другими биологическими жидкостями
- работа с воздушным стерилизатором
- работа с паровым стерилизатором

- беседа с пациентом

МДК 01.02. Оказание медицинских услуг по уходу

79. Выберите правильный ответ

Для профилактики пролежней при обработке кожи используется

- камфорный спирт
- муравьиный спирт
- раствор фурацилина
- метиловый спирт

80. Выберите правильный ответ

Дренажное положение придается пациенту с целью

- облегчения оттока мокроты
- уменьшения одышки
- снижения лихорадки
- облегчения боли

81. Выберите правильный ответ

У инкурабельных больных при запорах наиболее эффективно

- очистительная клизма
- диетотерапия
- беззондовый тюбаж
- фитотерапия

82. Выберите правильный ответ

Положение Фаулера предполагает размещение пациента в постели

- полулежа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов
- на боку, руки согнуты в локтевых суставах
- полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов
- промежуточное положение между положением лежа на боку и лежа на животе

83. Выберите правильный ответ

Санитарная обработка пациента в приёмном отделении включает

- осмотр на педикулез и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ, обтирание, переодевание в больничную одежду
- дезинсекцию, ванну или душ, антропометрию
- осмотр на педикулез и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ, транспортировка в лечебное отделение
- осмотр на педикулез и чесотку, дезинфекция вещей больного

84. Выберите правильный ответ

Последовательность слоев в согревающем компрессе

- влажная салфетка, компрессная бумага, вата, бинт
- влажная салфетка, вата, компрессная бумага, бинт
- компрессная бумага, влажная салфетка, вата, бинт

вата, влажная салфетка, компрессная бумага, бинт

85. Выберите правильный ответ

Пульс чаще всего исследуют на

- лучевой и сонной артерии
- локтевой артерии и аорте
- брюшной аорте и мозговой артерии
- подколенной артерии

86. Выберите правильный ответ

При критическом падении температуры артериальное давление

- снижается
- повышается незначительно
- резко повышается
- не изменяется

87. Выберите правильный ответ

Температуру тела у пациентов измеряют

- утром натощак (с 7 до 9 час) и вечером (с 17 до 19 час)
- раз в день с 12 до 13 часов
- сразу после завтрака
- перед сном

88. Выберите правильный ответ

Температура тела 37-37,9 градусов С называется

- субфебрильной
- фебрильной
- пиретической
- гиперпиретической

89. Выберите правильный ответ

Положение Симса предполагает размещение пациента в постели

- промежуточное положение, между положением лежа на боку и лежа на животе
- полулежа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов
- полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов
- на боку, руки согнуты в локтевых суставах

90. Выберите правильный ответ

Лечебный эффект гирудотерапии выражен в

- снижении свертываемости крови
- уменьшении боли
- повышении артериального давления
- повышении свертываемости крови

91. Выберите правильный ответ

Сестринские вмешательства во 2 периоде лихорадки

- холодный компресс, теплое питьё
- холодный примочка, тёплые ножные ванны
- применение жаропонижающих препаратов разных форм
- использование грелки к ногам, горячий чай

92. Выберите правильный ответ

Необходимо приготовить для постановки согревающего компресса

8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, бинт

8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, зажим

8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, зажим

4-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, бинт

93. Выберите правильный ответ

Признаки 3-й стадии пролежней

- образование пузырей и язв
- мацерация кожи
- покраснение кожи с синюшным оттенком
- некроз кожи и подкожной клетчатки

94. Выберите правильный ответ

Функциональный метод исследования дыхательной системы

- спирография
- бронхоскопия
- флюорография
- бронхография

95. Выберите правильный ответ

Мероприятие, проводимое перед постановкой лечебной клизмы

- очистительная клизма
- капельная клизма
- промывание желудка
- гипертоническая клизма

96. Выберите правильный ответ

Кишечник после масляной клизмы опорожняется через (час)

- 6-8
- 2
- 4
- 10-12

97. Выберите правильный ответ

Сифонная клизма применяется при неопухолевой обтурационной кишечной непроходимости для

- терапии состояния обтурации (запора)
- перед постановкой лекарственной клизмы
- введения питательных веществ
- местного воздействия на слизистую прямой кишки

98. Выберите правильный ответ

Мокрота на микобактерии туберкулёза собирается

- трижды, в стерильные ёмкости, в специальном помещении
- после тщательного туалета ротовой полости
- утром натощак, в тёплом виде в лабораторию
- дважды, до и после применения антибиотиков

99. Выберите правильный ответ

При подготовке пациента к ультразвуковому исследованию почек и мочевого пузыря проводят

- водную нагрузку перед исследованием
- приём углеводов продуктов вечером и утром перед исследованием

- приём активированного угля и ферментных препаратов
- психологическую подготовку

100. Выберите правильный ответ

Показание к катетеризации мочевого пузыря

- острая задержка мочи более 6-ти часов
- недержание мочи
- задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала
- появление отеков

101. Выберите правильный ответ

Перечень медицинских изделий и лекарственных препаратов, необходимых для постановки гипертонической клизмы

- грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 10% раствор хлорида натрия
- грушевидный баллон, шприц Жане, вазелин, 10% раствор хлорида натрия
- грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 0,9% раствор хлорида натрия
- грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелиновое масло, 0,9% раствор хлорида натрия

102. Выберите правильный ответ

Показание к промыванию желудка

- отравление ядами
- острое желудочное кровотечение
- инфаркт миокарда
- нарушение мозгового кровообращения

103. Выберите правильный ответ

Анализ мочи на суточную глюкозурию собирается в

- течение суток в одну емкость
- стерильную пробирку
- течение 10 часов в одну емкость
- течение суток, 8 банок, каждые 3 часа

104. Выберите правильный ответ

Объём воды для заполнения грелки составляет

- 2/3 объема грелки
- 1/3 объема грелки
- 1/4 объема грелки
- 1/2 объема грелки

105. Выберите правильный ответ

Показание к проведению искусственного кормления через гастростому

- непроходимость пищевода, опухоли, травмы, ожоги пищевода
- бессознательное состояние, переломы челюстей
- нарушение глотания, отсутствие рвотного рефлекса
- послеоперационный период

106. Выберите правильный ответ

Средства, применяемые для лечения пролежней

- солкосерил, алазол, пантенол
- алмагель, ихтиоловая мазь, тетрациклиновая мазь
- бензил-бензоата, бом-бенге, Вишневского мазь
- оксолиновая мазь, ампициллиновая мазь

107. Выберите правильный ответ

Увлажнение кислорода при оксигенотерапии осуществляется при помощи аппарата

- Боброва
- Илизарова
- Кузнецова
- Дитерикса

108. Выберите правильный ответ

Бронхофиброскоп применяется для исследования состояния слизистых оболочек

- трахеобронхиального дерева
- пищевода и желудка
- тонкого кишечника
- толстого кишечника

109. Выберите правильный ответ

Ректороманоскоп используется для осмотра слизистой оболочки

- прямой кишки
- тонкой кишки
- двенадцатиперстной кишки
- желудка

110. Выберите правильный ответ

Глюкометр используется для измерения уровня

- глюкозы в крови
- глюкозы в моче
- кетоновых тел в моче
- глюкозы в пищевых продуктах

111. Выберите правильный ответ

Шприц-ручка используется для подкожного введения

- инсулина
- вакцины
- гепарина
- глюкозы

112. Выберите правильный ответ

Инструментальное исследование внутренней структуры мочевого пузыря и уретры проводится при помощи

- цистоскопа
- ректоманоскопа
- колоноскопа
- бронхофиброскопа

113. Выберите правильный ответ

Колоноскоп используется для осмотра слизистой оболочки

- толстой кишки
- тонкой кишки
- желудка
- желчного пузыря

114. Выберите правильный ответ

Устройство, предназначенное для введения в организм лекарственных средств аэрозольным способом

- небулайзер, ингалятор
- мешок Амбу
- кислородная лицевая маска

- носовая канюля

115. Выберите правильный ответ

Показанием для введения газоотводной трубки является

- метеоризм
- запор
- непроходимость кишечника
- операция

116. Выберите правильный ответ

Кружка Эсмарха предназначена для

- постановки очистительной клизмы
- постановки сифонной клизмы
- введения жидкости тяжелобольным
- постановки гипертонической клизмы

117. Выберите правильный ответ

Эзофагогастродуоденоскоп используется для осмотра слизистой оболочки

- пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
- толстой кишки
- прямой кишки
- мочевого пузыря

118. Выберите правильный ответ

Медицинский тонометр используют для измерения

- артериального давления
- внутриглазного давления
- венозного давления
- капиллярного давления

119. Выберите правильный ответ

При проведении антропометрических исследований используют

- весы
- секундомер

- пульсометр
- шагомер

120. Выберите правильный ответ

Для кормления тяжелобольных пациентов через назогастральный зонд используют шприц

- Жане
- тубик
- инъекционный
- ручку

121. Выберите правильный ответ

Лечение кислородом под давлением осуществляется

- в барокамере
- в кислородной палатке
- через носовой катетер из кислородного баллона
- через маску при централизованной подаче кислорода

122. Выберите правильный ответ

Перед введением катетера в мочевой пузырь необходимо обработать область уретры

- антисептическим раствором
- 5% раствором перманганата калия
- 0,5% раствором хлорамина
- раствором йода

123. Выберите правильный ответ

Катетер перед введением в мочевой пузырь необходимо смочить

- стерильным глицерином
- 70% раствором спирта
- раствором фурацилина
- раствором хлоргексидина

ПМ.02 Осуществление лечебно-диагностической деятельности

МДК.02.01. Технология оказания простых медицинских услуг

124. Выберите правильный ответ

Игла при внутримышечной инъекции вводится под углом (в градусах)

- 90
- 60
- 45
- 30

125. Выберите правильный ответ

Игла при подкожной инъекции вводится под углом (в градусах)

- 45
- 60
- 90
- 30

126. Выберите правильный ответ

Инъекционная игла длиной 10-16 мм оптимальна для проведения инъекции

- подкожной
- внутрикожной

- внутримышечной
- внутривенной

127. Выберите правильный ответ

Очистительная клизма противопоказана в период

- ранний послеоперационный
- подготовки к диагностическим процедурам
- предродовой
- предоперационный

128. Выберите правильный ответ

Для постановки очистительной клизмы взрослому человеку требуется объем воды (мл)

- 1200-1500
- 500-1000
- 3000-5000
- 6000-8000

129. Выберите правильный ответ

Температура воды для постановки очистительной клизмы при задержке стула спастического генеза составляет (град. С)

- 38-40
- 10-12
- 20-28
- 14-16

130. Выберите правильный ответ

Перед катетеризацией мочевого пузыря вход в уретру обрабатывают

- 0,02% раствором фурацилина
- кипяченой водой
- 70% раствором этилового спирта
- мазью с содержанием антибиотика

131. Выберите правильный ответ

Температура антисептического раствора для промывания мочевого пузыря составляет (град. С)

- 37
- 20
- 24
- 42

132. Выберите правильный ответ

Для ускорения заживления при лечении раны в фазе дегидратации используют

- мазовые повязки
- частые перевязки
- применение ферментов
- лечебную гимнастику

133. Выберите правильный ответ

Кратность промываний мочевого пузыря определяют характеристикой ирригационного раствора

- прозрачностью
- наличием крови
- наличием гноя
- мутностью

134. Выберите правильный ответ

Для обработки ран применяют раствор перекиси водорода в концентрации (%)

- 3
- 6
- 10
- 20

135. Выберите правильный ответ

Длина зонда, вводимая в желудок взрослого человека, измеряется от

- резцов до мочки уха и от мочки уха до мечевидного отростка
- ушной раковины до диафрагмы
- лобной области до пупочного кольца
- височной области до пупочного кольца

136. Выберите правильный ответ

Промывание желудка проводится до появления

- чистых промывных вод
- остатков пищи
- желчи
- мутных промывных вод

137. Выберите правильный ответ

Гипертонический раствор натрия хлорида применяется при

- дренировании гнойных полостей и ран
- первичной хирургической обработке раны
- дезинфекции судна
- стерилизации режущих инструментов

138. Выберите правильный ответ

Температура воды для подмывания новорожденного (градусов С)

- 36-37
- 30-34
- 40-42
- 25-28

139. Выберите правильный ответ

Для очищения носовых ходов новорожденного и детей грудного возраста используют

- ватные жгутики, смазанные стерильным растительным маслом
- сухие ватные жгутики
- ватные палочки
- ватные жгутики, смоченные в кипяченой воде

140. Выберите правильный ответ

Для очищения наружных слуховых проходов у новорожденных и детей грудного возраста используют

- сухие ватные жгутики
- ватные жгутики, смазанные стерильным растительным маслом
- ватные палочки
- ватные жгутики, смоченные в кипяченой воде

141. Выберите правильный ответ

Полость рта здоровому новорожденному

- не протирают
- протирают ватным шариком, смоченным в кипяченой воде
- протирают сухим марлевым шариком
- протирают сухим ватным шариком

142. Выберите правильный ответ

Температура воды для гигиенической ванны новорожденного (градусов С)

- 36-37
- 30-34
- 25-28
- 40-42

143. Выберите правильный ответ

Продолжительность гигиенической ванны для новорожденного составляет (минут)

- 5-8
- 20-30
- 10-15
- 15-20

144. Выберите правильный ответ

Перед введением катетера в мочевой пузырь необходимо обработать область уретры

- антисептическим раствором
- 5% раствором перманганата калия

- 0,5% раствором хлорамина
- раствором йода

145. Выберите правильный ответ

Катетер перед введением в мочевого пузыря необходимо смочить

- стерильным глицерином
- 70% раствором спирта
- раствором фурацилина
- раствором хлоргексидина

146. Выберите правильный ответ

Для разведения антибиотиков используют

- 0,9% раствор натрия хлорида
- 5% раствор глюкозы
- 2% раствор новокаина
- 10% раствор хлористого кальция

147. Выберите правильный ответ

Лекарственные препараты подкожно вводят в объеме не более (мл)

- 2
- 3
- 4
- 5

148. Выберите правильный ответ

Стерильный масляный раствор перед инъекцией подогревают до (градусов С)

- 38
- 40
- 34
- 28

149. Выберите правильный ответ

Изотонический раствор хлорида натрия имеет концентрацию

- 0,9%
- 10%
- 1%
- 0,1%

150. Выберите правильный ответ

Артериальным давлением называется

- давление, которое образуется в артериальной системе организма при сокращениях сердца и зависит от сложной нервно-гуморальной регуляции, величины и скорости сердечного выброса, частоты и ритма сердечных сокращений и сосудистого тонуса
- давление, которое образуется в артериальной системе организма при сокращениях сердца
- величина и скорость сердечного выброса
- частота и ритм сердечных сокращений

151. Выберите правильный ответ

Пульсовое давление представляет собой

- разницу между систолическим и диастолическим давлением
- сумму систолического и диастолического давления
- частоту сердечных сокращений

- давление, возникающее в артериях в момент максимального подъема пульсовой волны после систолы желудочков

152. Выберите правильный ответ

Частотой дыхательных движений (ЧДД) называется

- количество циклов вдох-выдох за 1 минуту
- чередование вдоха и выдоха
- количество выдохов за 1 минуту
- количество вдохов за 1 минуту

153. Выберите правильный ответ

У здорового взрослого человека норма дыхательных движений в покое составляет (в минуту)

- 16-20
- 12-16
- 40-45
- 30-35

154. Выберите правильный ответ

Количество дыхательных движений меньше 16 в минуту называется

- брадипноэ
- тахипноэ
- ортопноэ
- апноэ

155. Выберите правильный ответ

Количество дыхательных движений больше 20 в минуту называется

- тахипноэ
- ортопноэ
- брадипноэ
- апноэ

156. Выберите правильный ответ

Одышкой называется

- расстройство ритма и глубины дыхания
- расстройство глубины дыхания
- расстройство ритма дыхания
- количество вдохов в 1 минуту

157. Выберите правильный ответ

Инспираторной одышкой является

- дыхание с затрудненным вдохом
- дыхание с затрудненным выдохом
- дыхание с затрудненным вдохом и выдохом
- удушье

158. Выберите правильный ответ

Экспираторной одышкой является

- дыхание с затрудненным выдохом
- дыхание с затрудненным вдохом
- дыхание с затрудненным вдохом и выдохом
- приступ удушья

159. Выберите правильный ответ

Суточным диурезом называется

- общее количество мочи, выделенной пациентом в течение суток
- процесс образования и выделения мочи

- общее количество введенной в организм жидкости за сутки
- соотношение между количеством введенной в организм жидкости и количеством выделенной жидкости из организма в течение суток

160. Выберите правильный ответ

Суточный диурез у взрослых в норме составляет

- от 800 мл до 2000 мл
- от 200 мл до 500 мл
- от 500 мл до 800 мл
- от 2000 мл до 3000 мл

161. Выберите правильный ответ

К инвазивным манипуляциям относится

- промывание желудка
- постановка горчичников
- смена постельного и нательного белья
- гигиеническая обработка кожных покровов

162. Выберите правильный ответ

Интенсивность боли медицинская сестра может определить с помощью

- специальной шкалы
- опроса пациента
- визуального наблюдения
- пальпации и перкуссии

163. Выберите правильный ответ

Обезболивание с использованием лекарственных препаратов проводится

- с повышением дозы
- по требованию
- без учета индивидуальности
- с понижением дозы

164. Выберите правильный ответ

К инвазивным процедурам относится

- проведение в/м, в/в, п/к инъекций
- подготовка пациента к исследованию
- проведение мероприятий по личной гигиене тяжелобольных
- кормление пациента

165. Выберите правильный ответ

К субъективным источникам информации относится

- наличие жалоб
- положение в пространстве
- исследование пульса
- определение сознания

166. Выберите правильный ответ

Субъективный метод сестринского обследования

- расспрос пациента
- измерение артериального давления
- определение скрытых отеков
- знакомство с данными медицинской карты стационарного больного

167. Выберите правильный ответ

Привлекая пациента и его семью к обучению приемам ухода, медицинская сестра должна

- определить, что пациент и его семья должны знать и уметь
- получить разрешение у врача
- предупредить старшую медицинскую сестру
- получить разрешение у старшей медсестры

168. Выберите правильный ответ

Рентгенологический метод исследования органов дыхания

- бронхография, томография, флюорография
- холецистография, ирригоскопия, гастроскопия
- спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия
- УЗИ, бронхоскопия

169. Выберите правильный ответ

При транспортировке пациента в кресле-каталке представляет опасность нахождения рук

- за пределами подлокотников
- на животе
- в скрещенном состоянии на груди
- на подлокотниках

170. Выберите правильный ответ

Основным признаком первого периода лихорадки является

- озноб
- жажда
- чувство жара
- рвота

171. Выберите правильный ответ

Вид транспортировки пациента определяет

- врач в соответствии с состоянием пациента
- медицинская сестра в соответствии с состоянием пациента
- фельдшер в соответствии с самочувствием пациента
- врач с учетом мнения пациента

172. Выберите правильный ответ

Кровь на биохимические анализы берется

- утром натощак
- после завтрака
- в любое время суток
- перед обедом

173. Выберите правильный ответ

Антибиотики чаще всего вводятся

- внутримышечно
- подкожно
- внутривенно
- внутривожно

174. Выберите правильный ответ

Внутримышечные инъекции выполняют в

- верхненаружный квадрант ягодицы
- верхневнутренний квадрант ягодицы
- нижненаружный квадрант ягодицы
- нижневнутренний квадрант ягодицы

175. Выберите правильный ответ

Угол наклона иглы при внутривожной инъекции (в градусах)

- 5
- 45
- 90
- не имеет значения

176. Выберите правильный ответ

При внутривенной инъекции игла вводится на глубину

- среза иглы
- двух третей иглы
- в зависимости от расположения сосуда
- всей длины иглы

177. Выберите правильный ответ

Местом введения внутривенной инъекции является

- внутренняя поверхность предплечья
- бедро
- передняя брюшная стенка
- наружная поверхность плеча

178. Выберите правильный ответ

Объем раствора, одномоментно вводимого подкожно, не должен превышать

- 2 мл
- 1 мл
- 3 мл
- 5 мл

179. Выберите правильный ответ

Систолическим давлением называется

- артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца
- давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тону во время расслабления желудочков сердца
- разница между систолическим и диастолическим давлением
- сумма систолического и диастолического давления

180. Выберите правильный ответ

Диастолическим давлением называется

- давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тону во время расслабления желудочков сердца
- артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца
- разница между систолическим и диастолическим давлением
- сумма систолического и диастолического давления

181. Выберите правильный ответ

Пульсовым давлением называется

- разница между систолическим и диастолическим давлением
- артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца

- давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тону во время расслабления желудочков сердца
- сумма систолического и диастолического давления

182. Выберите правильный ответ

Систолическое давление в норме у взрослого человека составляет (мм.рт.ст.)

- 100-120
- 60-80
- 150-170
- 20-40

183. Выберите правильный ответ

Диастолическое давление в норме у взрослого человека составляет (мм.рт.ст.)

- 60-80
- 20-40
- 100-120
- 140-160

184. Выберите правильный ответ

Для постановки клизмы пациенту укладывают на

- левый бок
- правый бок
- спину
- живот

185. Выберите правильный ответ

За 20-30 минут до постановки лекарственной клизмы пациенту ставится

- очистительная клизма
- газоотводная трубка
- сифонная клизма
- гипертоническая клизма

186. Выберите правильный ответ

Для снятия массивных отеков применяют

- гипертоническую клизму
- микроклизму
- масляную клизму
- очистительную клизму

187. Выберите правильный ответ

Субфебрильной температурой тела называется (в градусах С)

- 37,1-38
- 39-39,5
- 38-38,5
- 38,1-38,2

188. Выберите правильный ответ

Для лихорадки второго периода характерно появление

- чувства жара
- слабости
- обильного потоотделения
- сонливости

189. Выберите правильный ответ

Пробой Зимницкого, в моче определяется

- плотность и диурез
- количество сахара, ацетона

- количество форменных элементов, бактерий
- наличие уробилина, желчных пигментов

190. Выберите правильный ответ

За три дня до проведения ультразвукового исследования органов брюшной полости из рациона питания пациента необходимо исключить

- молоко, овощи, фрукты, черный хлеб
- гречневую кашу, помидоры, гранаты
- яйца, белый хлеб, сладости
- мясо, рыбу, консервы

191. Выберите правильный ответ

Для проведения катетеризации используются перчатки

- стерильные
- нестерильные
- нестерильные, обработанные спиртом
- кольчужные

192. Выберите правильный ответ

Уретральный катетер перед введением обрабатывают

- стерильным глицерином
- антисептическим раствором
- 3% раствором перекиси водорода
- 700 этиловым спиртом

193. Выберите правильный ответ

Наиболее частым осложнением катетеризации является

- повреждение слизистой оболочки мочеиспускательного канала
- недержание мочи
- инфицирование мочевыводящих путей
- задержка мочи

194. Выберите правильный ответ

Критическое снижение температуры тела может привести к развитию

- коллапса
- кишечной непроходимости
- острого коронарного синдрома
- острой дыхательной недостаточности

МДК. 02.02. Пропедевтика клинических дисциплин

195. Выберите правильный ответ

Субъективный метод обследования пациента

- расспрос
- аускультация
- осмотр
- пальпация

196. Выберите правильный ответ

Основной объективный метод обследования пациента

- аускультация
- бронхография
- спирометрия
- томография

197. Выберите правильный ответ

Число дыхательных движений у взрослого в норме (в 1 мин.)

- 16-20
- 4-6
- 20-25
- 25-30

198. Выберите правильный ответ

Прямой эпигастральный угол (90) соответствует форме грудной клетки

- нормостенической
- гиперстенической
- астенической
- любой

199. Выберите правильный ответ

Над легкими в норме выслушивается дыхание

- везикулярное
- бронхиальное
- амфорическое
- жесткое

200. Выберите правильный ответ

Патологическая форма грудной клетки

- бочкообразная
- астеническая
- гиперстеническая
- нормостеническая

201. Выберите правильный ответ

Сухие хрипы образуются при

- сужении бронхов
- склеивании альвеол
- расклеивании альвеол
- трении листков плевры

202. Выберите правильный ответ

Крепитация свидетельствует о поражении

- альвеол
- бронхов
- плевры
- трахеи

203. Выберите правильный ответ

При синдроме очагового уплотнения легочной ткани перкуторный звук над ним

- притупленный
- коробочный
- тимпанический
- ясный

204. Выберите правильный ответ

При синдроме скопления жидкости в плевральной полости перкуторный звук

- тупой
- тимпанический
- коробочный
- ясный

205. Выберите правильный ответ

Повышенная воздушность легких

- эмфизема

- пневмония
- пневмосклероз
- ателектаз

206. Выберите правильный ответ

У мужчин преобладает тип дыхания

- брюшной
- грудной
- смешанный
- любой

207. Выберите правильный ответ

Верхняя граница легких спереди определяется на

- 3-4 см выше ключицы
- 1-2 см выше ключицы
- 3-4 см ниже ключицы
- 1-2 см ниже ключицы

208. Выберите правильный ответ

Экскурсия легких в норме по средней подмышечной линии составляет (см)

- 6-8
- 4-6
- 2-3
- 8-10

209. Выберите правильный ответ

Глубокое шумное редкое дыхание

- Куссмауля
- Грокка
- Биота
- Чейна-Стокса

210. Выберите правильный ответ

Шум трения плевры выслушивается

- на вдохе и выдохе
- только на вдохе
- только на выдохе
- при задержке дыхания

211. Выберите правильный ответ

Послойное рентгенологическое исследование легких

- томография
- спирография
- бронхография
- флюорография

212. Выберите правильный ответ

При синдроме образования полости в легком перкуторный звук над ней

- тимпанический
- коробочный
- тупой
- ясный

213. Выберите правильный ответ

Над крупной полостью в легком, сообщающейся с бронхом, дыхание

- амфорическое
- бронхиальное
- везикулярное
- жесткое

214. Выберите правильный ответ

При синдроме скопления жидкости в плевральной полости органы средостения

- смещаются в здоровую сторону
- не смещаются
- смещаются в большую сторону
- все ответы верны

215. Выберите правильный ответ

При синдроме скопления воздуха в плевральной полости перкуторный звук

- тимпанический
- коробочный
- тупой
- ясный

216. Выберите правильный ответ

Разрастание соединительной ткани в легких

- пневмосклероз
- гидроторакс
- ателектаз
- эмфизема

217. Выберите правильный ответ

Скопление жидкости в плевральной полости

- гидроторакс
- ателектаз
- пневмоторакс
- эмфизема

218. Выберите правильный ответ

Скопление воздуха в плевральной полости

- пневмоторакс
- гидроторакс
- гемоторакс
- эмфизема

219. Выберите правильный ответ

Число сердечных сокращений у взрослого в норме составляет (в 1 мин.)

- 60-80
- 40-50
- 90-100
- 100-110

220. Выберите правильный ответ

Артериальное давление в норме составляет (мм.рт.ст.)

- 120/80
- 90/60
- 140/100
- 160/90

221. Выберите правильный ответ

Верхушечный толчок в норме расположен в 5-ом межреберье

- на 1,5-2,0 см кнутри от левой среднеключичной линии
- по левой среднеключичной линии
- на 1,0-1,5 см кнаружи от левой среднеключичной линии
- на 2,0-3,0 см кнаружи от левой среднеключичной линии

222. Выберите правильный ответ

Перкуссию сердца проводят для определения

- границ сердца
- верхушечного толчка
- симптома Мюссе
- тонов и шумов сердца

223. Выберите правильный ответ

Левая граница сердца в норме определяется

- на 1,5-2,0 см кнутри от левой среднеключичной линии
- по левой среднеключичной линии
- на 1,0-2,0 см кнаружи от левой среднеключичной линии
- на 2,0-3,0 см кнаружи от левой среднеключичной линии

224. Выберите правильный ответ

В области верхушечного толчка выслушиваются звуковые явления с клапана

- митрального
- аортального
- пульмонального
- трехстворчатого

225. Выберите правильный ответ

Во 2-ом межреберье у грудины справа выслушиваются звуковые явления с клапана

- аортального
- митрального
- пульмонального
- трехстворчатого

226. Выберите правильный ответ

Появление шума на верхушке сердца свидетельствует о поражении клапана

- митрального
- аортального
- пульмонального
- трехстворчатого

227. Выберите правильный ответ

При синдроме артериальной гипертензии гипертрофируется

- левый желудочек
- правый желудочек
- левое и правое предсердие
- межжелудочковая перегородка

228. Выберите правильный ответ

При осмотре сердечной области можно выявить

- пульсацию верхушечного толчка
- размеры сердца
- размеры сосудистого пучка
- симптом «кошачьего мурлыканья»

229. Выберите правильный ответ

Ширина сосудистого пучка во 2-м межреберье составляет (см)

- 5-6
- 3-4
- 7-8
- 9-10

230. Выберите правильный ответ

Границы относительной сердечной тупости определяются методом

- перкуссии
- осмотра
- пальпации
- аускультации

231. Выберите правильный ответ

Правая граница относительной сердечной тупости находится

- на 0,5-1,0 см кнаружи от правого края грудины
- на 1,5-2,0 см кнутри от правого края грудины
- по правому краю грудины
- по левому краю грудины

232. Выберите правильный ответ

Первый тон сердца образуется захлопыванием

- двухстворчатого и трехстворчатого клапанов
- клапана легочной артерии
- клапанов аортального и легочной артерии
- аортального клапана

233. Выберите правильный ответ

Состояние клапанного аппарата сердца лучше отражает

- ультразвуковое исследование
- рентгенологическое исследование
- ангиографическое исследование
- электрокардиография

234. Выберите правильный ответ

При повышении давления в малом круге кровообращения возникает

- акцент второго тона на легочной артерии
- акцент второго тона на аорте
- ослабление второго тона на легочной артерии
- ослабление первого тона на верхушке

235. Выберите правильный ответ

Осмотр живота позволяет выявить

- наличие асимметрии
- положение внутренних органов
- размеры внутренних органов
- наличие боли

236. Выберите правильный ответ

Поверхностную пальпацию живота проводят с целью определения

- напряжения мышц передней брюшной стенки
- положения внутренних органов
- размеров внутренних органов
- симптома «головы Медузы»

237. Выберите правильный ответ

Глубокая пальпация живота проводится для определения

- положения внутренних органов
- напряжения мышц передней брюшной стенки
- наличия асимметрии живота
- расхождения мышц передней брюшной стенки

238. Выберите правильный ответ

Слепая кишка пальпируется в области

- правой подвздошной
- левой подвздошной
- эпигастральной
- мезогастральной

239. Выберите правильный ответ

Болезненность при поколачивании по правой реберной дуге – положительный симптом

- Ортнера
- Кера
- френикус
- Щеткина-Блюмберга

240. Выберите правильный ответ

Нижняя граница печени по правой среднеключичной линии определяется

- у края реберной дуги
- на 2,0 см выше реберной дуги
- на 2,0 см ниже реберной дуги
- на 4,0 см ниже реберной дуги

241. Выберите правильный ответ

Сигмовидная кишка пальпируется в области

- левой подвздошной
- правой подвздошной
- эпигастральной
- мезогастральной

242. Выберите правильный ответ

Порция «В» желчи при дуоденальном зондировании имеет цвет

- оливковый
- золотистый
- светло-желтый
- темно-желтый

243. Выберите правильный ответ

Признак портальной гипертензии

- асцит
- головная боль
- желтуха
- кожный зуд

244. Выберите правильный ответ

Симптом Пастернацкого выявляется методом

- поколачивания
- осмотра
- пальпации
- аускультации

245. Выберите правильный ответ

Отеки почечного происхождения вначале появляются на

- лице
- пояснице
- руках
- ногах

246. Выберите правильный ответ

Нормальное соотношение дневного и ночного диуреза

- 3:1
- 2:1

1:1

1:2

247. Выберите правильный ответ

Относительная плотность мочи в общем анализе составляет (утренняя порция)

- 1018-1025
- 1007-1010
- 1012-1015
- 1030-1040

248. Выберите правильный ответ

Количество эритроцитов в анализе мочи по Нечипоренко (в 1 мл) до

- 1000
- 3000
- 5000
- 7000

249. Выберите правильный ответ

Количество эритроцитов в общем анализе мочи (в поле зрения)

- 0
- 3
- 6
- 9

250. Выберите правильный ответ

Функциональную способность почек отражает

- проба Зимницкого
- проба Нечипоренко
- общий анализ мочи
- суточная глюкозурия

251. Выберите правильный ответ

Суточный диурез 3 л и более

- полиурия
- никтурия
- олигурия
- анурия

252. Выберите правильный ответ

Суточный диурез 300 мл

- олигурия
- никтурия
- анурия
- полиурия

253. Выберите правильный ответ

Суточный диурез 40 мл

- анурия
- олигурия
- никтурия
- полиурия

254. Выберите правильный ответ

Лимфатические узлы в норме

- не видны и не пальпируются
- видны при осмотре
- не видны, но пальпируются подключичные
- не видны, но пальпируются подколенные

255. Выберите правильный ответ

Количество эритроцитов в норме у мужчин (RBC) составляет (в 1 л)
 $4,5-6,5 \times 10^{12}$
 $3,0-4,0 \times 10^9$
 $6,0-8,0 \times 10^9$
 $2,0-4,0 \times 10^{12}$

256. Выберите правильный ответ

Количество эритроцитов в норме у женщин (RBC) составляет (в 1 л)
 $3,8-5,8 \times 10^{12}$
 $4,5-5,0 \times 10^9$
 $6,0-8,0 \times 10^9$
 $6,0-8,0 \times 10^{12}$

257. Выберите правильный ответ

Количество гемоглобина в норме у мужчин составляет (г/л)
 130-180
 80-100
 100-120
 180-200

258. Выберите правильный ответ

Количество гемоглобина в норме у женщин составляет (г/л)
 115-165
 80-100
 100-120
 180-200

259. Выберите правильный ответ

Среднее содержание гемоглобина в эритроците в норме (MCH) составляет (пг)
 27,0-32,0
 20,0-30,0
 10,0-12,0
 18,0-20,0

260. Выберите правильный ответ

Цветовой показатель отражает
 относительное содержание гемоглобина в одном эритроците
 количество эритроцитов
 степень насыщения эритроцитов гемоглобином
 степень насыщения лейкоцитов гемоглобином

261. Выберите правильный ответ

Значение СОЭ в норме (мм в час)
 2-12
 5-20
 20-40
 40-50

262. Выберите правильный ответ

Значение показателя СОЭ равно 4 мм в час является
 нормальным для мужчин и женщин
 повышенным для мужчин и женщин
 нормальным только для мужчин
 нормальным только для женщин

263. Выберите правильный ответ

Количество лейкоцитов в норме (в 1 л)

$4,0-9,0 \times 10^9$
 $4,0-9,0 \times 10^{12}$
 $1,0-2,0 \times 10^{12}$
 $9,0-12,0 \times 10^9$

264. Выберите правильный ответ

Количество тромбоцитов в норме (в 1 л)
 $150,0-400,0 \times 10^9$
 $160,0-280,0 \times 10^{12}$
 $60,0-80,0 \times 10^9$
 $280,0-320,0 \times 10^{12}$

265. Выберите правильный ответ

Содержание сегментоядерных нейтрофилов в лейкограмме в норме
 47-72%
 20-40%
 6-8%
 0-1%

266. Выберите правильный ответ

Содержание глюкозы в плазме крови натощак в норме (ммоль/л)
 3,9-6,0
 1,1-2,2
 6,6-8,8
 8,8-9,9

267. Выберите правильный ответ

За три дня необходимо исключить из питания железосодержащие продукты при подготовке к
 анализу кала на скрытую кровь
 дуоденальному зондированию
 желудочному зондированию
 рентгенографии желудка

268. Выберите правильный ответ

Данные аускультации при бронхите
 сухие или влажные хрипы
 крепитация
 бронхиальное дыхание
 шум трения плевры

269. Выберите правильный ответ

Аускультативные данные при приступе бронхиальной астмы
 сухие свистящие хрипы
 крепитация
 влажные хрипы
 шум трения плевры

270. Выберите правильный ответ

Пикфлоуметрия – определение
 пиковой скорости выдоха
 дыхательного объема
 жизненной емкости легких
 остаточного объема

271. Выберите правильный ответ

Крепитация выслушивается при
 пневмонии
 бронхиальной астме
 бронхите
 сухом плеврите

272. Выберите правильный ответ

Притупление перкуторного звука и усиление голосового дрожания наблюдается при

- долевого пневмонии
- бронхиальной астме
- остром бронхите
- экссудативном плеврите

273. Выберите правильный ответ

«Ржавый» характер мокроты наблюдается при

- долевого пневмонии
- остром бронхите
- бронхиальной астме
- экссудативном плеврите

274. Выберите правильный ответ

Наиболее информативный метод диагностики пневмонии

- рентгенография грудной клетки
- анализ крови
- анализ мокроты
- плевральная пункция

275. Выберите правильный ответ

Наиболее информативный метод диагностики абсцесса легкого

- рентгенография органов грудной клетки
- анализ мокроты
- анализ крови
- спирометрия

276. Выберите правильный ответ

Симптом «кошачьего мурлыканья» определяется при

- митральном стенозе
- стенокардии
- митральной недостаточности
- инфаркте миокарда

277. Выберите правильный ответ

Появление шума на верхушке сердца свидетельствует о поражении клапана

- митрального
- аортального
- пульмонального
- трехстворчатого

278. Выберите правильный ответ

Данные аускультации при митральной недостаточности

- систолический шум на верхушке
- диастолический шум на верхушке
- диастолический шум во 2-м межреберье справа от грудины
- систолический шум во 2-м межреберье справа от грудины

279. Выберите правильный ответ

Аускультативный признак экссудативного перикардита

- ослабление тонов сердца
- акцент второго тона на легочной артерии
- ослабление первого тона на верхушке

- акцент второго тона на верхушке

280. Выберите правильный ответ

Изменения в биохимическом анализе крови при инфаркте миокарда

- гиперферментемия
- гипохолестеринемия
- гиперпротеинемия
- гипоферментемия

281. Выберите правильный ответ

Зону некроза на ЭКГ при инфаркте миокарда отражает зубец

- Q
- P
- R
- S

282. Выберите правильный ответ

Наиболее информативный метод диагностики гастродуоденита

- эндоскопическое исследование
- рентгенологическое исследование
- ультразвуковое исследование
- желудочное зондирование

283. Выберите правильный ответ

Ирригоскопия - исследование

- толстого кишечника
- желудка
- пищевода
- 12-перстной кишки

284. Выберите правильный ответ

Рентгенологический симптом «ниши» наблюдается при

- язвенной болезни
- гастрите
- раке желудка
- холецистите

285. Выберите правильный ответ

Наиболее информативный метод диагностики рака желудка

- эндоскопическое исследование
- дуоденальное зондирование
- ультразвуковое исследование
- желудочное зондирование

286. Выберите правильный ответ

Для уточнения диагноза желчнокаменной болезни проводится

- УЗИ органов брюшной полости
- колоноскопия
- желудочное зондирование
- цистоскопия

287. Выберите правильный ответ

Для диагностики сахарного диабета применяется

- определение гликированного гемоглобина
- определение Т3, Т4, ТТГ
- общий анализ крови
- общий анализ мочи

288. Выберите правильный ответ

Определение гликированного гемоглобина при сахарном диабете позволяет провести оценку

- среднего уровня гликемии за 2-3 месяца
- среднего уровня гликемии за 5-6 месяцев
- среднего уровня гликемии за 2-3 недели
- среднего уровня гликемии за 6-12 месяцев

289. Выберите правильный ответ

Для определения суточной глюкозурии в лабораторию направляют

- 100-200 мл из суточного количества мочи
- 50 мл свежесобранной мочи
- 10-часовую порцию мочи
- среднюю порцию мочи

290. Выберите правильный ответ

Основной метод лабораторной диагностики, позволяющий установить возбудителя в материале, взятом от пациента

- бактериологический
- аллергологический
- серологический
- кожно-аллергический

291. Выберите правильный ответ

При диагностике кишечных инфекций необходимо проводить бактериологическое исследование

- испражнений
- желчи
- крови
- мочи

292. Выберите правильный ответ

При диагностике инфекций верхних дыхательных путей необходимо проводить бактериологическое исследование

- слизи из носа и зева
- испражнений
- крови
- желчи

293. Выберите правильный ответ

Отоскопия - осмотр

- уха
- глотки
- гортани
- носа

294. Выберите правильный ответ

Фарингоскопия - осмотр

- глотки
- носа
- уха
- гортани

295. Выберите правильный ответ

Риноскопия - осмотр

- носа
- глотки
- гортани
- уха

296. Выберите правильный ответ

Фарингоскопию проводят с помощью

- шпателя
- носового зеркала
- ушной воронки
- иглы Куликовского

МДК.02.03. Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля

297. Выберите правильный ответ

Биологический материал для постановки серологической реакции

- кровь
- кал
- мокрота
- моча

298. Выберите правильный ответ

Спинальная пункция проводится при подозрении

- на менингококковую инфекцию
- на грипп
- на брюшной тиф
- на сыпной тиф

299. Выберите правильный ответ

При подозрении на менингококковую инфекцию необходимо провести бактериологическое исследование

- слизи из носоглотки
- испражнений
- мокроты

- желчи

300. Выберите правильный ответ

Основным методом раннего выявления туберкулеза легких среди взрослого населения является

- лучевой (флюорография)
- микроскопия мокроты на микобактерии туберкулеза
- посев мокроты на микобактерии туберкулеза
- клинический анализ крови

301. Выберите правильный ответ

Для диагностики геморрагического инсульта применяется

- люмбальная пункция
- общий анализ мочи
- плевральная пункция
- рентгенография грудной клетки

302. Выберите правильный ответ

Реакция, используемая для диагностики сифилиса

- Вассермана
- Борде-Жангу

- Манту
- Видаля

303. Выберите правильный ответ

Ведущий клинический симптом характерный для малярии

- периодические лихорадочные приступы
- менингеальный синдром
- резкие боли в животе
- частый жидкий стул

304. Выберите правильный ответ

Решающий симптом при сибирской язве

- сибиреязвенный карбункул
- менингеальный синдром
- гидрофобия
- фибринозный налёт в месте внедрения возбудителя

305. Выберите правильный ответ

Решающий симптом при бешенстве

- гидрофобия
- гепатолиенальный синдром
- менингеальный синдром
- периодические лихорадочные приступы

306. Выберите правильный ответ

Характеристика бубона при чуме

- резко болезненный, спаян с окружающими тканями
- малоболезненный, не спаян с окружающими тканями
- периодическая болезненность при физической нагрузке
- безболезненный, подвижный

307. Выберите правильный ответ

Характеристика бубона при туляремии

- безболезненный, не спаян с окружающими тканями
- безболезненный, подвижный
- периодическая болезненность при физической нагрузке
- резко болезненный, спаян с окружающими тканями

308. Выберите правильный ответ

Ранним клиническим симптомом ботулизма является

- двоение в глазах
- паралич диафрагмы
- задержка стула
- кашель

309. Выберите правильный ответ

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшем количестве

- кровь
- грудное молоко
- слезная жидкость
- слюна

310. Выберите правильный ответ

Ранний клинический синдром ВИЧ-инфекции

- моноклеозоподобный синдром
- менингеальный синдром
- гепатолиенальный синдром
- почечный синдром

311. Выберите правильный ответ

Методами иммуноферментного анализа и иммуноблотинга при ВИЧ-инфекции определяются

- антитела
- антигены
- вирусы
- фермент обратная транскриптаза

312. Выберите правильный ответ

Постановку иммуноблота (Иа) на ВИЧ проводят

- в случае положительного результата иммуноферментного анализа
- немедленно при наличии клинических симптомов ВИЧ-инфекции
- одновременно с иммуноферментным анализом
- перед постановкой иммуноферментного анализа

313. Выберите правильный ответ

Согласно ФЗ РФ «О предупреждении в РФ заболевания, вызываемого ВИЧ» от 1995 г. на ВИЧ-инфекцию обследуются

- доноры, медперсонал, работающий с кровью в СПИД центрах и стационарах для больных СПИДом, специалисты лаборатории НИИ, работающие с ВИЧ
- работники СПИД центра
- только доноры
- только иностранцы

314. Выберите правильный ответ

Ощущение «треска» в шее при поворотах головы характерно для

- остеохондроза
- менингита
- энцефалита
- опухоли головного мозга

315. Выберите правильный ответ

Атрофия мышц - основной симптом

- вялого паралича
- спастического паралича
- миастении
- болезни Паркинсона

316. Выберите правильный ответ

Симптом, характерный для тяжелого сотрясения головного мозга

- ретроградная амнезия
- шум в ушах
- головная боль
- головокружение

317. Выберите правильный ответ

Открытый глаз, слезотечение, опущен угол рта, не поднимается бровь характерно для поражения нерва

- лицевого

- тройничного
- седалищного
- блуждающего

318. Выберите правильный ответ

Характерный признак невралгии тройничного нерва

- приступообразные боли в одной половине лица
- ригидность затылочных мышц
- рвота
- отсутствие складок на лбу при поднимании бровей

319. Выберите правильный ответ

Симптом «заячий глаз», сглаженность лобных и носогубной складок на пораженной стороне характерно для

- неврита лицевого нерва
- энцефалита
- опухоли головного мозга
- острого нарушения мозгового кровообращения

320. Выберите правильный ответ

Ведущий признак неврастении

- раздражительная слабость
- истерический припадок
- навязчивые страхи
- сумеречное состояние

321. Выберите правильный ответ

Общий симптом инволюционных (предстарческих) психозов

- чувство тревоги
- зрительные галлюцинации
- эмоциональная тупость
- бред

322. Выберите правильный ответ

Форменный элемент сыпи при герпесе

- пузырек
- бугорок
- трещина
- узел

323. Выберите правильный ответ

Осложнение чесотки

- очаги лихенификации
- развитие микроспории
- очаги эксфолиации
- токсидермия

324. Выберите правильный ответ

Психогении - заболевания, возникающие под влиянием

- психической травмы
- тяжелых травм головного мозга
- инфекций головного мозга
- алкогольной интоксикации

325. Выберите правильный ответ

Для депрессивного синдрома характерно

- гипотимия
- слабоумие
- эйфория

- раздражительность

326. Выберите правильный ответ

Болезненная бесчувственность характерна для

- шизофрении
- старческого слабоумия
- неврастении
- эпилепсии

327. Выберите правильный ответ

Решающее значение в развитии невротозов имеет

- психогенный фактор
- черепно-мозговая травма
- сосудистые заболевания головного мозга
- нейроинфекция

328. Выберите правильный ответ

Для периферического (вялого) паралича характерно

- наличие атрофии мышц
- наличие патологических рефлексов
- повышение сухожильных рефлексов
- повышение мышечного тонуса

329. Выберите правильный ответ

Для спастического паралича характерно

- наличие патологических рефлексов
- атрофия мышц
- снижение сухожильных рефлексов
- снижение мышечного тонуса

330. Выберите правильный ответ

Симптом «заячий глаз», сглаженность лобных и носогубной складок на пораженной стороне характерно для

- неврита лицевого нерва
- энцефалита
- опухоли головного мозга
- острого нарушения мозгового кровообращения

331. Выберите правильный ответ

Приступообразные боли в одной половине лица, иногда со слезотечением, выделением слизи из носа, слюноотделением возникают при

- невралгии тройничного нерва
- неврите лицевого нерва
- шейном остеохондрозе
- опухоли головного мозга

332. Выберите правильный ответ

Заболевания периферической нервной системы, вызванные остеохондрозом позвоночника

- пояснично-крестцовый радикулит
- неврит лицевого нерва
- неврит лучевого нерва
- неврит срединного нерва

333. Выберите правильный ответ

Патологические рефлекссы характерны для

- спастического паралича
- вялого паралича
- менингита
- энцефалита

334. Выберите правильный ответ

Источник инфекции при вирусных гепатитах

- больные люди
- больные животные
- больные люди и больные животные
- объекты окружающей среды

335. Выберите правильный ответ

Сухость кожи, кожный зуд, жажда и полиурия наблюдаются при

- сахарном диабете
- диффузном токсическом зобе
- гипотиреозе
- эндемическом зобе

336. Выберите правильный ответ

Уровень инсулина в сыворотке крови бывает повышен

- при сахарном диабете 2 типа
- при сахарном диабете 1 типа
- после стимуляции глюкозой при сахарном диабете 1 типа
- после стимуляции глюкозой при сахарном диабете 2 типа

337. Выберите правильный ответ

Ученый, описавший триаду симптомов при заболевании щитовидной железы

- Базедов
- Бехтерев
- Боткин
- Мясников

338. Выберите правильный ответ

Тахикардия, экзофтальм, тремор наблюдаются при

- диффузном токсическом зобе
- гипотиреозе
- сахарном диабете
- эндемическом зобе

339. Выберите правильный ответ

Содержание в крови гормонов Т3, Т4, ТТГ определяют при диагностике

- гипотиреоза
- акромегалии
- гигантизма
- сахарного диабета

340. Выберите правильный ответ

Снижение памяти, запоры, брадикардия наблюдаются при

- гипотиреозе
- диффузном токсическом зобе
- сахарном диабете
- феохромоцитоме

341. Выберите правильный ответ

При недостаточном содержании йода в питании развивается

- эндемический зоб
- диффузный токсический зоб
- сахарный диабет
- акромегалия

342. Выберите правильный ответ

Пульсация сонных артерий наблюдается при

- аортальной недостаточности
- митральной недостаточности
- аортальном стенозе
- митральном стенозе

343. Выберите правильный ответ

Клинические симптомы инфекционного миокардита

- повышение температуры, боли в области сердца, одышка
- отеки, гипертензия, гематурия
- повышение температуры, кашель, кровохарканье
- кратковременные сжимающие боли за грудиной, иррадирующие под левую лопатку

344. Выберите правильный ответ

При экссудативном перикардите положение пациента

- сидя с наклоном вперед
- лежа
- сидя с опорой на руки
- лежа на боку

345. Выберите правильный ответ

Международная классификация болезней - это

- система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями
- перечень диагнозов в определенном порядке
- перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по определенному принципу
- перечень наименований болезней в определенном порядке

346. Выберите правильный ответ

Основная причина развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)

- курение
- ОРВИ
- переохлаждение
- гиповитаминоз

347. Выберите правильный ответ

Основная жалоба пациента при обструктивном бронхите

- одышка
- головная боль
- повышение температуры
- слабость

348. Выберите правильный ответ

Опоясывающий характер боли в животе наблюдается при

- панкреатите
- гепатите
- гастрите
- холецистите

349. Выберите правильный ответ

При хроническом панкреатите наблюдаются синдромы

- болевой, диспепсический
- анемический, гиперпластический
- гипертонический, отечный
- гипертонический, нефротический

350. Выберите правильный ответ

При панкреатите в анализе крови отмечается

- увеличение амилазы
- увеличение белка
- уменьшение амилазы
- уменьшение холестерина

351. Выберите правильный ответ

Местный симптом газовой гангрены

- крепитация
- местное повышение температуры
- покраснение кожи без четких границ
- нагноение тканей

352. Выберите правильный ответ

Симптом, характерный для столбняка

- сардоническая улыбка
- появление пузырей на гиперемизованном фоне кожи
- «хруст снега» при пальпации кожи
- вынужденное положение конечности

353. Выберите правильный ответ

Признак сухой гангрены

- мумифицирование тканей
- гнилостный распад тканей
- нарастающий отек тканей
- газообразование в тканях

354. Выберите правильный ответ

Типичным синдромом при шигеллезе является

- колит
- гастрит
- энтерит
- холецистит

355. Выберите правильный ответ

Механизм передачи ВИЧ-инфекции

- гемоконтактный
- воздушно-капельный
- контактно-бытовой
- фекально-оральный

356. Выберите правильный ответ

Донор должен обязательно обследоваться на

- ВИЧ-инфекцию
- менингококковую инфекцию
- дизентерию
- сибирскую язву

357. Выберите правильный ответ

При ВИЧ-инфекции ее источником являются

- инфицированные люди
- инфицированные животные
- грызуны

- кровососущие насекомые

358. Выберите правильный ответ

При проникновении в организм ВИЧ в первую очередь поражает

- Т-лимфоциты
- тромбоциты
- фагоциты
- эритроциты

359. Выберите правильный ответ

Термин СПИД означает

- заключительную, терминальную стадию ВИЧ-инфекции
- грибковое заболевание
- бактериальное заболевание
- инфекционное заболевание

360. Выберите правильный ответ

Длительность стадии первичных проявлений ВИЧ-инфекции

- до 1 года
- от 2-х недель до 2-х лет
- от 1 года до 2-х лет
- от 3-х месяцев до 3-х лет

361. Выберите правильный ответ

При туберкулезе наиболее часто поражаются

- легкие
- почки
- кости и суставы
- серозные оболочки

362. Выберите правильный ответ

Возбудитель туберкулеза

- микобактерия Коха
- столбнячная палочка
- протей
- синегнойная палочка

363. Выберите правильный ответ

Заражение человека туберкулезом чаще происходит

- аэрогенным путем
- алиментарным путем
- контактным путем
- через кровь

364. Выберите правильный ответ

Наиболее частые входные ворота при туберкулезе

- дыхательные пути
- желудочно-кишечный тракт
- кожа
- раны

365. Выберите правильный ответ

Симптоматика неврита лицевого нерва

- асимметрия лица, невозможность закрыть глаза на пораженной стороне лица
- затруднение при ходьбе
- головная боль
- боли в шейном отделе

366. Выберите правильный ответ

Дизартрия - это

- невнятная речь
- хриплый голос
- шепотная речь
- непонимание речи

367. Выберите правильный ответ

Менингеальный симптом - это

- ригидность мышц затылка
- симптом «свисающей головы»
- симптом Бабинского
- симптом Чугаева

368. Выберите правильный ответ

Возможная причина геморрагического инсульта

- гипертонический криз
- сахарный диабет
- шейный остеохондроз
- пневмония

369. Выберите правильный ответ

Отличие ишемического инсульта от геморрагического инсульта

- отсутствие менингеальных симптомов и крови в ликворе
- наличие параличей конечностей
- наличие речевых нарушений
- гипертоническая болезнь в анамнезе

370. Выберите правильный ответ

Причина ишемического инсульта

- гипертоническая болезнь
- остеохондроз позвоночника
- врожденные аномалии сосудов головного мозга
- опухоли головного мозга

371. Выберите правильный ответ

Острое начало, головная боль, многократная рвота, гемиплегия, менингеальные симптомы характерны для

- геморрагического инсульта
- сотрясения головного мозга
- менингита
- ишемического инсульта

372. Выберите правильный ответ

Контрактура - это

- скованность парализованных конечностей
- атрофия парализованных конечностей
- цианоз парализованных конечностей
- нарушение чувствительности парализованных конечностей

373. Выберите правильный ответ

Спастический гемипарез - нарушение двигательной функции в

- руке и ноге с одной стороны
- одной руке
- одной ноге
- обеих ногах

374. Выберите правильный ответ

Для болезни Паркинсона характерно

- тремор кистей

- нарушение координации
- умственная деградация
- параличи конечностей

375. Выберите правильный ответ

Парестезия - это

- чувство онемения, покалывания
- повышение чувствительности
- снижение чувствительности
- отсутствие чувствительности

376. Выберите правильный ответ

Повышенное стремление к деятельности характерно для

- маниакальной фазы маниакально-депрессивного психоза
- депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза
- эпилепсии
- кататонического синдрома

377. Выберите правильный ответ

Психическая ятрогения - болезненное состояние, возникающее в результате неправильного

- поведения медицинского работника в отношении пациента
- неправильного определения диагноза психического заболевания
- неправильного медикаментозного лечения психического заболевания
- неправильного ухода за больным с психическим заболеванием

378. Выберите правильный ответ

Наиболее общий симптом шизофрении

- отгороженность, отрыв от реальности, погружение в мир собственных переживаний
- маниакальное возбуждение
- отвлекаемость
- амбулаторного автоматизма

379. Выберите правильный ответ

При ипохондрическом бреде пациент считает, что

- у него тяжелая болезнь
- его обворовывают
- он преступник
- его хотят отравить

380. Выберите правильный ответ

Основа слабоумия

- грубые органические изменения клеток головного мозга
- функциональные расстройства высшей нервной деятельности под влиянием внешних факторов (стресс)
- стойкая дисгармония эмоционально-волевых сторон психики
- хроническая соматическая патология

381. Выберите правильный ответ

Характеристика эпилептического статуса

- следование припадков друг за другом, между которыми пациент не приходит в сознание

- наличием в течение дня 20 припадков
- наличием в течение дня 15 припадков
- следование больших припадков друг за другом, между которыми пациент приходит в сознание

382. Выберите правильный ответ

Характер сыпи при псориазе

- бляшки ярко-розового цвета, покрытые рыхлыми серебристо-белыми чешуйками
- уртикарная
- везикулезно-пустулезная
- пятнисто-папулезная

383. Выберите правильный ответ

Возникновению микозов стоп способствует

- повышенная потливость ног
- частое мытье ног
- ношение обуви на высоких каблуках
- приём антигистаминных препаратов

384. Выберите правильный ответ

Первичные форменные элементы сыпи при чесотке

- парные папуло-везикулы
- бугорки
- расчесы
- чесоточные ходы

385. Выберите правильный ответ

Признак первичного сифилиса

- твердый шанкр
- гумма
- полиморфная сыпь
- алопеция

386. Выберите правильный ответ

Возбудитель сифилиса

- бледная спирохета
- клещ
- риккетсия Провачека
- РНК содержащий вирус

387. Выберите правильный ответ

Возбудитель гонореи относится к группе

- бактерий
- вирусов
- клещей
- риккетсий

388. Выберите правильный ответ

Донорство противопоказано при наличии в анамнезе

- вирусного гепатита
- аппендицита
- отита
- пневмонии

389. Выберите правильный ответ

При хроническом гастрите с секреторной недостаточностью наблюдается

- отрыжка тухлым
- отрыжка кислым
- булимия
- запоры

390. Выберите правильный ответ

При хроническом энтерите отмечается кал

- обильный, жидкий
- с примесью чистой крови
- дегтеобразный
- обесцвеченный

391. Выберите правильный ответ

Частое болезненное мочеиспускание

- дизурия
- анурия
- олигурия
- полиурия

392. Выберите правильный ответ

Исход ревматического полиартрита

- все явления проходят
- анкилоз
- стойкая деформация суставов
- кровоизлияние в полость сустава

393. Выберите правильный ответ

Сезонность обострения характерна для

- язвенной болезни
- хронического холецистита
- цирроза печени
- хронического колита

394. Выберите правильный ответ

Поздние, «голодные», ночные боли характерны для

- язвенной болезни 12-перстной кишки
- язвенной болезни желудка
- хронического гастрита
- цирроза печени

395. Выберите правильный ответ

При хронической почечной недостаточности (ХПН) наблюдается

- отеки, повышение АД
- снижение температуры и АД
- тахикардия, экзофтальм
- рези при мочеиспускании, боли в животе

396. Выберите правильный ответ

При хронической почечной недостаточности (ХПН) в анализе крови отмечается

- увеличение креатинина
- увеличение белка
- уменьшение креатинина
- уменьшение холестерина

397. Выберите правильный ответ

Продолжительные обильные менструации ведут к развитию анемии

- железодефицитной
- В12-дефицитной
- гемолитической
- апластической

398. Выберите правильный ответ

Железодефицитная анемия по цветовому показателю

- нормохромная

- гиперхромная
- гипохромная
- любая

399. Выберите правильный ответ

Симптомы характерные для железодефицитной анемии

- бледность кожи, трофические расстройства, извращение вкуса, одышка
- бледность кожи, кровоизлияния, лихорадка
- бледность кожи, кровоточивость, лихорадка, увеличение лимфатических узлов
- бледность кожи, глоссит, нарушение чувствительности

400. Выберите правильный ответ

Клиника В12-дефицитной анемии

- жжение в языке, парестезии
- рвота «кофейной гущей» и дегтеобразный стул
- отрыжка горьким, боль в правом подреберье
- извращение вкуса и обоняния

401. Выберите правильный ответ

Повышение цветового показателя, макроцитоз, тельца Жолли, кольца Кебота наблюдаются при анемии

- В12-дефицитной
- гемолитической
- гипопластической
- железодефицитной

402. Выберите правильный ответ

Слабость, обмороки, извращение вкуса и обоняния наблюдаются при анемии

- В12-дефицитной
- гемолитической
- гипопластической
- железодефицитной

403. Выберите правильный ответ

При остром лейкозе наблюдаются синдромы

- гиперпластический, геморрагический
- гипертонический, нефротический
- болевой, дизурический
- болевой, диспептический

404. Выберите правильный ответ

Лейкемический «провал» в анализе крови наблюдается при

- остром лейкозе
- гемофилии
- хроническом лимфолейкозе
- хроническом миелолейкозе

405. Выберите правильный ответ

При хроническом лимфолейкозе происходит увеличение

- печени, селезенки, лимфатических узлов
- печени, селезенки, сердца
- селезенки, сердца, почек
- селезенки, сердца, щитовидной железы

406. Выберите правильный ответ

Филадельфийская хромосома в клетках костного мозга определяется при

- хроническом миелолейкозе
- остром лейкозе
- хроническом лимфолейкозе
- гемофилии

407. Выберите правильный ответ

Папулезно-геморрагическая сыпь на симметричных участках конечностей наблюдается при

- геморрагическом васкулите
- гемофилии
- железодефицитной анемии
- ревматизме

408. Выберите правильный ответ

Петехиально-пятнистая сыпь на коже, возникающая спонтанно или после небольших травм («шкура леопарда»), наблюдается при

- тромбоцитопении
- гемофилии
- железодефицитной анемии
- хроническом лимфолейкозе

409. Выберите правильный ответ

При сахарном диабете в анализе крови отмечается

- гипергликемия
- гипопроотеинемия
- гиперпротеинемия
- гипербилирубинемия

410. Выберите правильный ответ

При сахарном диабете в анализе мочи отмечается

- глюкозурия
- бактериурия
- оксалатурия
- пиурия

411. Выберите правильный ответ

Воспаление крупных суставов и летучесть боли наблюдаются при

- ревматическом полиартрите
- остеоартрозе
- ревматоидном артрите
- подагре

412. Выберите правильный ответ

Деформация кисти по типу «плавника моржа» наблюдается при

- ревматоидном артрите
- ревматическом полиартрите
- подагре
- остеоартрозе

413. Выберите правильный ответ

Основной механизм заражения при кишечных инфекциях

- фекально-оральный
- воздушно-пылевой
- парентеральный
- воздушно-капельный

414. Выберите правильный ответ

При бактериальной дизентерии стул имеет вид

- «ректального плевка»
- «горохового пюре»
- «малинового желе»
- «болотной тины»

415. Выберите правильный ответ

При сальмонеллёзе стул имеет вид

- «болотной тины»
- «малинового желе»
- «ректального плевка»
- «горохового пюре»

416. Выберите правильный ответ

При холере стул имеет вид

- «рисового отвара»
- «малинового желе»
- «ректального плевка»
- «болотной тины»

417. Выберите правильный ответ

Для клинической картины гриппа характерно

- синдром интоксикации в сочетании с менингеальным синдромом
- диарейный синдром в сочетании с синдромом дегидратации
- синдром интоксикации в сочетании с мочевым синдромом
- синдром интоксикации в сочетании с синдромом трахеита

418. Выберите правильный ответ

Основные симптомы менингита

- головная боль, ригидность мышц затылка
- везикулёзная сыпь
- парез кишечника, параличи
- стул «болотной тины»

419. Выберите правильный ответ

Типичная сыпь при менингококкцемии

- геморрагическая
- везикулёзная
- папулёзная
- розеолёзная

420. Выберите правильный ответ

Назофарингит – форма менингококковой инфекции

- локализованная
- генерализованная
- бактерионосительство
- смешанная

421. Выберите правильный ответ

Ведущий механизм заражения при дифтерии

- аэрогенный
- гемоконтактный
- трансмиссивный
- фекально-оральный

422. Выберите правильный ответ

Для дифтерии характерны клинические симптомы интоксикации и

- появление фибриновых налётов в месте внедрения возбудителя

- периодические лихорадочные приступы
- появление гнойного налёта в месте внедрения возбудителя
- менингеальные симптомы

423. Выберите правильный ответ

Гепатиты А и В объединяет

- поражение печени
- меры профилактики
- поражение селезёнки
- способ заражения

424. Выберите правильный ответ

Фекально-оральный механизм передачи характерен для вирусного гепатита

- А
- В
- С
- D

425. Выберите правильный ответ

Причина парентеральных гепатитов В и С

- использование нестерильного инструментария
- кварцевание
- употребление некипяченой воды
- дезинфекция выделений

426. Выберите правильный ответ

Вирусный гепатит В и ВИЧ-инфекцию объединяют

- механизм заражения
- поражение лимфатических узлов
- поражение печени
- поражение селезёнки

427. Выберите правильный ответ

Отёк подкожной клетчатки шеи при токсической дифтерии зева 3 степени располагается

- спускается ниже ключицы и поднимается на лицо
- вокруг регионарных лимфатических узлов
- доходит до ключицы
- доходит до середины шеи

428. Выберите правильный ответ

Основной путь передачи малярии

- трансмиссивный
- контактно-бытовой
- пищевой
- воздушно-капельный

429. Выберите правильный ответ

При пищевой токсикоинфекции рвота

- приносит облегчение
- не приносит облегчения
- не связана с приемом пищи
- возникает при резком вставании пациента

430. Выберите правильный ответ

Особо опасные инфекции характеризуются

- склонностью к эпидемическому течению и высокой летальностью
- относятся к природно-очаговым инфекциям
- длительным инкубационным периодом
- среднетяжёлым течением

431. Выберите правильный ответ

При ботулизме больной погибает от

- паралича дыхания
- миокардита
- пневмонии
- почечной недостаточности

432. Выберите правильный ответ

Основной путь передачи при сибирской язве

- контактный
- гемоконтактный
- вертикальный
- фекально-оральный

433. Выберите правильный ответ

Основной путь передачи при бубонной форме чумы

- трансмиссивный
- гемоконтактный
- вертикальный
- фекально-оральный

434. Выберите правильный ответ

Основной путь передачи при легочной форме чумы

- воздушно-капельный
- вертикальный
- гемоконтактный
- фекально-оральный

435. Выберите правильный ответ

При геморрагической лихорадке с почечным синдромом количество мочи уменьшается в периоде

- олигурическом
- лихорадочном
- полиурическом
- реконвалесценции

436. Выберите правильный ответ

При столбняке судороги начинаются

- с жевательных мышц и мимических мышц лица
- с мышц живота и верхних конечностей
- с мышц спины и нижних конечностей
- с мышц шеи и груди

437. Выберите правильный ответ

Основной путь передачи при клещевом энцефалите

- трансмиссивный
- вертикальный
- аэрогенный
- фекально-оральный

438. Выберите правильный ответ

Течение клещевого энцефалита характеризуется синдромом

- интоксикации и признаками поражения нервной системы
- интоксикации и диспепсическим синдромом
- интоксикации и лимфоаденопатией
- интоксикации и гепатолиенальным синдромом

439. Выберите правильный ответ

Признаки, характерные только для желудочного кровотечения

- рвота «кофейной гущей», дегтеобразный стул
- головная боль, головокружение
- бледность, слабость
- тахикардия, гипотензия

440. Выберите правильный ответ

Дегтеобразный стул бывает при кровотечении из кишки

- 12-перстной
- ободочной
- сигмовидной
- прямой

441. Выберите правильный ответ

Боль в околопупочной области наблюдается при

- хроническом энтерите
- хроническом панкреатите
- при хроническом холецистите
- при хроническом колите

442. Выберите правильный ответ

Повышение температуры, лейкоцитоз, увеличение СОЭ наблюдаются при

- инфаркте миокарда
- гипертонической болезни
- кардиосклерозе
- стенокардии

443. Выберите правильный ответ

Отеки нижних конечностей, асцит, увеличение печени наблюдаются при

- недостаточности кровообращения
- при инфаркте миокарда
- при стенокардии
- при гипертонической болезни

444. Выберите правильный ответ

Отеки сердечного происхождения появляются

- вечером на ногах
- утром на ногах
- утром на лице
- вечером на лице

445. Выберите правильный ответ

Экстрасистолия - это

- преждевременное сокращение сердца
- увеличение ЧСС
- нарушение проводимости
- уменьшение ЧСС

446. Выберите правильный ответ

АД 170/100 мм.рт.ст.

- гипертензия
- гипотензия
- коллапс
- норма

447. Выберите правильный ответ

Боли в животе наблюдаются при форме инфаркта миокарда

- гастралгической
- астматической

- аритмической
- ангинозной

448. Выберите правильный ответ

Приступ удушья наблюдается при форме инфаркта миокарда

- астматической
- ангинозной
- аритмической
- гастралгической

449. Выберите правильный ответ

Основная причина хронического гастрита

- хеликобактер пилори
- аутоиммунные нарушения
- нерациональное питание
- отравление

450. Выберите правильный ответ

Функциональный класс стенокардии, при котором приступ боли возникает при нагрузке высокой интенсивности

- первый
- второй
- третий
- четвертый

451. Выберите правильный ответ

Главный этиологический фактор развития гипертонической болезни

- нервно-психическое перенапряжение
- недостаточная физическая активность
- рациональное питание
- стрептококковая инфекция

452. Выберите правильный ответ

Фактор риска развития атеросклероза

- гиперхолестеринемия
- занятия физической культурой
- неотягощенная наследственность
- рациональное питание

453. Выберите правильный ответ

При атеросклерозе поражаются

- артерии
- вены
- капилляры
- мышцы

454. Выберите правильный ответ

Сжимающие боли за грудиной, иррадиирующие под левую лопатку, продолжительностью 5-10 минут, характерны для

- стенокардии
- инфаркта миокарда
- ревматического эндокардита
- бактериального эндокардита

455. Выберите правильный ответ

Функциональный класс стенокардии, при котором приступ боли возникает при ходьбе менее чем на 100 м или в покое

- четвертый
- второй

- третий
- первый

456. Выберите правильный ответ

Типичная форма инфаркта миокарда

- ангинозная
- абдоминальная
- астматическая
- безболевая

457. Выберите правильный ответ

Основная жалоба пациента при бронхиальной астме

- приступ удушья
- кашель с гнойной мокротой
- боль в грудной клетке
- кровохарканье

458. Выберите правильный ответ

Для бронхоэктатической болезни характерно наличие

- гноя в расширенных бронхах
- опухоли
- каверны
- жидкости в плевральной полости

459. Выберите правильный ответ

Наиболее информативный метод диагностики бронхоэктатической болезни

- бронхография
- бронхоскопия
- спирография
- флюорография

460. Выберите правильный ответ

Пальцы в виде «барабанных палочек» и ногти в виде «часовых стекол» встречаются при

- бронхоэктатической болезни
- очаговой пневмонии
- долевой пневмонии
- острым бронхите

461. Выберите правильный ответ

Кровохарканье наиболее характерно для

- бронхоэктатической болезни
- острого бронхита
- бронхиальной астмы
- экссудативного плеврита

462. Выберите правильный ответ

Дренажное положение придается пациенту при

- бронхоэктатической болезни
- бронхиальной астме
- сухом плеврите
- экссудативном плеврите

463. Выберите правильный ответ

Абсцессом легкого может осложниться

- долевая пневмония
- бронхиальная астма
- острый бронхит
- сухой плеврит

464. Выберите правильный ответ

Появление обильной гнойной мокроты на фоне гектической лихорадки наблюдается при

- абсцессе легкого во II стадии
- долевой пневмонии в стадии разрешения
- бронхиальной астме в стадии ремиссии
- раке легкого в начальной стадии

465. Выберите правильный ответ

Над крупной свободной полостью абсцесса легкого определяется дыхание

- амфорическое
- бронхиальное
- везикулярное
- жесткое

466. Выберите правильный ответ

Для абсцесса легкого в I стадию характерна лихорадка

- гектическая
- волнообразная
- извращенная
- постоянная

467. Выберите правильный ответ

Боль в грудной клетке, усиливающаяся при кашле, шум трения плевры характерны для

- сухого плеврита
- бронхиальной астмы
- бронхита
- экссудативного плеврита

468. Выберите правильный ответ

При экссудативном плеврите в зоне скопления экссудата аускультативно определяется

- отсутствие дыхания на стороне поражения
- амфорическое дыхание
- крепитация
- шум трения плевры

469. Выберите правильный ответ

Этиология острой ревматической лихорадки

- бета-гемолитический стрептококк группы A
- золотистый стафилококк
- кишечная палочка
- пневмококк

470. Выберите правильный ответ

Повышение температуры, эндомиокардит, полиартрит наблюдаются при

- острой ревматической лихорадке
- гипертонической болезни
- ишемической болезни сердца
- атеросклерозе

471. Выберите правильный ответ

Воспаление крупных суставов, летучесть болей наблюдаются при

- ревматическом полиартрите
- ревматоидном артрите
- остеоартрозе
- подагре

472. Выберите правильный ответ

Поражение кожи при острой ревматической лихорадке

- кольцевидная эритема
- «сосудистые звездочки»
- диффузный цианоз
- эритема по типу «бабочки»

473. Выберите правильный ответ

Основная причина приобретенных пороков сердца

- ревмокардит
- инфаркт миокарда
- стенокардия
- гипертоническая болезнь

474. Выберите правильный ответ

Цвет кожных покровов при митральном стенозе в стадии декомпенсации

- цианотичные
- желтушные
- нормальной окраски
- бледные

475. Выберите правильный ответ

Обострение хронического панкреатита провоцируется

- приемом жирной пищи, алкоголя
- ОРВИ, переохлаждением
- приемом белковой пищи, курением
- переутомлением, стрессом

476. Выберите правильный ответ

Осложнение язвенной болезни, вызывающее панкреатит

- пенетрация
- кровотечение
- перфорация
- пилоростеноз

477. Выберите правильный ответ

Осложнение хронического панкреатита

- сахарный диабет
- желчнокаменная болезнь
- цирроз печени
- язвенная болезнь

478. Выберите правильный ответ

При панкреатите в анализе крови отмечается

- увеличение амилазы
- увеличение белка
- уменьшение амилазы
- уменьшение холестерина

479. Выберите правильный ответ

Амилорея, креаторея, стеаторея наблюдаются при

- хроническом панкреатите
- хроническом гепатите
- хроническом холецистите
- хроническом гастрите

480. Выберите правильный ответ

Расширение вен пищевода развивается при

- циррозе печени
- колите
- холецистите

хроническом гастрите

481. Выберите правильный ответ

Осложнение цирроза печени

- пищеводное кровотечение
 перфорация желудка
 пенетрация
 пилоростеноз

482. Выберите правильный ответ

Основная причина хронического гепатита

- вирус гепатита В
 вирус гепатита А
 кишечная палочка
 энтерококк

483. Выберите правильный ответ

Основные симптомы хронического гепатита

- желтуха, гепатомегалия
 слабость, недомогание
 головная боль, тошнота
 метеоризм, поносы

484. Выберите правильный ответ

Симптом «головы Медузы» характерен для

- цирроза печени
 панкреатита
 гастрита
 язвенной болезни

485. Выберите правильный ответ

«Сосудистые звездочки» на верхней части туловища характерны для

- цирроза печени
 холецистита
 панкреатита
 язвенной болезни

486. Выберите правильный ответ

При хроническом холецистите отмечаются

- боль в правом подреберье, горечь во рту
 асцит, «сосудистые звездочки»
 отрыжка тухлым, рвота
 рвота «кофейной гущей», мелена

487. Выберите правильный ответ

Печеночная колика наблюдается при

- желчнокаменной болезни
 панкреатите
 хроническом гепатите
 циррозе печени

488. Выберите правильный ответ

При печеночной колике развивается желтуха

- механическая
 гемолитическая
 паренхиматозная
 надпеченочная

489. Выберите правильный ответ

При гломерулонефрите преимущественно поражаются почечные

- клубочки
 каналы

лоханки

чашечки

490. Выберите правильный ответ

Основная причина острого гломерулонефрита

- бета-гемолитический стрептококк
 вирус гриппа
 микобактерия
 кишечная палочка

491. Выберите правильный ответ

Признаки нефротического синдрома

- отеки, массивная протеинурия
 артериальная гипертония, макрогематурия
 лихорадка, лейкоцитурия
 боль в поясничной области, цилиндрурия

492. Выберите правильный ответ

Триада симптомов при остром гломерулонефрите

- гематурия, отеки, гипертония
 пиурия, бактериурия, гипертония
 гематурия, бактериурия, отеки
 лейкоцитурия, цилиндрурия, отеки

493. Выберите правильный ответ

Анализ мочи при остром гломерулонефрите

- гематурия, протеинурия, цилиндрурия
 гематурия, глюкозурия, пиурия
 лейкоцитурия, протеинурия, цилиндрурия
 лейкоцитурия, протеинурия, бактериурия

494. Выберите правильный ответ

При пиелонефрите преимущественно поражаются

- почечные чашечки, лоханки
 мочеточники
 почечные клубочки
 почечные клубочки и каналы

495. Выберите правильный ответ

Лихорадка, боль в поясничной области, лейкоцитурия наблюдаются при

- остром пиелонефрите
 остром гломерулонефрите
 поясничном радикулите
 хроническом гломерулонефрите

496. Выберите правильный ответ

Мочевой синдром при пиелонефрите

- лейкоцитурия, бактериурия
 цилиндрурия, глюкозурия
 гематурия, протеинурия
 протеинурия, глюкозурия

497. Выберите правильный ответ

Клинические симптомы острого цистита

- субфебрильная температура, рези при мочеиспускании
 боль в поясничной области, лихорадка
 боль в поясничной области, макрогематурия
 отеки, гипертония

498. Выберите правильный ответ

Приступ сильной боли в пояснице с иррадиацией по ходу мочеточника в паховую область наблюдается при

- мочекаменной болезни
- пиелонефрите
- гломерулонефрите
- цистите

499. Выберите правильный ответ

Фельдшер выдает листок нетрудоспособности одновременно на срок до

- 10 календарных дней
- 5 календарных дней
- 30 календарных дней
- 7 календарных дней

500. Выберите правильный ответ

Фельдшер может продлить листок нетрудоспособности на срок до

- 10 календарных дней
- 30 календарных дней
- 7 календарных дней
- календарных дней

501. Выберите правильный ответ

При продолжающейся нетрудоспособности свыше 10 дней фельдшер

- продлевает листок нетрудоспособности еще до 10 дней
- закрывает листок нетрудоспособности и направляет больного на консультацию к врачу ближайшего лечебного учреждения
- после консультации с врачебной комиссией медицинской организации (по подчиненности) продлевает листок нетрудоспособности до 30 календарных дней
- госпитализирует больного

МДК.02.04. Клиническая фармакология

502. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при почечной колике

- дротаверин
- эналаприл
- фуросемид
- глюкоза

503. Выберите правильный ответ

При гипертоническом кризе применяют

- эналаприлат
- аминофиллин (эуфиллин)
- эпинефрин (алренилин)
- морфин

504. Выберите правильный ответ

Препарат из группы кровезаменителей

- гидроксипрохлорид
- аминофиллин
- допамин
- эпинефрин

505. Выберите правильный ответ

Для профилактики эндемического зоба рекомендуют

- употреблять йодированную поваренную соль
- диета с ограничением легкоусвояемых углеводов
- употребление импортных продуктов
- всегда применять спиртовую настойку йода

506. Выберите правильный ответ

Этиотропная терапия гриппа, ОРВИ

- противовирусные
- муколитики
- антибиотики
- мукокинетики

507. Выберите правильный ответ

На реологические свойства мокроты влияют

- муколитики

- антибиотики
- противовирусные
- мукокинетики

508. Выберите правильный ответ

Препарат, обладающий муколитическим действием

- бромгексин
- азитромицин
- амоксициллин
- теofilлин

509. Выберите правильный ответ

Препарат для базисной терапии бронхиальной астмы

- будесонид (пульмикорт турбухалер)
- эпинефрин
- цефотаксим
- сальбутамол

510. Выберите правильный ответ

Группы препаратов для лечения пневмонии

- антибиотики, муколитики
- глюкокортикостероиды, бронхолитики
- мукокинетики, диуретики
- противовирусные, антигистаминные

511. Выберите правильный ответ

Препарат, относящийся к β -адреноблокаторам

- метопролол
- гидрохлортиазид
- верапамил
- эналаприл

512. Выберите правильный ответ

Гиполипидемические средства

- статины
- бета-адреноблокаторы
- антагонисты кальция
- ингибиторы АПФ

513. Выберите правильный ответ

Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (АПФ)

- эналаприл, лизиноприл
- симвастатин, ловастатин
- фуросемид, индапамид
- метопролол, бисопролол

514. Выберите правильный ответ

Средства, относящиеся к диуретикам

- гидрохлортиазид, индапамид
- аторвастатин, симвастатин
- атенолол, бисопролол
- фозиноприл, лизиноприл

515. Выберите правильный ответ

Блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА)

- лозартан, телмисартан
- атенолол, бисопролол
- спиронолактон, индапамид
- эналаприл, фозиноприл

516. Выберите правильный ответ

Антагонисты кальция (АК)

- верапамил, амлодипин
- небивололол, бисопролол
- фуросемид, индапамид
- валсартан, лозартан

517. Выберите правильный ответ

Особенности диеты при атеросклерозе

- ограничение жиров животного происхождения
- ограничение жиров растительного происхождения
- ограничение овощей
- ограничение морепродуктов

518. Выберите правильный ответ

Особенности транспортировки пациента при инфаркте миокарда

- лежа на носилках
- сидя
- без ограничений
- нуждается в сопровождении

519. Выберите правильный ответ

Особенности режима при инфаркте миокарда в первые сутки

- постельный
- палатный
- амбулаторный
- свободный

520. Выберите правильный ответ

Антикоагулянтная терапия инфаркта миокарда

- гепарин
- клопидогрел
- ацетилсалициловая кислота
- преднизолон

521. Выберите правильный ответ

Антиаритмические препараты

- амиодарон, верапамил
- каптоприл, индапамид
- ацетилсалициловая кислота, эналаприл

- гепарин, алтеплаза

522. Выберите правильный ответ

Особенности диеты при хронической сердечной недостаточности (ХСН)

- ограничение соли, жидкости, продуктов богатых холестерином
- употребление соли до 15 г в сутки, жидкости до 2,5 литров в сутки
- ограничение продуктов богатых К, Mg, клетчаткой
- ограничение морепродуктов, овощей, фруктов

523. Выберите правильный ответ

Особенности диеты при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ):

- питание дробное 5-6 раз, ограничить жирные продукты, кофе, острые блюда
- ограничение соли, жидкости, продуктов богатых холестерином
- рекомендованы свёкла, продукты богатые клетчаткой, растительное масло
- питание дробное, необходимы продукты богатые К, Mg, контроль массы тела

524. Выберите правильный ответ

Препараты для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)

- омепразол, алмагель
- эналаприл, индапамид
- бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ
- амоксициллин, бромгексин

525. Выберите правильный ответ

Препараты для эрадикации хеликобактер пилори

- омепразол, кларитромицин, амоксициллин
- изосорбида динитрат, метопролол, эналаприл
- амоксициллин, бромгексин, теофиллин
- валсартан, индапамид, амлодипин

526. Выберите правильный ответ

Купирование болевого синдрома при хроническом панкреатите

- дротаверин
- омепразол
- амоксициллин
- мезим

527. Выберите правильный ответ

Заместительная терапия при хроническом панкреатите

- панкреатин
- омепразол
- кларитромицин
- дротаверин

528. Выберите правильный ответ

Диетические рекомендации при хроническом холецистите

- питание дробное 5-6 раз, исключить жирное, жареное, копчености, приправы
- ограничение соли, жидкости, продуктов, богатых холестерином

- рекомендованы чернослив, свёкла, продукты богатые клетчаткой
- исключить капусту, горох, газированные напитки, ограничить жиры

529. Выберите правильный ответ

Немедикаментозные методы лечения гепатитов и циррозов печени

- диета, отказ от курения и алкоголя, ограничение физических нагрузок
- строгий постельный режим, голод
- нормализация массы тела, занятие спортом
- увеличение двигательной активности, низкокалорийная диета

530. Выберите правильный ответ

Лечение циррозов печени

- гепатопротекторы
- желчегонные
- антибиотики
- спазмолитики

531. Выберите правильный ответ

Этиотропная терапия гломерулонефрита

- антибиотики
- муколитики
- диуретики
- цитостатики

532. Выберите правильный ответ

Немедикаментозные методы лечения острого гломерулонефрита

- режим постельный, ограничение соли, прием жидкости с учётом диуреза
- увеличение двигательной активности, питание низкокалорийное
- питание дробное 5-6 раз, небольшими порциями, после еды не ложиться
- отказ от курения и алкоголя, прием жидкости до 2 литров в сутки

533. Выберите правильный ответ

Симптоматическая терапия гломерулонефрита

- диуретики, гипотензивные
- антибиотики, противовоспалительные
- противовирусные, глюкокортикостероиды
- холеретики, холекинетики

534. Выберите правильный ответ

Немедикаментозные методы лечения пиелонефрита

- количество жидкости около 2 л/сутки с учетом диуреза, ограничение соли, приправ
- ограничение соли, белковых продуктов, жидкости
- рекомендованы чернослив, свёкла, продукты богатые клетчаткой
- исключить жирное, жареное, копчёности

535. Выберите правильный ответ

Немедикаментозные методы лечения острого цистита

- обильный прием жидкости, исключение продуктов, раздражающих мочевые пути
- отказ от курения и алкоголя, нормализация массы тела
- питание дробное 5-6 раз, ограничить жирные продукты, кофе
- режим постельный, ограничение соли до 2 г, прием жидкости с учётом диуреза

536. Выберите правильный ответ

Этиотропная терапия пиелонефрита

- антибиотики
- глюкокортикостероиды
- диуретики
- нестероидные противовоспалительные средства

537. Выберите правильный ответ

Группа препаратов для купирования почечной колики

- спазмолитики
- диуретики
- противовирусные
- антибиотики

538. Выберите правильный ответ

Немедикаментозное лечение эндемического зоба

- включение в диету морепродуктов, йодированной соли
- ограничение поступления в организм йода, исключить продукты с кофеином
- умеренные физические нагрузки, исключение быстроусвояемых углеводов
- исключение жирной и жареной пищи

539. Выберите правильный ответ

Медикаментозное лечение эндемического зоба

- калия йодид
- тиамазол
- метформин
- преднизолон

540. Выберите правильный ответ

Медикаментозное лечение диффузного токсического зоба

- тиамазол
- калия йодид
- левотироксин
- диклофенак

541. Выберите правильный ответ

Медикаментозное лечение гипотиреоза

- левотироксин
- калия йодид
- тиамазол
- омега-3

542. Выберите правильный ответ

Диета при сахарном диабете

- исключить легкоусвояемые углеводы, ограничить животные жиры
- ограничение соли, белковых продуктов, жидкости

- щадящая диета, не рекомендованы молоко, капуста, горох, газированные напитки
- обильный прием жидкости, исключение острых продуктов

543. Выберите правильный ответ

Медикаментозное лечение сахарного диабета 1 типа

- инсулины
- антиагреганты
- препараты сульфаниламочевины
- бигуаниды

544. Выберите правильный ответ

Медикаментозное лечение сахарного диабета 2 типа

- бигуаниды
- глюкокортикостероиды
- диуретики
- антибиотики

545. Выберите правильный ответ

К таблетированным сахароснижающим препаратам относится

- метформин
- инсулин
- актрапид
- пенициллин

546. Выберите правильный ответ

Медикаментозное лечение В12-дефицитной анемии

- цианокобаламин
- мальтофер
- тардиферон
- омепразол

547. Выберите правильный ответ

Медикаментозное лечение железодефицитной анемии

- сорбифер дурулес
- цианокобаламин
- преднизолон
- гепарин

548. Выберите правильный ответ

Критерием эффективности лечения препаратами железа является повышение в крови

- ретикулоцитов
- лимфоцитов
- лейкоцитов
- тромбоцитов

549. Выберите правильный ответ

Продукты богатые железом

- телятина, печень
- крупа, хлеб
- молоко, творог
- сыр, масло

550. Выберите правильный ответ

При остеопорозе рекомендовано употребление в пищу

- молока, творога

- крупы, хлеба
- картофеля, масла
- телятины, яблок

551. Выберите правильный ответ

При лечении ревматоидного артрита применяют

- преднизолон, метотрексат
- атенолол, эналаприл
- амоксициллин, бромгексин
- сорбифер, мальтофер

552. Выберите правильный ответ

Нестероидные противовоспалительные препараты

- диклофенак, мелоксикам
- метатрексат, азатиоприн
- омепразол, пантопразол
- преднизолон, дексаметазон

553. Выберите правильный ответ

При подагре в рационе питания ограничивают

- мясо
- молоко
- фрукты
- овощи

554. Выберите правильный ответ

Для купирования приступа подагры используются

- нестероидные противовоспалительные препараты
- цитостатики
- диуретики
- антигистаминные

555. Выберите правильный ответ

Для лечения крапивницы применяют

- антигистаминные препараты
- антибиотики
- антиагреганты
- диуретики

556. Выберите правильный ответ

Декстран (полиглокин) преимущественно используют для

- борьбы с шоком
- парентерального питания
- ускорения свертывания крови
- борьбы с тромбозом

557. Выберите правильный ответ

Принцип определения групповой принадлежности крови

- по содержанию агглютиногенов и агглютининов
- по наследственному признаку
- по наличию хлопьев в плазме
- на основании проб на совместимость

558. Выберите правильный ответ

Реципиентом является тот

- кому переливают кровь
- кто склонен к кровотечениям
- кто дает кровь или орган для другого человека
- кто перенес кровопотерю

559. Выберите правильный ответ
Кристаллоидный инфузионный раствор
 раствор Рингера

- неогемодез
- маннитол
- реополиглюкин

МДК.02.05. Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний хирургического профиля

560. Выберите правильный ответ
При ожоге кисти кипятком накладывают повязку

- варежка
- клеевую
- сходящуюся
- перчатка

561. Выберите правильный ответ
Лечебная тактика при перитоните

- экстренная операция
- плановая операция
- консервативное лечение
- антибиотикотерапия и гемосорбция

562. Выберите правильный ответ
Метод лечения неосложненной паховой грыжи

- плановая операция
- экстренная операция
- массаж живота
- ношение бандажа

563. Выберите правильный ответ
Лечение острого парапроктита

- вскрытие гнойной полости
- свечи с анестезином
- восходящий душ
- массаж промежности

564. Выберите правильный ответ
Дренаж в гнойную рану вводят

- для обеспечения оттока отделяемого
- для остановки кровотечения
- для ускорения эпителизации
- для произведения тампонады

565. Выберите правильный ответ
При остром перитоните выполняется операция

- экстренная
- плановая
- срочная
- диагностическая

566. Выберите правильный ответ
Метод лечения неосложненного острого холецистита

- консервативный
- хирургический
- физиотерапевтический
- санаторно-курортный

567. Выберите правильный ответ
Основной метод хирургического лечения острого гематогенного остеомиелита

- остеоперфорация
- остеосинтез
- скелетное вытяжение

- ампутация

568. Выберите правильный ответ
Условия для заживления раны первичным натяжением

- края ровные, хорошо соприкасаются
- края неровные, между ними значительный промежуток
- нагноение раны
- инородное тело в ране

569. Выберите правильный ответ
Удаление некротического стержня является методом лечения

- фурункула
- абсцесса
- гидраденита
- лимфаденита

570. Выберите правильный ответ
После вскрытия абсцесса накладывают повязку

- с гипертоническим раствором хлорида натрия
- с мазью Вишневского
- с преднизолоновой мазью
- с 3% раствором перекиси водорода

571. Выберите правильный ответ
Для лечения серозного мастита применяют

- функциональный покой молочной железе, сцеживание молока
- вскрытие очага инфекции
- обильное питье
- антибактериальную терапию

572. Выберите правильный ответ
Противопоказание к операции при остром аппендиците

- отсутствует
- старческий возраст
- гипертоническая болезнь
- острая пневмония

573. Выберите правильный ответ
Метод хирургического лечения перитонита

- лапаротомия
- антибиотикотерапия
- дезинтоксикационная терапия
- лапароскопия

574. Выберите правильный ответ
Тепловые процедуры при ушибе мягких тканей назначают

- на 2-3 сутки
- сразу после травмы
- через несколько часов
- не назначают вообще

575. Выберите правильный ответ

Оптимальное время проведения первичной хирургической обработки раны до

- 6 часов
- 8 часов
- 12 часов
- 18 часов

576. Выберите правильный ответ

Репозиция отломков производится при

- любом смещении отломков
- интерпозиции
- поднадкостничных переломах
- открытых переломах

577. Выберите правильный ответ

Для лечения гнойных ран в фазе гидратации применяют

- повязки с гипертоническими растворами
- промывание 0,5% раствором хлоргексидина
- мазовые повязки
- тампонаду раны

578. Выберите правильный ответ

При злокачественных опухолях 4 стадии показана операция

- паллиативная
- радикальная
- электрокоагуляция
- экстренная

579. Выберите правильный ответ

При нагноении раны необходимо

- развести края раны, произвести ревизию и ввести в нее дренаж
- наложить компресс
- иссечь края
- провести ПХО

580. Выберите правильный ответ

Первичная хирургическая обработка раны - это

- иссечение краев, дна и стенок раны с последующим наложением швов
- промывание раны
- удаление из раны сгустков крови и инородных тел
- наложение на рану вторичных швов

581. Выберите правильный ответ

Радикальная помощь при аденоме предстательной железы

- аденомэктомия
- пункция мочевого пузыря
- наложение эпицистостомы
- введение постоянного катетера в мочевой пузырь

582. Выберите правильный ответ

Ведущий метод лечения рака молочной железы

- хирургическая операция
- рентгенотерапия
- оксигенобаротерапия
- физиотерапия

583. Выберите правильный ответ

Сроки и место проведения репозиции костных отломков при открытом переломе

- в операционной в ближайшее время после поступления
- во время санитарной обработки в приемном отделении
- на месте получения травмы
- в любом из перечисленных мест и в любое время

584. Выберите правильный ответ

Основной метод лечения злокачественных опухолей

- оперативное лечение
- химиотерапия
- гормонотерапия
- физиотерапия

585. Выберите правильный ответ

При ушибе мягких тканей рекомендуется местно применить холод

- на 30 минут
- на 6 час
- на 2 дня
- на 7 дней

586. Выберите правильный ответ

Вид повязки при растяжении связок в голеностопном суставе

- восьмиобразная
- спиральная
- колосовидная
- черепашья

587. Выберите правильный ответ

Окклюзионную повязку используют

- при открытом пневмотораксе
- при переломе ребер
- при внутреннем клапанном пневмотораксе
- при артериальном кровотечении

588. Выберите правильный ответ

Повязка, применяемая при ранении пальцев кисти

- рыцарская перчатка
- крестообразная
- черепашья
- змеевидная

589. Выберите правильный ответ

Повязка, применяемая при носовом кровотечении

- пращевидная
- лейкопластырная
- уздечка
- циркулярная

590. Выберите правильный ответ

Повязку Дезо используют при переломе

- ключицы
- грудины
- костей предплечья
- ребер

591. Выберите правильный ответ

Набор инструментов для ПХО раны включает

- пинцет хирургический
- роторасширитель
- лопатка Ревердена
- проволочная пила Джигли

592. Выберите правильный ответ

Инструмент из набора для проведения трахеостомии

- трахеорасширитель
- пила дуговая
- языкодержатель
- окончатый зажим

593. Выберите правильный ответ

Группа крови, в которой содержится агглютиноген В и агглютинин ?

- третья
- первая
- вторая
- четвертая

594. Выберите правильный ответ

Группа крови, в которой содержатся агглютиногены А и В

- четвертая
- вторая
- третья
- первая

595. Выберите правильный ответ

Компоненты пробы на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента

- сыворотка реципиента и кровь донора
- плазма реципиента и сыворотка донора
- плазма донора и кровь реципиента
- плазма донора и сыворотка реципиента

596. Выберите правильный ответ

Состав крови II группы

- А(бета)
- В(альфа)
- АВ(0)
- 0(бета-альфа)

597. Выберите правильный ответ

Состав крови III группы

- В(альфа)
- А(бета)
- АВ(0)
- 0(альфа-бета)

598. Выберите правильный ответ

Состав крови I группы

- АВ(0)
- А(бета)
- В(альфа)
- 0(альфа-бета)

599. Выберите правильный ответ

Характеристика пульса и АД при гемотрансфузионном шоке

- тахикардия, падение АД
- тахикардия, повышение АД

- брадикардия, падение АД
- брадикардия, повышение АД

600. Выберите правильный ответ

Гемоторакс – скопление крови

- в плевральной полости
- в капсуле сустава
- в брюшной полости
- в околосердечной сумке

601. Выберите правильный ответ

Характерный симптом облитерирующего эндартериита

- исчезновение периферического пульса
- гиперемия кожи
- нарастающий отек тканей
- общее повышение температуры

602. Выберите правильный ответ

«Переменяющаяся» хромота - основной признак облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей

- лимфангита
- варикозного расширения вен нижних конечностей
- лимфостаза в нижних конечностях

603. Выберите правильный ответ

Абсолютный признак вывиха

- нахождение суставного конца в необычном месте
- гематома в зоне перелома
- крепитация
- отек мягких тканей сустава

604. Выберите правильный ответ

Абсолютное укорочение конечности характерно для

- перелома костей
- растяжения связок
- ушиба
- разрыва суставной капсулы

605. Выберите правильный ответ

Достоверный признак шока

- падение артериального систолического давления
- потеря сознания
- кровотечение
- бледность кожных покровов

606. Выберите правильный ответ

Абсолютный симптом вывиха костей

- «пустой сустав»
- нарушение функции
- боль
- отек

607. Выберите правильный ответ

При массивном внутреннем кровотечении пульс

- становится реже
- учащается
- не изменяется
- не определяется

608. Выберите правильный ответ

Кровотечение, возникшее в первые сутки после травмы

- раннее вторичное
- первичное
- позднее вторичное
- скрытое

609. Выберите правильный ответ

Рана является проникающей, если

- повреждены мышцы и кости
- повреждены только кожа и подкожная клетчатка
- в ней находится инородное тело
- повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка (плевра, брюшина)

610. Выберите правильный ответ

Вид ран, где чаще всего возможно повреждение костей

- рубленая
- лоскутная
- колотая
- резаная

611. Выберите правильный ответ

Местный признак нагноения раны

- местное повышение температуры
- побледнение кожи
- подкожная эмфизема
- стихание боли

612. Выберите правильный ответ

Местный симптом рожистого воспаления

- гиперемия с четкими границами
- подергивание мышц
- гиперемия без четких границ
- инфильтрация с цианотичным оттенком кожи

613. Выберите правильный ответ

Ограниченное скопление гноя в тканях

- абсцесс
- флегмона
- гематома
- атерома

614. Выберите правильный ответ

Острый гематогенный остеомиелит - воспаление

- костного мозга и кости
- коленного сустава
- пальца
- венозных сосудов

615. Выберите правильный ответ

Карбункул - воспаление

- нескольких волосяных мешочков
- одного волосяного мешочка
- потовой железы
- лимфатической железы

616. Выберите правильный ответ

Фурункул - воспаление

- одного волосяного мешочка

- нескольких волосяных мешочков
- потовой железы
- лимфатической железы

617. Выберите правильный ответ

Характерное проявление внутреннего кровотечения

- бледность кожных покровов
- повышение артериального давления
- гиперемия кожи
- брадикардия

618. Выберите правильный ответ

Гидраденит - воспаление

- потовой железы
- нескольких волосяных мешочков
- одного волосяного мешочка
- лимфатической железы

619. Выберите правильный ответ

Панариций - воспаление

- тканей пальцев рук (реже ног) с ладонной стороны или области ногтя
- одного волосяного мешочка
- потовой железы
- лимфатической железы

620. Выберите правильный ответ

Флюктуация - это

- размягчение в центре инфильтрата
- судорожное сокращение мимических мышц
- появление пузырей на гиперемированном фоне
- «хруст» при пальпации кожи

621. Выберите правильный ответ

Форма рожистого воспаления кожи

- эритематозная
- узловая
- абсцедирующая
- инфильтративная

622. Выберите правильный ответ

Поверхностная форма панариция

- паронихия
- тендовагинит
- пандактилит
- суставной панариций

623. Выберите правильный ответ

Степень обморожения можно определить

- спустя несколько дней
- на 2-ой день
- в дореактивном периоде
- сразу после согревания

624. Выберите правильный ответ

Характерный признак обморожения II степени

- образование пузырей
- некроз всей толщи кожи
- обратимая сосудистая реакция
- мраморность кожи

625. Выберите правильный ответ

Степень тяжести глубокого термического ожога

- ШВ
- II
- IIIA
- I

626. Выберите правильный ответ

Характерный признак ожога крепкими щелочами

- колликвационный некроз
- гиперемия кожи
- коагуляционный некроз
- образование пузырей

627. Выберите правильный ответ

При сотрясении головного мозга наблюдаются

- головокружение, тошнота, рвота
- параличи (парезы) конечностей
- нарушения зрения
- нарушения слуха

628. Выберите правильный ответ

Абсолютный признак перелома основания черепа

- ушная и назальная ликворея
- разлитая головная боль
- психомоторное возбуждение
- утрата сознания в момент травмы

629. Выберите правильный ответ

Характерный признак ушиба головного мозга

- анизокория
- тошнота и рвота
- головная боль
- потеря сознания

630. Выберите правильный ответ

Общемозговой симптом черепно-мозговой травмы

- потеря сознания
- анизокория
- парезы и параличи
- нарушение чувствительности

631. Выберите правильный ответ

Очаговый симптом черепно-мозговой травмы

- парезы конечностей
- тошноту, рвоту
- потерю сознания
- ретроградную амнезию

632. Выберите правильный ответ

Признак закрытого пневмоторакса

- коробочный звук при перкуссии
- укорочение перкуторного звука
- брадикардия
- усиление дыхательных шумов

633. Выберите правильный ответ

Открытый пневмоторакс - это

- перемещение воздуха при дыхании через рану грудной клетки в плевральную полость и обратно, рана «дышит»
- воздух, попавший при ранении в плевральную полость
- скопление воздуха в подкожной клетчатке
- скопление крови в плевральной полости

634. Выберите правильный ответ

Симптом клапанного пневмоторакса

- нарастающая одышка
- урежение пульса
- усиление дыхательных шумов
- отечность тканей

635. Выберите правильный ответ

Баллотирование средостения наблюдается при

- открытом пневмотораксе
- закрытом пневмотораксе
- клапанном пневмотораксе
- медиастините

636. Выберите правильный ответ

Синдром травматической асфиксии обусловлен в первую очередь

- сдавливанием кровеносных сосудов органов грудной клетки
- рефлекторным спазмом сосудов легких
- нарушением проходимости верхних дыхательных путей
- сдавливанием артериальных сосудов верхних конечностей

637. Выберите правильный ответ

Средостение при открытом пневмотораксе на вдохе

- смещается в противоположную сторону
- смещается в сторону повреждения
- не смещается
- совершает маятникообразные движения

638. Выберите правильный ответ

Разрыв полого органа брюшной полости приводит к развитию

- перитонита
- флегмоны передней брюшной стенки
- флегмоны забрюшинного пространства
- гемоперитонеума

639. Выберите правильный ответ

Характерный признак проникающего ранения живота

- появление в ране содержимого внутренних органов
- обильное кровотечение
- значительное напряжение мышц передней брюшной стенки
- каловая рвота

640. Выберите правильный ответ

Воздух под диафрагмой при закрытой травме живота скапливается при ранении

- желудка
- печени
- селезенки
- сальника

641. Выберите правильный ответ

Симптом «Ваньки-встаньки» характерен для повреждения

- селезенки

- брыжейки кишечника
- желудка
- сальника

642. Выберите правильный ответ

Симптом Ситковского наблюдается при

- острым аппендиците
- острым панкреатите
- острым холецистите
- почечной колике

643. Выберите правильный ответ

Характер рвоты при острым панкреатите

- многократная, не приносящая облегчения
- однократная
- многократная, приносящая облегчение
- отсутствует

644. Выберите правильный ответ

Симптом Кохера наблюдается при

- острым аппендиците
- острым холецистите
- острым парапроктитом
- острым панкреатите

645. Выберите правильный ответ

Симптом острого холецистита

- Ортнера
- Пастернацкого
- Ситковского
- подающей капли

646. Выберите правильный ответ

«Доскообразный» живот наблюдается при

- перфоративной язве желудка
- повреждении печени
- желудочном кровотечении
- острым аппендиците

647. Выберите правильный ответ

Анализ крови и мочи на содержание амилазы выполняют при подозрении на

- острым панкреатитом
- острым проктитом
- кишечное кровотечение
- острым перитонитом

648. Выберите правильный ответ

Достоверный симптом аппендицита

- симптом Образцова
- тошнота
- вздутие живота
- разлитая боль в животе

649. Выберите правильный ответ

Опоясывающая боль наблюдается при

- панкреатите
- холецистите
- травме селезенки
- перфоративной язве желудка

650. Выберите правильный ответ

«Серп» воздуха при рентгенографии брюшной полости характерен для

- прободной язвы
- кишечной непроходимости
- кровоточащей язвы
- панкреатита

651. Выберите правильный ответ

Симптом перфоративной язвы желудка

- Спигарского
- Ситковского
- Кохера
- Ортнера

652. Выберите правильный ответ

Инвагинация - это

- внедрение вышележащего отрезка кишки в нижележащий
- сдавление внутренних органов в грыжевых воротах
- перекрут кишечника вокруг оси брыжейки
- закупорка просвета кишки опухолью

653. Выберите правильный ответ

При ретроградном ущемлении грыжи в грыжевом мешке находится

- две петли кишки
- одна петля кишки
- мочевого пузыря
- сальник

654. Выберите правильный ответ

Грыжевой мешок образован

- париетальной брюшиной
- висцеральной брюшиной
- сальником
- брыжейкой кишечника

655. Выберите правильный ответ

Обтурационная острая кишечная непроходимость развивается при

- опухоли кишечника
- перитоните
- ущемленной грыже
- спазме кишечника

656. Выберите правильный ответ

Симптом острой кишечной непроходимости

- задержка стула и газов
- симптом Щеткина-Блюмберга
- доскообразный живот
- постоянная боль в правом подреберье

657. Выберите правильный ответ

Причина трещин заднего прохода

- длительные запоры
- цистит
- проктит
- парапроктит

658. Выберите правильный ответ

Характер патологических примесей в каловых массах при геморрое

- кровь не смешана с каловыми массами
- дегтеобразный стул
- стул со слизью

- кровь смешана с каловыми массами

659. Выберите правильный ответ

Парапроктит - это

- воспаление околопрямокишечной клетчатки
 выпадение прямой кишки
 воспаление вен прямой кишки
 воспаление прямой кишки

660. Выберите правильный ответ

Симптомы подкожного парапроктита

- боль, припухлость, гиперемия кожи вокруг заднего прохода
 трещины в области задней спайки
 напряженные сине-багровые узлы в области анального отверстия
 зуд в анальной области

661. Выберите правильный ответ

Симптом внутрибрюшинного разрыва прямой кишки

- положительные симптомы раздражения брюшины
 диспепсические расстройства
 зияние заднего прохода
 непроизвольное отхождение кала

662. Выберите правильный ответ

Симптом, подтверждающий внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря

- симптом Щеткина-Блюмберга
 мягкий живот
 симптом Ситковского
 кровотечение из уретры

663. Выберите правильный ответ

Урогематома - достоверный симптом повреждения

- почечной паренхимы и лоханки
 кишечника
 селезенки
 надпочечника

664. Выберите правильный ответ

Достоверная диагностика в онкологии обеспечивается исследованием

- гистологическим
 радиоизотопным
 рентгенологическим
 ультразвуковым

665. Выберите правильный ответ

Характерный симптом острой ангины

- боль при глотании
 потеря голоса
 нарушение носового дыхания
 снижение слуха

666. Выберите правильный ответ

При отоскопии у детей раннего возраста ушную раковину оттягивают

- вниз и назад
 вниз и вперед
 вперед на себя
 вверх и назад

667. Выберите правильный ответ

Охриплость голоса (афония) - ведущий признак

- ларингита
 острого ринита
 среднего отита
 заглочного абсцесса

668. Выберите правильный ответ

Острота зрения определяется при помощи

- таблицы Сивцева Д.А.
 рефрактометра
 таблицы Рабкина Е.Б.
 периметра

669. Выберите правильный ответ

За норму принята острота зрения, равная

- 1,0
 0,8
 0,9
 0,5

670. Выберите правильный ответ

Внутриглазное давление при проникающем ранении глаза

- понижено
 незначительно повышено
 не изменяется
 резко повышено

671. Выберите правильный ответ

Симптом конъюнктивита

- гиперемия конъюнктивального свода
 гиперемия век
 отёк век
 перикорнеальная инъекция сосудов

672. Выберите правильный ответ

Симптом кератита

- инфильтрат на роговице
 гнойное отделяемое из конъюнктивальной полости
 гиперемия конъюнктивального свода
 чувство засоренности глаза

673. Выберите правильный ответ

Основной признак глаукомы

- стойкое повышение внутриглазного давления
 повышение температуры тела
 стойкое повышение артериального давления
 выделение из глаз

674. Выберите правильный ответ

Характер боли для острых форм пульпита

- приступообразная, самопроизвольная, усиливается от раздражителей и в ночное время
 постоянная, нарастающая от холодного
 кратковременная, от раздражителей, быстро проходящая
 пульсирующая, постоянного характера

675. Выберите правильный ответ

Жалобы пациента при остром гнойном периодонтите на

- постоянные, нарастающие, пульсирующие, усиливающиеся при накусывании боли
- острые, ноющие, усиливающиеся от раздражителей боли
- боли от кислого, сладкого, холодного, горячего
- самопроизвольные, приступообразные боли в ночное время

676. Выберите правильный ответ

Симптом Ситковского при остром аппендиците

- появление или усиление болей в правой подвздошной области при поворачивании больного со спины на левый бок и в положении на левом боку
- резкая боль на вдохе при предварительно введенных пальцах кисти в правое подреберье
- медленное надавливание на переднюю брюшную стенку всеми сложенными вместе пальцами кисти с последующим их быстрым отнятием
- болезненность при пальпации правой подвздошной области усиливается, если заставить больного поднять выпрямленную в коленном суставе правую ногу

677. Выберите правильный ответ

Симптом раздражения брюшины при остром аппендиците

- Щеткина-Блюмберга
- Кера
- Брудзинского
- Кернига

678. Выберите правильный ответ

Наиболее распространенное стоматологическое заболевание

- кариес зубов
- болезни слизистой оболочки
- периостит
- заболевания пульпита и периодонтита

679. Выберите правильный ответ

Характерная жалоба при зрелой катаракте

- отсутствие предметного зрения
- выделение из глаза
- боль в глазу
- улучшение ранее сниженного зрения

680. Выберите правильный ответ

Характер отделяемого из глаз при дифтерийном конъюнктивите

- мутное, с хлопьями
- отделяемое отсутствует
- слизисто-гнойное, гнойное
- цвета мясных помоев

681. Выберите правильный ответ

Характер отделяемого при гонобленнорее

- цвета мясных помоев

- слезотечение
- слизисто-гнойное, гнойное
- мутное, с хлопьями

682. Выберите правильный ответ

Свойство злокачественной опухоли

- растет быстро, разрушая окружающие ткани
- растет медленно, имеет капсулу
- не влияет на общее состояние
- не метастазирует

683. Выберите правильный ответ

Свойство доброкачественной опухоли

- растет медленно, не прорастает в окружающие ткани
- рецидивирует
- метастазирует
- вызывает кахексию

684. Выберите правильный ответ

Наиболее частое осложнение случайных ран

- воспаление
- столбняк
- сепсис
- газовая гангрена

685. Выберите правильный ответ

Особенность укушенных ран

- возможность заражения бешенством
- выраженная боль
- обильное кровотечение
- возможность заражения столбняком

686. Выберите правильный ответ

Прогрессирующее похудание наблюдается при

- раке желудка
- хроническом гастрите
- хроническом холецистите
- язвенной болезни

687. Выберите правильный ответ

Перерождение язвы в рак

- малигнизация
- пенетрация
- перфорация
- пилоростеноз

688. Выберите правильный ответ

К облигатному предраку относится

- атрофический гастрит
- нормацидный гастрит
- гиперацидный гастрит
- язва 12-перстной кишки

689. Выберите правильный ответ

Состав крови IV группы

- 0(альфа-бета)
- A(бета)
- B(альфа)
- AB(0)

МДК. 02.06. Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля

689. Выберите правильный ответ

Вид докорма для грудного ребенка

- адаптированная смесь
- каша
- овощное пюре
- творог

690. Выберите правильный ответ

Кратность кормлений ребенка второго полугодия жизни в течение суток

- 5 раз в день
- 6 раз в день
- 4 раза в день
- свободный режим кормлений

691. Выберите правильный ответ

Цель введения прикорма

- удовлетворение возросших потребностей в питательных веществах
- обеспечение потребности в жирах
- обеспечение потребности в углеводах
- обеспечение потребности в поваренной соли

692. Выберите правильный ответ

Рекомендуемые сроки введения в рацион ребенка грудного возраста фруктовых соков (мес.)

- 4-5
- 1-2
- 6-7
- 8-9

693. Выберите правильный ответ

Рекомендуемые сроки введения в рацион ребенка грудного возраста овощного пюре (мес.)

- 5-6
- 3-4
- 2-3
- 8-9

694. Выберите правильный ответ

Рекомендуемые сроки введения в рацион ребенка грудного возраста безглютеновых каш (мес.)

- 6-7
- 3-4
- 2-3
- 8-9

695. Выберите правильный ответ

При искусственном вскармливании в качестве заменителя женского молока используют

- адаптированные молочные смеси
- коровье молоко
- молочные каши
- фруктовые соки

696. Выберите правильный ответ

Показание для перевода ребенка на искусственное вскармливание

- отсутствие молока у матери
- самопроизвольное истечение молока

- затруднение выделения молока
- быстрое поступление молока

697. Выберите правильный ответ

Показание для перевода ребенка на смешанное вскармливание

- гипогалактия
- паратрофия
- срыгивания
- дисфагия

698. Выберите правильный ответ

Докорм ребенку грудного возраста дают

- после кормления грудью
- перед кормлением грудью
- между кормлениями грудью
- только на последнее кормление

699. Выберите правильный ответ

Прикорм дают ребенку

- перед кормлением грудью
- после кормления грудью
- полностью заменяя одно кормление грудью
- между кормлениями грудью

700. Выберите правильный ответ

Цель введения докорма ребенку

- обеспечить недостающее количество питательных веществ
- увеличить поступление поваренной соли
- уменьшить поступление поваренной соли
- увеличить поступление жиров

701. Выберите правильный ответ

Оптимальные сроки отнятия ребенка от груди

- 1-1,5 года
- 9 месяцев
- 6 месяцев
- 3 месяца

702. Выберите правильный ответ

Количество соков в дневном рационе годовалого ребенка (мл)

- 90-100
- 50-60
- 10-20
- 200

703. Выберите правильный ответ

Идеальной пищей для грудного ребенка является

- молоко матери
- адаптированная молочная смесь
- пастеризованное козье молоко
- пастеризованное коровье молоко

704. Выберите правильный ответ

Согласно рекомендациям «Национальной программы по оптимизации вскармливания» прикормы следует вводить с

- 4-6 мес.
- 6-8 мес.

- 5-8 мес.
- 8-10 мес.

705. Выберите правильный ответ

Противопоказание к грудному вскармливанию со стороны ребёнка

- фенилкетонурия
- недоношенность
- гемолитическая болезнь новорожденного
- оперативное родоразрешение

706. Выберите правильный ответ

Ребенок начинает удерживать голову в возрасте (мес.)

- 2
- 4
- 6
- 8

707. Выберите правильный ответ

Ребенок самостоятельно сидит в возрасте (мес.)

- 6-7
- 2-3
- 4-5
- 8-9

708. Выберите правильный ответ

Словарный запас годовалого ребенка составляет (слов)

- 8-10
- 4-6
- 16-18
- 12-14

709. Выберите правильный ответ

Ребенок начинает самостоятельно ходить в возрасте (мес.)

- 11-12
- 13-14
- 15-16
- 8-9

710. Выберите правильный ответ

Эмоции ребенка в 4 месяца характеризуются

- смехом
- появлением «комплекса оживления» в ответ на эмоциональное общение с ним
- быстрым ответом улыбкой на разговор с ним взрослого
- радостью от общения с другим ребенком, гулением

711. Выберите правильный ответ

При «розовом» типе лихорадки у ребенка

- теплоотдача соответствует теплопродукции
- теплоотдача превышает теплопродукцию
- теплопродукция превышает теплоотдачу
- теплоотдача и теплопродукция снижены

712. Выберите правильный ответ

При «бледном» типе лихорадки у ребенка

- теплоотдача соответствует теплопродукции
- теплоотдача превышает теплопродукцию
- теплопродукция превышает теплоотдачу

теплоотдача и теплопродукция снижены

713. Выберите правильный ответ

Симптом «розового» типа лихорадки у детей

- кожные покровы теплые, влажные, «лихорадочный» румянец
- общее состояние страдает значительно
- дистальные отделы холодные на ощупь, озноб
- кожные покровы бледные, с мраморным оттенком

714. Выберите правильный ответ

Симптом «бледного» типа лихорадки у детей

- дистальные отделы холодные на ощупь, озноб
- общее состояние страдает незначительно
- кожные покровы теплые, влажные, «лихорадочный» румянец
- теплоотдача соответствует теплопродукции

715. Выберите правильный ответ

При «бледном» типе лихорадки у детей есть риск развития

- коллапса
- анафилактического шока
- эксикоза
- носового кровотечения

716. Выберите правильный ответ

При ОРВИ у детей может возникнуть неотложное состояние

- фебрильные судороги
- анорексия
- приступообразный кашель
- головная боль

717. Выберите правильный ответ

Внезапное появление у ребенка 2-х лет лающего кашля, осиплости голоса и стенотического дыхания характерно

- для острого обструктивного ларингита
- для приступа бронхиальной астмы
- для острого обструктивного бронхита
- для острого тонзиллита

718. Выберите правильный ответ

Ведущий клинический симптом обструктивного бронхита у детей

- экспираторная одышка
- лихорадка
- инспираторная одышка
- слабость

719. Выберите правильный ответ

Внезапное появление ночью у ребенка 2-х лет лающего кашля, осиплости голоса и инспираторной одышки характерно для развития

- обструктивного ларингита
- обструктивного бронхита
- острого тонзиллита
- приступа бронхиальной астмы

720. Выберите правильный ответ

При приступе бронхиальной астмы ребенок садится, опираясь руками на край сидения с целью

- облегчения дыхания
- облегчения кашля
- снижения АД
- снижения температуры тела

721. Выберите правильный ответ

При приступе бронхиальной астмы у ребенка над легкими аускультативно определяется

- сухие и влажные разнокалиберные хрипы на фоне жесткого дыхания
- крепитация на фоне ослабленного дыхания
- шум трения плевры
- шум трения перикарда

722. Выберите правильный ответ

Характер одышки при приступе бронхиальной астмы у детей

- экспираторный
- инспираторный
- смешанный
- одышка отсутствует

723. Выберите правильный ответ

Тахипноэ и цианоз носогубного треугольника после физической нагрузки у ребенка грудного возраста

- ДН I
- ДН II
- ДН III
- отсутствие ДН

724. Выберите правильный ответ

Признак ДН II у ребенка раннего возраста

- одышка в покое с участием вспомогательной мускулатуры
- нарушение сознания, судороги
- соотношение частоты дыхательных движений и пульса 1:4
- появление одышки и цианоза после физической нагрузки

725. Выберите правильный ответ

Симптомы, позволяющие заподозрить инородное тело верхних дыхательных путей у ребенка

- затрудненное шумное дыхание, возникшее внезапно, инспираторная одышка, приступообразный кашель
- нарушение сознания, судороги
- повышение температуры тела, кашель, нарастание интоксикации
- появление одышки и цианоза после физической нагрузки

726. Выберите правильный ответ

Симптомы, позволяющие заподозрить у ребенка обморок

- внезапная потеря сознания, бледность, холодный пот, снижение АД
- нарушение сознания, судороги
- затрудненное шумное дыхание, возникшее внезапно, инспираторная одышка, приступообразный кашель
- повышение температуры тела, кашель

727. Выберите правильный ответ

Симптомы, позволяющие заподозрить развитие эксикоза у ребенка раннего возраста

- сухость кожи, слизистых, западение большого родничка
- гипертермия
- отказ от еды, тошнота
- головная боль, рвота

728. Выберите правильный ответ

Симптомы, позволяющие заподозрить развитие у ребенка крапивницы

- внезапное начало, появление уртикарной сыпи, интенсивный зуд кожи, чихание, обильные водянистые выделения из носа
- возникновение приступа экспираторной одышки
- острое появление ограниченного отека кожи, подкожной клетчатки, слизистых
- чихание, обильные водянистые выделения из носа

729. Выберите правильный ответ

Симптомы, позволяющие заподозрить развитие у ребенка отека Квинке

- острое появление ограниченного отека кожи, подкожной клетчатки, слизистых
- возникновение приступа экспираторной одышки
- чихание, обильные водянистые выделения из носа
- внезапное начало, появление уртикарной сыпи, интенсивный зуд кожи

730. Выберите правильный ответ

Сердечно-сосудистые симптомы при анафилактическом шоке у ребенка

- тахикардия, снижение АД вплоть до коллапса
- тахикардия, повышение АД
- тахикардия, АД в норме
- изменений нет

731. Выберите правильный ответ

Желудочно-кишечные симптомы при анафилактическом шоке у ребенка

- резкие боли в животе, тошнота, рвота
- диарея
- метеоризм
- отрыжка, изжога

732. Выберите правильный ответ

Возможная причина развития гипогликемической комы у ребенка с сахарным диабетом

- избыточное введение инсулина при недостаточном приеме пищи
- нарушение диеты (избыток углеводов)
- недостаточная доза инсулина
- острое инфекционное заболевание

733. Выберите правильный ответ

Возможная причина развития кетоацидотической комы у ребенка с сахарным диабетом

- нарушение диеты (избыток углеводов)
- избыточное введение инсулина при неадекватном приеме пищи
- запоздалый прием пищи после введения инсулина
- физическое и психическое перенапряжение

734. Выберите правильный ответ

Симптомы, позволяющие заподозрить менингококковую инфекцию у ребенка

- геморрагическая сыпь звездчатого характера на фоне высокой лихорадки
- пятнисто-папулезная сыпь, синдром катарального воспаления верхних дыхательных путей, лихорадка
- мелкоточечная сыпь, бледный носогубный треугольник, острый тонзиллит, лихорадка
- везикулезная сыпь на фоне умеренно выраженной лихорадки

735. Выберите правильный ответ

Частота дыхательных движений у новорожденного (в 1 мин.)

- 40-60
- 30-35
- 20-25
- 16-18

736. Выберите правильный ответ

Частота дыхательных движений у ребенка грудного возраста (в 1 мин.)

- 30-35
- 20-25
- 16-18
- 40-60

737. Выберите правильный ответ

Частота сердечных сокращений у новорожденного (в 1 мин.)

- 120-140
- 100-120
- 80-100
- 60-80

738. Выберите правильный ответ

Частота сердечных сокращений у ребенка грудного возраста (в 1 мин.)

- 100-110
- 80-100
- 60-80
- 120-140

739. Выберите правильный ответ

Частота дыхательных движений у ребенка 3-7 лет (в 1 мин.)

- 20-25
- 40-60
- 30-35
- 16-18

740. Выберите правильный ответ

Частота сердечных сокращений у ребенка 3-7 лет (в 1 мин.)

- 80-100
- 60-80
- 100-120
- 120-140

741. Выберите правильный ответ

Частота дыхательных движений у ребенка 7-10 лет (в 1 мин.)

- 18-20
- 40-60
- 30-35
- 20-25

742. Выберите правильный ответ

Частота сердечных сокращений у ребенка 7-12 лет (в 1 мин.)

- 75-85
- 80-100
- 100-120
- 120-140

743. Выберите правильный ответ

Малый родничок у новорожденного располагается между костями черепа

- затылочной и теменными
- теменными
- височной и теменной
- лобной и теменными

744. Выберите правильный ответ

Большой родничок у ребенка грудного возраста располагается между костями черепа

- лобной и теменными
- теменными
- височной и теменной
- затылочной и теменными

745. Выберите правильный ответ

Форма большого родничка

- ромбовидная
- округлая
- треугольная
- овальная

746. Выберите правильный ответ

Большой родничок закрывается в возрасте (мес.)

- 12-15
- 6-9
- 3-4
- 20-24

747. Выберите правильный ответ

Первые молочные зубы появляются у детей в возрасте (мес.)

- 6-7
- 4-5
- 3-4
- 8-9

748. Выберите правильный ответ

Первыми из молочных зубов на первом году жизни прорезываются

- центральные нижние резцы
- боковые верхние резцы

- центральные верхние резцы
- боковые нижние резцы

749. Выберите правильный ответ

Количество молочных зубов у ребенка

- 8
- 12
- 20
- 32

750. Выберите правильный ответ

Смена молочных зубов на постоянные зубы начинается в возрасте (лет)

- 5-7
- 3-4
- 7-10
- 10-13

751. Выберите правильный ответ

Смена молочных зубов на постоянные зубы заканчивается в возрасте (лет)

- 11-12
- 5-7
- 7-10
- 14-16

752. Выберите правильный ответ

Шейный лордоз у грудного ребенка появляется в возрасте (мес.)

- 2-3
- 6-7
- 9-10
- 12

753. Выберите правильный ответ

Грудной кифоз у грудного ребенка появляется в возрасте (мес.)

- 6-7
- 11-12
- 9-10
- 2-3

754. Выберите правильный ответ

Поясничный лордоз у грудного ребенка появляется в возрасте (мес.)

- 10-12
- 4-6
- 6-8
- 2-3

755. Выберите правильный ответ

У здорового ребенка грудного возраста над легкими выслушивается дыхание

- пуэрильное
- ослабленное
- жесткое
- везикулярное

756. Выберите правильный ответ

Толщина подкожно-жирового слоя на уровне пупка в раннем возрасте (см)

- 2,0-2,5
- 1,0-2,0
- 0,5-1,0

- 3,0-4,0

757. Выберите правильный ответ

Содержание гемоглобина у ребенка грудного возраста в норме составляет (г/л)

- 110-120
- 120-140
- 140-170
- 170-240

758. Выберите правильный ответ

Особенностями мышечной системы здорового ребёнка первых 3-х месяцев жизни является

- физиологический гипертонус мышц верхних и нижних конечностей
- гипотонус мышц верхних конечностей в сочетании с физиологическим гипертонусом мышц нижних конечностей
- физиологический гипертонус мышц верхних конечностей в сочетании с гипотонусом мышц нижних конечностей
- гипотонус мышц верхних и нижних конечностей

759. Выберите правильный ответ

Артериальный (боталлов проток) соединяет

- легочную артерию и аорту
- пупочную и нижнюю полую вены
- легочную и правую подключичную артерии
- аорту и левую подключичную артерии

760. Выберите правильный ответ

Среднее систолическое артериальное давление (мм.рт.ст.) у детей старше 1 года рассчитывается по формуле (n – возраст в годах)

- $90+2n$
- $90+n$
- $60+2n$
- $100+2n$

761. Выберите правильный ответ

Левая граница относительной тупости сердца у новорожденного расположена

- кнаружи от срединно-ключичной линии на 1-2 см
- по передней подмышечной линии
- по срединно-ключичной линии
- кнутри от срединно-ключичной линии на 1-2 см

762. Выберите правильный ответ

Пуэрильное (усиленное везикулярное) дыхание у детей обусловлено

- тонкой стенкой грудной клетки
- узостью носовых ходов
- широким просветом бронхов
- повышенным кровенаполнением легочной ткани

763. Выберите правильный ответ

Относительная редкость носовых кровотечений у ребенка первого года жизни обусловлена

- недоразвитием кавернозной части подслизистой
- мягкостью хрящей

- отсутствием нижнего носового хода
- сухостью слизистой оболочки

764. Выберите правильный ответ

Особенность легочной ткани у детей раннего возраста

- обильное развитие кровеносных сосудов
- хорошее развитие эластической ткани
- хорошая воздушность легочной ткани
- большой диаметр бронхов

765. Выберите правильный ответ

Стул у здоровых детей старше 1 года

- оформленный
- кашицеобразный
- фрагментированный
- с примесью слизи

766. Выберите правильный ответ

Стул у ребенка на грудном вскармливании до введения прикорма

- золотисто-желтого цвета, с кислым запахом
- имеет примесь слизи и зелени
- оформленный, с гнилостным запахом
- жидкий

767. Выберите правильный ответ

Стул у ребенка на искусственном вскармливании

- бледно-желтый, тусклый, с гнилостным запахом
- имеет кислый запах
- густой, вязкий, клейкий, неоформленный, темно-зеленого цвета
- имеет примесь слизи и зелени

768. Выберите правильный ответ

Режим кормлений новорожденного ребенка

- режим «свободного кормления»
- 6 раз в день
- 5 раз в день
- 4 раза в день

769. Выберите правильный ответ

Кратность кормлений ребенка 3-х мес. в течение суток при грудном вскармливании

- 6 раз в день
- 5 раз в день
- 4 раза в день
- свободный режим кормлений

770. Выберите правильный ответ

Цель проведения контрольного взвешивания ребенка грудного возраста

- определить количества высосанного молока
- определить массу тела
- оценить физическое развитие
- определить необходимый объем питания

771. Выберите правильный ответ

В возрасте 4-х месяцев ребенок должен уметь

- свободно захватывать рукой низко висящие над грудью игрушки
- стучать игрушкой по столу или кровати
- перекладывать игрушку из руки в руку

- захватывать игрушки или другие предметы пальцами

772. Выберите правильный ответ

Для ребенка в возрасте 2-х месяцев характерны следующие показатели нервно-психического развития

- хорошо держит голову, лежа на животе
- комплекс «оживления»
- различает тон, с которым к нему обращаются
- громко смеется

773. Выберите правильный ответ

Для ребенка в возрасте 6-ти месяцев характерны следующие показатели нервно-психического развития

- произносит слоги «ма», «ба» (начало лепета)
- длительно гулит
- подражает разным слогам взрослого
- произносит первые слова-обозначения

774. Выберите правильный ответ

Безусловные рефлексы новорожденного

- ладонно-ротовой рефлекс (рефлекс Бабкина), рефлекс ползания (рефлекс Бауэра)
- рефлекс Хвостека, Труссо
- рефлекс Брудзинского, рефлекс Кернига
- рефлекс Бабинского

775. Выберите правильный ответ

Комплекс «оживления» можно наблюдать у ребенка в возрасте

- 3-х мес.
- 2-х мес.
- 4-х мес.
- 5-ти1 мес.

776. Выберите правильный ответ

Понимание речи можно наблюдать у ребенка в возрасте

- 7 мес.
- 9 мес.
- 5 мес.
- 3 мес.

777. Выберите правильный ответ

Первые упрощенные слова ребенок произносит в возрасте

- 11 мес.
- 9 мес.
- 6 мес.
- 3 мес.

778. Выберите правильный ответ

Первую улыбку в ответ на речь взрослого можно наблюдать у ребенка в возрасте

- 2 мес.
- 3 мес.
- 5 мес.
- 6 мес.

779. Выберите правильный ответ

Безусловный рефлекс новорожденного, возникающий при надавливании на ладони ребенка

у основания большого пальца с последующим открыванием рта

- ладонно-ротовой
- поисковый
- хватательный
- Робинсона

780. Выберите правильный ответ

Безусловный рефлекс новорожденного, возникающий при ударе пальцем по губам ребенка с последующим сокращением круговой мышцы рта и вытягиванием губ

- хоботковый
- тонический
- поисковый
- хватательный

МДК.02.07. Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний акушерско-гинекологического профиля

781. Выберите правильный ответ

Место скопления крови при разрыве маточной трубы

- Дугласово пространство
- передний свод влагалища
- влагалище
- пузырно-маточное пространство

782. Выберите правильный ответ

При трубной беременности менструации

- отсутствуют
- циклические
- ациклические
- нерегулярные

783. Выберите правильный ответ

Основной метод лечения внематочной беременности

- оперативный
- антибактериальная терапия
- консервативный
- проведение детоксикации

784. Выберите правильный ответ

Для эклампсии характерно

- наличие тонических и клонических судорог
- отсутствие судорожного синдрома
- высокая температура
- запах ацетона изо рта

785. Выберите правильный ответ

Причина острой плацентарной недостаточности

- отслойка плаценты
- наличие преэклампсии
- многоводие
- неправильное положение плода

786. Выберите правильный ответ

Для кровотечения при предлежании плаценты характерно

- волнообразность, цвет крови алый, безболезненность
- массивность и длительность
- цвет крови темный
- болезненность

787. Выберите правильный ответ

Клинические признаки предлежания плаценты

- матка мягкая, симметричная, кровь алая
- массивное, длительное кровотечение

сердцебиение плода отсутствует

матка в тонусе, болезненная, асимметричная

788. Выберите правильный ответ

Клинический признак преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты

- тонус матки повышен, асимметрия матки
- сердцебиение плода хорошо прослушивается
- кровотечение отсутствует
- кожные покровы розовые

789. Выберите правильный ответ

Кровотечение в послеродовом периоде чаще обусловлено

- гипотонией матки
- нарушением процессов отделения плаценты и выделения последа
- нарушением системы свертывания крови
- положительный симптом Альфельда

790. Выберите правильный ответ

Клинический признак плотного прикрепления плаценты

- отсутствие признаков отделения плаценты и наличие кровотечения
- крайне отягощенный акушерский анамнез
- отсутствие кровотечения
- положительный симптом Альфельда

791. Выберите правильный ответ

Тактика при плотном прикреплении плаценты

- ручное отделение плаценты
- холод на низ живота
- наружный массаж матки
- применение метода Абуладзе

792. Выберите правильный ответ

Тактика при ущемлении последа

- проведение наружных приемов выделения последа
- проведение наружного массажа
- внутривенное введение окситоцина
- потягивание за пуповину

793. Выберите правильный ответ

Наиболее частая причина кровотечения в раннем послеродовом периоде

- гипотония матки
- нарушение отделения плаценты
- нарушение системы свертывания крови
- разрыв матки

794. Выберите правильный ответ

Для лечения гипотонии матки применяют

- окситоцин
- глюкозу
- аскорбиновую кислоту
- сульфат магния

795. Выберите правильный ответ

Проявление геморрагического шока

- артериальная гипотония
- протеинурия
- брадикардия
- полиурия

796. Выберите правильный ответ

При геморрагическом шоке основные мероприятия направлены на

- восполнение объема циркулирующей крови
- снижение АД
- определение уровня гемоглобина
- исследование функции почек

797. Выберите правильный ответ

Причина возникновения разрывов влагалища в родах

- стремительное течение родов
- вторые роды
- преждевременные роды
- эпизиотомия

798. Выберите правильный ответ

При эклампсии применяют с целью экстренного родоразрешения

- кесарево сечение
- экстракцию плода за тазовый конец
- вакуум-экстракцию плода
- плодоразрушающую операцию

799. Выберите правильный ответ

Физиологическая беременность - это

- физиологический процесс в организме женщин, в результате которого из оплодотворенной яйцеклетки развивается плод
- период созревания яйцеклетки
- время превращения яйцеклетки в зрелый плод
- физиологический процесс созревания оплодотворенной яйцеклетки

800. Выберите правильный ответ

Новый орган при беременности

- плацента
- гипофиз
- надпочечник
- матка

801. Выберите правильный ответ

Во время беременности молочные железы

- увеличиваются и нагрубают
- уменьшаются
- не изменяются
- меняют цвет

802. Выберите правильный ответ

Менструации во время беременности

- отсутствуют
- регулярные
- мажущие выделения
- 1 раз в 3 месяца

803. Выберите правильный ответ

Во время беременности в яичнике

- функционирует жёлтое тело
- зреет фолликул
- происходит овуляция
- ничего не происходит

804. Выберите правильный ответ

Тошнота является признаком беременности

- сомнительным
- вероятным
- достоверным
- обязательным

805. Выберите правильный ответ

Вероятный признак беременности

- задержка месячных
- слюнотечение
- рвота
- вкусовые причуды

806. Выберите правильный ответ

Цианоз слизистой оболочки влагалища и шейки матки относится к группе

- вероятных признаков беременности
- предположительных признаков беременности
- сомнительных признаков беременности
- достоверных признаков беременности

807. Выберите правильный ответ

Увеличение объема живота относят к признаку беременности

- сомнительному объективному
- сомнительному субъективному
- вероятному
- достоверному

808. Выберите правильный ответ

Пигментацию белой линии живота относят к признаку беременности

- сомнительному объективному
- сомнительному субъективному
- вероятному
- достоверному

809. Выберите правильный ответ

Пигментацию наружных половых органов относят к признаку беременности

- сомнительному объективному
- сомнительному субъективному
- вероятному
- достоверному

810. Выберите правильный ответ

Пигментация сосков и околососковых ареол относят к признаку беременности

- сомнительному объективному
- сомнительному субъективному

- вероятному
- достоверному

811. Выберите правильный ответ

Задержка менструации является признаком беременности

- вероятным
- достоверным
- объективным
- предположительным

812. Выберите правильный ответ

Изменение величины (увеличение) матки относят к признаку беременности

- вероятному
- достоверному
- сомнительному субъективному
- сомнительному объективному

813. Выберите правильный ответ

Изменение формы матки относят к признаку беременности

- вероятному
- достоверному
- сомнительному субъективному
- сомнительному объективному

814. Выберите правильный ответ

Сомнительный признак беременности

- изменение аппетита, обонятельных ощущений, тошнота по утрам, неустойчивость настроения
- прекращение месячных, цианоз слизистой влагалища, изменение величины, формы и консистенции матки
- ультразвуковая регистрация изображения плода
- выслушивание сердечных тонов плода

815. Выберите правильный ответ

Вероятный признак беременности

- положительная иммунологическая реакция на беременность
- изменение аппетита, обонятельных ощущений
- тошнота по утрам
- неустойчивость настроения

816. Выберите правильный ответ

Диагностическая проба на беременность основана на определении в моче

- ХГЧ (хорионический гонадотропин человека)
- белка
- ацетона
- лейкоцитов

817. Выберите правильный ответ

Для беременности характерно

- цианоз влагалища
- гиперемия влагалища
- бледность влагалища
- влагалище не изменяется

818. Выберите правильный ответ

Уродства плода чаще возникают при заболевании беременной

- краснухой

- острым трахеитом
- острым ринитом
- аппендицитом

819. Выберите правильный ответ

Наиболее информативный в отношении патологии плода анализ

- кровь на альфа-фетопротеины
- кровь на гемоглобин
- моча на белок
- моча на сахар

820. Выберите правильный ответ

Беременная должна встать на учет в женской консультации до срока беременности

- 12 недель
- 16 недель
- 20 недель
- 6 недель

821. Выберите правильный ответ

Кратность осмотра гинекологом беременной

- не менее 7 раз за беременность
- 1 раз в неделю
- 1 раз в 2 недели
- 3 раза в триместр

822. Выберите правильный ответ

Каждая беременная должна посетить дважды за время наблюдения

- терапевта, окулиста, стоматолога
- венеролога
- кардиолога
- хирурга

823. Выберите правильный ответ

Признак предвестников родов

- отхождение слизистой пробки
- отхождение вод
- схватки через 5-8 минут по 30 секунд
- кровотечение

824. Выберите правильный ответ

Продолжительность нормальной беременности

- 280 дней
- 220 дней
- 340 дней
- 370 дней

825. Выберите правильный ответ

Началом родовой деятельности следует считать

- появление регулярных схваток и сглаживание шейки
- прижатие головки к входу в малый таз
- укорочение шейки
- излитие околоплодных вод

826. Выберите правильный ответ

Высота матки к концу беременности

- 35 см
- 7-8 см
- 20-25 см
- 45-50 см

827. Выберите правильный ответ

Повторнородящие женщины начинают ощущать шевеление плода с

- 18 недель
- 8 недель
- 24 недели
- 30 недель

828. Выберите правильный ответ

Срок беременности, начиная с которого можно пропальпировать головку плода через брюшную стенку

- 24 недели
- 18 недель
- 12 недель
- 30 недель

829. Выберите правильный ответ

Для определения даты родов по формуле нужно от даты начала последних месячных

- отнять три календарных месяца и прибавить 7-10 дней
- отнять 4 месяца
- отнять 4 месяца и прибавить 7-10 дней
- отнять 3 месяца

830. Выберите правильный ответ

Срок беременности, начиная с которого можно выслушать сердцебиение плода акушерским стетоскопом

- 22 недели
- 18 недель
- 12 недель
- 28 недель

831. Выберите правильный ответ

Признаки готовности организма к родам

- наличие «зрелой» шейки матки
- излитие околоплодных вод
- появление регулярных схваток
- вставление головки во вход в малый таз

832. Выберите правильный ответ

Предвестники родов характеризуются

- нерегулярными, малоболезненными схватками в течение 6 часов, переходящими в регулярную родовую деятельность
- сонливостью
- маловодием
- активными потугами

833. Выберите правильный ответ

О начале первого периода родов говорит

- появление регулярных схваток
- головное предлежание плода
- целый плодный пузырь
- повышение АД

834. Выберите правильный ответ

Средняя продолжительность первого периода родов у первородящих составляет

- 14 часов
- 17 часов

9 часов

24 часа

835. Выберите правильный ответ

Второй период родов характеризуется

- полным раскрытием маточного зева и рождением ребенка
- раскрытием маточного зева до 6 см
- рождением последа
- началом регулярной родовой деятельности

836. Выберите правильный ответ

Третий период родов характеризуется

- отделением плаценты и рождением последа
- рождением плода
- раскрытием маточного зева
- регулярной родовой деятельностью

837. Выберите правильный ответ

Для уменьшения болезненности схваток применяют

- спазмолитики
- средства, понижающие АД
- антибиотики
- витамины

838. Выберите правильный ответ

После рождения ребенка следует

- выпустить мочу катетером
- положить лед и груз на матку
- применить наружные приемы отделения последа
- предложить роженице потужиться

839. Выберите правильный ответ

Положением плода называют

- отношение продольной оси плода к продольной оси матки
- отношение крупной части плода к входу в малый таз
- отношение спинки плода передней или задней стенке матки
- отношение плода к правой или левой стороне матки

840. Выберите правильный ответ

Позицией плода называют

- отношение плода к правой или левой стороне матки
- отношение спинки плода передней или задней стенке матки
- отношение крупной части плода к входу в малый таз
- отношение продольной оси плода к продольной оси матки

841. Выберите правильный ответ

Предлежанием плода называют

- отношение крупной части плода к входу в малый таз
- отношение спинки плода передней или задней стенке матки

- отношение продольной оси плода к продольной оси матки
- отношение плода к правой или левой стороне матки

842. Выберите правильный ответ

Отношение спинки плода к передней или задней стенке матки

- вид
- членорасположение
- предлежание
- позиция

843. Выберите правильный ответ

Отношение оси плода к оси матки

- положение
- позиция
- вид
- предлежание

844. Выберите правильный ответ

О начале второго периода родов говорит

- полное открытие и активные потуги
- неправильное положение плода
- появление регулярных схваток
- появления схваток через 3 минуты по 40 секунд

845. Выберите правильный ответ

Продолжительность послеродового периода составляет

- 6 недель
- 9 недель
- 12 недель
- 60 часов

846. Выберите правильный ответ

Оптимальная прибавка массы беременной за 1 неделю

- 350 г
- 50 г
- 30 г
- 700 г

847. Выберите правильный ответ

Бимануальное влагалищное исследование у здоровой беременной в женской консультации производится

- однократно при постановке на учет
- 1 раз за триместр
- при каждой явке в ЖК
- 1 раз в месяц для оценки динамики изменений

848. Выберите правильный ответ

Осмотр в зеркалах и взятие мазков на исследование влагалищной флоры у здоровой беременной проводят в женской консультации

- дважды за беременность
- при каждой явке в ЖК
- однократно при постановке на учет
- только при наличии жалоб

849. Выберите правильный ответ

Анализ мочи для обследования беременной в женской консультации назначается

- к каждой явке
- только при наличии дизурических явлений
- раз в 1-2 месяца
- трижды за беременность

850. Выберите правильный ответ

Трижды за беременность каждая здоровая женщина сдает

- кровь на гемоглобин, СОЭ и лейкоцитоз
- кровь на группу и резус-фактор
- мазки на скрытые инфекции
- мазки на гормональную угрозу

851. Выберите правильный ответ

Осмотр врача-окулиста во время беременности

- необходим всем для оценки зрения и состояния сосудов глазного дна
- обязателен только для женщин после оперативной коррекции зрения
- не обязателен
- обязателен только для только женщин с конъюнктивитом

852. Выберите правильный ответ

Осмотр врача-стоматолога при физиологически протекающей беременности

- проводится всем беременным не менее 2-х раз
- проводится всем беременным ежемесячно
- не обязателен
- обязателен только для беременных с проявлениями кариеса

853. Выберите правильный ответ

Флюорография беременным

- не показана при желанной беременности
- проводится в 1 и 2 половине беременности
- назначается однократно при постановке на учет
- назначается трижды за беременность

854. Выберите правильный ответ

Женщине после родов не рекомендуется жить половой жизнью

- 1,5-2 месяца
- 2 недели
- 3 недели
- 10 дней

855. Выберите правильный ответ

Возможное осложнение при эклампсии беременных

- кровоизлияние в мозг
- внутриутробное инфицирование плода
- пиелонефрит
- пневмония

856. Выберите правильный ответ

Для преэклампсии тяжелой степени характерно

- головная боль, мелькание мушек
- обезвоживание организма
- повышение температуры
- судороги

857. Выберите правильный ответ

Экстренная госпитализация в гинекологический стационар показана

- при перекруте ножки опухоли
- при кандидамикозе
- при гиперплазии эндометрия
- при трихомонадном кольпите

858. Выберите правильный ответ

Основной метод лечения внематочной беременности

- оперативный
- антибактериальный
- консервативный
- применение цитостатиков

859. Выберите правильный ответ

Наличие активного ревматизма

- ухудшает прогноз беременности
- не является фактором риска преэклампсии
- улучшает течение беременности
- не влияет на исход беременности

860. Выберите правильный ответ

Искусственный аборт - прерывание беременности на сроке до

- 12 недель
- 10 недель
- 15 недель
- 8 недель

861. Выберите правильный ответ

Искусственный аборт может вызвать осложнения репродуктивной функции

- бесплодие
- опущение половых органов
- многоводие
- многоплодие

862. Выберите правильный ответ

Потенциальная проблема женщины после искусственного аборта

- бесплодие
- расстройство стула
- нарушение мочеиспускания
- психические расстройства

863. Выберите правильный ответ

Привычный выкидыш - прерывание беременности

- самопроизвольное два и более раз
- на раннем сроке беременности
- по медицинским показаниям
- криминальное

864. Выберите правильный ответ

Симптомы угрожающего выкидыша

- повышение тонуса матки, боли в животе, мажущие кровянистые выделения
- маточное кровотечение
- отсутствие роста матки
- изменение сердцебиения плода

865. Выберите правильный ответ

После самопроизвольного выкидыша рекомендуется применять с целью контрацепции

- КОК
- ВМС
- презерватив
- фарматекс

866. Выберите правильный ответ

Преждевременные роды - роды на сроке (в неделях)

- 22-36 недель 6 дней
- 20-32
- 28-35
- 30-35

867. Выберите правильный ответ

Масса недоношенного плода (грамм)

- до 2500
- 2700
- 5300
- 2600

868. Выберите правильный ответ

Первое шевеление плода первобеременная ощущает в

- двадцать недель
- двадцать две недели
- восемнадцать недель
- шестнадцать недель

869. Выберите правильный ответ

При чисто ягодичном предлежании в родах применяют

- пособие по Цовьянову
- извлечение за тазовый конец
- поворот плода
- ручное классическое пособие

870. Выберите правильный ответ

Слизистая оболочка матки

- эндометрий
- параметрий
- эндотелий
- миометрий

871. Выберите правильный ответ

Анатомически узкий таз определяют

- по прямому размеру плоскости входа в малый таз
- по состоянию крестца
- по форме таза, по толщине костей таза
- по прямому размеру плоскости выхода из малого таза

872. Выберите правильный ответ

Тяжелое осложнение при рвоте беременных

- обезвоживание организма
- запоры
- бессонница
- понижение температуры

873. Выберите правильный ответ

Основной метод лечения рвоты беременных

- инфузионная, седативная и противорвотная терапия
- антибиотики

- ЛФК
- физиотерапия

874. Выберите правильный ответ

Фактор риска развития гипертензивных расстройств при беременности

- заболевания почек
- вторые роды
- возраст первородящей старше 25 лет
- поперечное положение плода

875. Выберите правильный ответ

УЗИ с целью пренатальной диагностики должно проводиться

- трижды: обязательно в 11-14 недель, в 18-21 недели, в 34-37 недель
- однократно в 16-18 недель
- по строгим показаниям
- двукратно в 18-21 недели и 30-34 недели

876. Выберите правильный ответ

Для эклампсии характерно

- наличие тонических и клонических судорог
- запах ацетона изо рта
- высокая температура
- отсутствие судорожного синдрома

877. Выберите правильный ответ

Наиболее информативный метод диагностики миомы матки

- ультразвуковое исследование
- влагалищное исследование
- кольпоскопия
- биопсия

878. Выберите правильный ответ

Для диагностики фоновых заболеваний шейки матки имеет значение

- биопсия с гистологией
- взятие мазка на степень чистоты
- бимануальное исследование
- осмотр шейки в зеркалах

879. Выберите правильный ответ

Аномальные маточные кровотечения у девочек называются

- ювенильными
- климактерическими
- менструальными
- ациклическими

880. Выберите правильный ответ

Эмбриопатии возникают под влиянием повреждающих факторов

- до 8 недель беременности
- после 30 недель
- на любом сроке беременности
- от 16 до 28 недель

881. Выберите правильный ответ

Родовой сертификат заполняется и выдается женщине (одноплодная беременность) при сроке беременности

- 30 недель

- 28 недель
- 32 недели
- свыше 30 недель

882. Выберите правильный ответ

Родовой сертификат заполняется медицинским работником женской консультации при предъявлении женщиной

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, страхового полиса ОМС, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
- страхового полиса обязательного медицинского страхования
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования

883. Выберите правильный ответ

Родовой сертификат работающим женщинам при многоплодной беременности выдается при сроке беременности

- 28 недель
- 30 недель
- 32 недели
- свыше 30 недель

884. Выберите правильный ответ

Родовой сертификат выдается при условии непрерывного наблюдения и ведения женщины на амбулаторно-поликлиническом этапе не менее

- 12 недель
- 16 недель
- 20 недель
- 22 недели

885. Выберите правильный ответ

Роженица должна применять приемы релаксации и способы снятия боли

- поглаживание нижних отделов живота движениями ладоней от средней линии в сторону
- поглаживание обеих рук
- поглаживание стоп
- поглаживание затылка

886. Выберите правильный ответ

Женщины, родившие в машине скорой помощи, поступают в

- наблюдательное родильное отделение
- физиологическое послеродовое отделение
- физиологическое отделение родильного дома
- инфекционную больницу

887. Выберите правильный ответ

Развитию многоплодия чаще всего способствует применение

- ЭКО
- внутриматочной контрацепции
- сохраняющих средств
- барьерной контрацепции

888. Выберите правильный ответ

Для беременности двойней наиболее характерно

- недонашивание
- перенашивание
- развитие крупных плодов
- бурная родовая деятельность

889. Выберите правильный ответ

Беременная с двойней должна быть госпитализирована в родильный дом при нормальном течении беременности

- за 2-3 недели до родов
- в 40 недель
- сразу же после отхождения вод
- с началом срочных родов

890. Выберите правильный ответ

При тазовом предлежании показано

- плановая госпитализация за 2 недели до родов
- плановая операция кесарева сечения
- поворот плода на ножку
- досрочное вскрытие плодного пузыря

891. Выберите правильный ответ

Для преэклампсии характерно

- протеинурия
- лейкоцитурия
- бактериоурия
- пиурия

892. Выберите правильный ответ

Во время беременности патологическими изменениями в анализе крови следует считать

- гемоглобин 96 г/л
- СОЭ 18 мм/час
- СОЭ 12 мм/час
- гемоглобин 124 г/л

893. Выберите правильный ответ

У беременных с инсулинозависимым диабетом во время беременности

- потребность в инсулине повышена
- потребность в инсулине не изменена
- инсулин необходимо отменить
- потребность в инсулине уменьшена

894. Выберите правильный ответ

Пиурия и бактериурия являются у беременной признаками

- пиелонефрита
- преэклампсии
- раннего токсикоза
- диабета

895. Выберите правильный ответ

Для лечения анемии беременных назначают

- ферроплекс и феррум-лек
- фурагин и фуродонин
- фитолизин
- финоптин

896. Выберите правильный ответ

Наиболее высокий риск развития уродства плода возникает в случае заболевания беременной при сроке 13-14 недель

- краснухой
- острым трахеитом
- острым ринитом
- ветряной оспой

897. Выберите правильный ответ

При заболевании беременной сифилисом

- имеется риск врожденного сифилиса у новорожденного
- заболевание не может передаваться плоду
- лечение антибиотиками противопоказано из-за риска осложнений
- роды можно проводить в индивидуальной палате физиологического родильного отделения

898. Выберите правильный ответ

Риск резус-конфликта

- высокий при резус-положительной крови отца и отрицательной у матери
- отсутствует при первой и второй беременности
- отсутствует при резус-положительной крови матери и отрицательной у отца
- уменьшается с каждой беременностью

899. Выберите правильный ответ

Контроль крови на антитела при вероятности резус-конфликта проводится в первую половину беременности

- 1 раз в месяц
- 1 раз в триместр
- 1 раз за беременность
- ежедневно

900. Выберите правильный ответ

С целью профилактики резус-конфликта при второй беременности в течение 72 часов после первых родов или аборта вводят

- иммуноглобулин человека Rho (D)
- антибиотики
- гемостатические средства
- глюкокортикоиды

901. Выберите правильный ответ

Признак начавшейся внутриутробной гипоксии плода

- зеленые околоплодные воды
- частота сердцебиения плода 130 уд/мин
- суковичные выделения
- гемоглобин у матери 102 г/л

902. Выберите правильный ответ

Для выкидыша в ходу характерно

- схваткообразные боли внизу живота, маточное кровотечение
- ноющие боли внизу живота
- кровотечение
- укорочение шейки матки

903. Выберите правильный ответ

Следующая клиническая стадия выкидыша после угрожающего

- в ходу
- неполный
- полный
- инфицированный

904. Выберите правильный ответ

При неполном выкидыше

- показано выскабливание полости матки
- возможно сохранение беременности
- проводится выжидательная тактика
- более рационально лечение в дневном стационаре

905. Выберите правильный ответ

Тактика фельдшера при обращении беременной с угрожающим самопроизвольным выкидышем

- госпитализация в гинекологический стационар
- назначить витаминотерапию
- назначить спазмолитические средства, рекомендовать явку через неделю
- назначить гормональную терапию амбулаторно

906. Выберите правильный ответ

Причина перенашивания беременности

- снижение концентрации эстрадиола
- повышение концентрации эстрадиола
- снижение концентрации прогестерона
- повышение выработки простагландинов

907. Выберите правильный ответ

При перенашивании беременности

- увеличивается процент оперативных вмешательств
- количество вод, как правило, увеличивается
- роды проходят точно также, как и срочные
- невозможны роды через естественные родовые пути

908. Выберите правильный ответ

После зашивания промежности в родах не рекомендуется сидеть

- 2 недели
- 2 дня
- 5 дней
- только при разрыве 3 степени

909. Выберите правильный ответ

Показание к подавлению лактации со стороны матери

- недостаточность кровообращения при болезни сердца
- субинволюция матки
- кесарево сечение
- нежелание женщины кормить ребенка

910. Выберите правильный ответ

При лактостазе показано

- активное кормление и сцеживание
- назначение антибиотиков
- подавление лактации
- УВЧ

911. Выберите правильный ответ

Лечебная физкультура в послеродовом периоде

- рекомендуется всем родильницам при отсутствии противопоказаний
- нецелесообразна
- показана только после кесарева сечения
- противопоказана

912. Выберите правильный ответ

Мини-аборт разрешено проводить при сроке

- 4 недели
- 6 недель
- 8 недель
- до 12 недель

913. Выберите правильный ответ

Прерывание беременности по желанию женщины разрешено, самое позднее в

- 12 недель
- 14 недель
- 16 недель
- 22 недель

914. Выберите правильный ответ

Прерывание беременности по социальным показаниям разрешено до

- 22 недель
- 16 недель
- 12 недели
- 28 недель

915. Выберите правильный ответ

Прерывание беременности по медицинским показаниям для спасения жизни женщины может быть произведено

- в любом сроке беременности
- только до 12 недель
- только до 22 недель
- только до 28 недель

916. Выберите правильный ответ

Болезненное мочеиспускание у беременной свидетельствует о воспалении мочевыводящих путей

- вызвано сдавливанием мочевого пузыря головкой и является нормой в конце беременности
- характерно для нормальной беременности
- является показанием к цистографии

917. Выберите правильный ответ

Беременной назначен прием фурагина и толокнянки из-за

- инфекции мочевыводящих путей
- анемии
- невынашивания
- перенашивания

918. Выберите правильный ответ

Безопасность материнства

- главная задача органов родовспоможения и его сотрудников
- личная проблема женщины
- не является проблемой семьи

не является социальной проблемой

919. Выберите правильный ответ

Наиболее безопасная диагностика плацентарной недостаточности проводится при помощи

- УЗИ и КТГ
- кордоцентеза
- амниоцентеза
- пункции плаценты

920. Выберите правильный ответ

Профилактика привычного невынашивания будет эффективной, если начинать её

- до беременности
- с 1-го триместра беременности
- со 2-го триместра
- с момента взятия женщины на учет по беременности

921. Выберите правильный ответ

Необходимо уделять особое внимание в послеродовом периоде

- профилактике мастита
- профилактике кариеса
- уходу за кожей рук
- психическому состоянию роженицы

922. Выберите правильный ответ

При внебольничных родах родильницу и ребенка

- госпитализируют в наблюдательное отделение с последом
- оставляют дома
- госпитализируют в наблюдательное отделение без последа
- госпитализируют в гинекологическое отделение

923. Выберите правильный ответ

При выявлении гнойного послеродового мастита родильницу необходимо госпитализировать в

- хирургическое отделение больницы
- дневной стационар женской консультации
- инфекционную больницу
- родильный дом общего профиля

924. Выберите правильный ответ

Группа риска женщин по развитию воспалительных заболеваний

- женщины, ведущие беспорядочную половую жизнь
- женщины, работающие в детских учреждениях
- женщины, не живущие половой жизнью
- здоровые женщины

925. Выберите правильный ответ

Барьерный метод контрацепции

- презервативы
- ВМК
- марвелон
- ритм-метод

926. Выберите правильный ответ

Методы контрацепции, обладающие 100% эффективностью

- гормональные методы

барьерные методы

ВМК

физиологические методы

927. Выберите правильный ответ

Тесты функциональной диагностики позволяют определить

- двуфазность менструального цикла
- срок последующей менструации
- наличие беременности
- наличие воспалительного процесса

928. Выберите правильный ответ

Девственницам нельзя проводить

- осмотр в зеркалах
- взятие мазков из уретры
- ректальное исследование
- трансабдоминальное УЗИ

929. Выберите правильный ответ

Исследование молочных желёз

- проводится на каждом профилактическом осмотре
- может проводить только хирург
- может проводить только гинеколог
- может проводить только акушерка

930. Выберите правильный ответ

Для периода менопаузы характерно

- стойкое прекращение менструации в течение 12 месяцев
- снижение эстрадиола и вариабельность менструальных циклов
- повышение гонадотропных гормонов на фоне задержки менструации
- отсутствие менструации в течение 6 месяцев

931. Выберите правильный ответ

Кровомазанье в менопаузе чаще всего свидетельствуют о

- раке эндометрия
- воспалении матки
- беременности
- нормальной менструации

932. Выберите правильный ответ

Мастопатия

- гормонозависимое распространенное заболевание молочных желез
- рак молочной железы
- операция удаления молочной железы
- послеродовый мастит

933. Выберите правильный ответ

Брак считается бесплодным, если

- в течение 1 года при регулярной половой жизни не наступает беременность
- беременность не наступает в течение 6 месяцев
- беременность не наступает в течение 3 месяцев
- беременность не наступает в течение 1,5-2 года

934. Выберите правильный ответ

Основной симптом рака эндометрия

- кровянистые выделения из половых путей в постменопаузе
- анемия

- слизистые выделения из половых путей
- схваткообразные боли внизу живота

ПМ.03. Осуществление медицинской реабилитации и абилитации

МДК.03.01. Проведение мероприятий по медицинской реабилитации и абилитации

935. Выберите правильный ответ

Восстановление здоровья, функционального состояния и трудоспособности, нарушенных болезнями, травмами или физическими, химическими и социальными факторами

- реабилитация
- адаптация
- реадаптация
- реструктуризация

936. Выберите правильный ответ

Медицинская реабилитация - вид реабилитации, направленный

- на восстановление нарушенных функций или проведение лечебных и корректирующих мероприятий, приспособляющих инвалида к жизни и общественно полезной деятельности
- на выработку активной жизненной позиции и положительной установки у инвалида, в основном средствами психотерапии
- на профессиональную подготовку и переподготовку, обеспечение условий труда, отвечающих состоянию здоровья
- на восстановление способности инвалида к самостоятельной общественной и семейно-бытовой деятельности

937. Выберите правильный ответ

Психологическая реабилитация - вид реабилитации, направленный

- на выработку активной жизненной позиции и положительной установки у инвалида, в основном средствами психотерапии
- на восстановление нарушенных функций или проведение лечебных и корректирующих мероприятий, приспособляющих инвалида к жизни и общественно полезной деятельности
- на профессиональную подготовку и переподготовку, обеспечение условий труда, отвечающих состоянию здоровья
- на восстановление способности инвалида к самостоятельной общественной и семейно-бытовой деятельности

938. Выберите правильный ответ

Профессиональная реабилитация - вид реабилитации, направленный

- на профессиональную подготовку и переподготовку, обеспечение условий труда, отвечающих состоянию здоровья
- на восстановление нарушенных функций или проведение лечебных и корректирующих

мероприятий, приспособляющих инвалида к жизни и общественно полезной деятельности

- на выработку активной жизненной позиции и положительной установки у инвалида, в основном средствами психотерапии
- на восстановление способности инвалида к самостоятельной общественной и семейно-бытовой деятельности

939. Выберите правильный ответ

Социальная реабилитация - вид реабилитации, направленный

- на восстановление способности инвалида к самостоятельной общественной и семейно-бытовой деятельности
- на профессиональную подготовку и переподготовку, обеспечение условий труда, отвечающих состоянию здоровья
- на выработку активной жизненной позиции и положительной установки у инвалида, в основном средствами психотерапии
- на восстановление нарушенных функций или проведение лечебных и корректирующих мероприятий, приспособляющих инвалида к жизни и общественно полезной деятельности

940. Выберите правильный ответ

Виды реабилитации инвалидов

- медицинская, профессиональная, комплексная, частичная
- полная, частичная
- трудовая, профессиональная, полная, частичная
- медицинская, психологическая, профессиональная, социальная

941. Выберите правильный ответ

Социально-бытовая адаптация как направление социальной реабилитации

- мероприятия, направленные на формирование привыкания пациента к бытовым условиям при изменившихся возможностях
- мероприятия, направленные на интеграцию пациента в новую или прежнюю социальную среду
- мероприятия, направленные на профориентацию и переподготовку или обучение новой профессии, соответствующей новым возможностям
- мероприятия, направленные на выработку активной жизненной позиции

942. Выберите правильный ответ

Профессиональная адаптация как направление социальной реабилитации

мероприятия, направленные на профориентацию и переподготовку или обучение новой профессии, соответствующей новым возможностям

мероприятия, направленные на формирование привыкания пациента к бытовым условиям при изменившихся возможностях

мероприятия, направленные на интеграцию пациента в новую или прежнюю социальную среду

мероприятия, направленные на выработку активной жизненной позиции

943. Выберите правильный ответ

Показатель уровня инвалидизации населения

инвалидность вследствие общего заболевания

инвалидность с детства

инвалидность вследствие профессионального заболевания

первичная инвалидность

944. Выберите правильный ответ

Реабилитация - это

координированное применение медицинских, социальных, педагогических и профессиональных мероприятий в целях подготовки индивидуума на оптимум трудоспособности

смещение акцентов в системе взглядов на здоровье в пользу восстановления максимальной функциональной активности

профилактика заболеваний и неблагоприятных реакций здорового организма

сохранение общественного сектора здравоохранения

945. Выберите правильный ответ

Показанием для направления детей на курорты и в местные санатории относятся

хронические заболевания в стадии стойкой ремиссии

все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и осложненные острогнойными процессами

злокачественные новообразования

острые и инфекционные заболевания до окончания срока изоляции

946. Выберите правильный ответ

Изометрические физические упражнения - это упражнения, при которых происходит

напряжение и расслабление мышц без изменения их длины

чередование сокращения и расслабления мышц с изменением их длины

снятие состояния патологического возбуждения нервных центров

сокращение и расслабление мышц, незаметные для выполняемого

947. Выберите правильный ответ

Идеомоторные физические упражнения - это упражнения, при которых происходит

сокращение и расслабление мышц, незаметные для выполняемого

чередование сокращения и расслабления мышц с изменением их длины

снятие состояния патологического возбуждения нервных центров

напряжение и расслабление мышц без изменения их длины

948. Выберите правильный ответ

Релаксационные физические упражнения - это упражнения, при которых происходит

снятие состояния патологического возбуждения нервных центров

чередование сокращения и расслабления мышц с изменением их длины

напряжение и расслабление мышц без изменения их длины

сокращение и расслабление мышц, незаметные для выполняемого

949. Выберите правильный ответ

Активные физические упражнения выполняются

самим пациентом на снарядах, без снарядов, со снарядами

медицинской сестрой при пассивном состоянии пациента

самим пациентом на снарядах, без снарядов, со снарядами с помощью инструктора

медицинской сестрой при отсутствии нервно-мышечной проводимости у пациента

950. Выберите правильный ответ

Пассивные динамические упражнения выполняются

медицинской сестрой при пассивном состоянии пациента

самим пациентом на снарядах, без снарядов, со снарядами

самим пациентом на снарядах, без снарядов, со снарядами с помощью инструктора

медицинской сестрой при отсутствии нервно-мышечной проводимости у пациента

951. Выберите правильный ответ

Релаксационные физические упражнения направлены на выработку у пациентов умения

расслабить скелетную мускулатуру

увеличить силу скелетной мускулатуры

повысить тонус скелетной мускулатуры

увеличить объем скелетной мускулатуры

952. Выберите правильный ответ

Дренажные исходные положения используются для

стимуляции оттока из патологического легкого

активизации общего кровообращения

улучшения кровотока легких

увеличения мышечной массы тела

953. Выберите правильный ответ

Техническая особенность выполнения приема массажа поглаживания

- скольжение по коже без ее смещения
- скольжение со смещением по коже
- воздействие на отдаленные ткани и органы
- растяжение кожных покровов

954. Выберите правильный ответ

Техническая особенность выполнения приема массажа растирания

- движение по коже со смещением ее
- скольжение по коже без ее смещения
- воздействие на отдаленные ткани и органы
- растяжение кожных покровов

955. Выберите правильный ответ

Массаж верхней конечности по классической методике начинают с

- пальцев рук
- плеча
- плечевого сустава
- лопатки

956. Выберите правильный ответ

Массаж нижней конечности начинают с

- задней поверхности
- передней поверхности
- боковой наружной поверхности
- боковой внутренней поверхности

957. Выберите правильный ответ

Физиотерапия - метод лечения

- природный
- фармакологический
- хирургический
- реанимационный

958. Выберите правильный ответ

Ежедневное количество физиопроцедур не более

- двух
- трех
- четырех
- одной

959. Выберите правильный ответ

Хорошо проводит электрический ток

- кровь
- кость
- кожа
- жировая ткань

960. Выберите правильный ответ

Показание к УВЧ-терапии

- острый воспалительный процесс
- выраженная гипотония
- спаечный процесс
- склонность к кровоточивости

961. Выберите правильный ответ

Бальнеотерапия

- лечение минеральной водой
- лечение климатом
- лечение водными процедурами
- грязелечение

962. Выберите правильный ответ

Технические средства реабилитации

- средства для самообслуживания, протезные средства
- физиотерапевтическая аппаратура
- оснащение рабочего места массажиста
- оснащение кабинета ЛФК

963. Выберите правильный ответ

Терренкур

- лечение дозированным восхождением
- ходьба по трафарету
- ходьба перед зеркалом
- прогулки по ровной местности

964. Выберите правильный ответ

В условиях детского санатория осуществляется

- поздняя реабилитация, ликвидация остаточных явлений заболевания
- усиленная профессиональная и спортивная подготовка
- обслуживание детей-инвалидов, воспитание и обучение в специальных учреждениях
- организация соответствующего возрасту режима, ухода за ребёнком инвалидом (социальная помощь, вспомогательные технические средства)

965. Выберите правильный ответ

Ребёнку перед направлением на санаторно-курортное лечение необходимо

- санировать очаги инфекции
- лечение в стационаре
- посетить логопеда
- проконсультироваться у психолога

966. Выберите правильный ответ

Ребёнку перед направлением на санаторно-курортное лечение необходимо

- клинико-лабораторное обследование
- лечение в стационаре
- приобретение путевки
- проконсультироваться у психолога

967. Выберите правильный ответ

Перед направлением на санаторно-курортное лечение необходимо оформить документы

- санаторно-курортную карту
- справку с места жительства
- этапный эпикриз
- историю болезни

968. Выберите правильный ответ

Основанием для признания ребенка инвалидом является

- нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленных заболеванием, последствиями травм или дефектами; ограничение жизнедеятельности, необходимость осуществления мер социальной защиты
- ограничение жизнедеятельности, необходимость осуществления мер социальной защиты
- нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленных заболеванием,

последствиями травм или дефектами, необходимость осуществления мер социальной защиты

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленных заболеванием, последствиями травм или дефектами, ограничение жизнедеятельности

969. Выберите правильный ответ

Признание ребенка инвалидом осуществляется

учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы (бюро МСЭ) по месту жительства

детской поликлиникой по месту жительства

областной (краевой) детской больницей

образовательным учреждением

970. Выберите правильный ответ

Определение факта и причин инвалидности

ребенка передано в компетенцию

медико-социальной экспертизы

общеобразовательных учреждений

комиссии по делам несовершеннолетних

центров социального обслуживания населения

971. Выберите правильный ответ

При установлении инвалидности, возникшей в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, ребенку до 18 лет устанавливается

категория «ребенок-инвалид»

I группа инвалидности

II группа инвалидности

III группа инвалидности

972. Выберите правильный ответ

Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида включает

медицинскую, психолого-педагогическую, социальную реабилитации, технические средства и услуги по реабилитации

психолого-педагогическую, социальную реабилитации, технические средства и услуги по реабилитации

медицинскую, социальную реабилитации, технические средства и услуги по реабилитации

медицинскую, психолого-педагогическую, социальную реабилитации

973. Выберите правильный ответ

Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на период до

18 лет

16 лет

12 лет

7 лет

974. Выберите правильный ответ

Паллиативная помощь

система мероприятий, направленных на поддержание качества жизни пациентов с неизлечимыми, угрожающими жизни и тяжело протекающими заболеваниями

медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента

медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента

медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий

975. Выберите правильный ответ

Паллиативное лечение - это лечение и уход в период

когда болезнь уже не поддается лечению

восстановления утраченных функций

всей болезни

выздоровления

976. Выберите правильный ответ

Основная цель оказания паллиативной медицинской помощи

эффективное и своевременное избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания

восстановление нарушенных функций или проведение лечебных и корректирующих мероприятий, приспособляющих инвалида к жизни

раннее выявление онкологических заболеваний

оказание реабилитационной помощи пациентам на базе санаторно-курортных учреждений

977. Выберите правильный ответ

Основная цель паллиативной помощи

все пациенты, которые в ней нуждаются, должны ее получить

лечить всех без исключения

тот, кто хочет, тот помощь и получает

в здоровом теле здоровый дух

978. Выберите правильный ответ

Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается

в кабинетах паллиативной помощи и выездными патронажными службами паллиативной медицинской помощи

на врачебном участке

в офисах семейного врача

в хосписах

979. Выберите правильный ответ

Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается

в отделениях паллиативной помощи, хосписах

в кабинетах паллиативной помощи и выездными патронажными службами паллиативной медицинской помощи

в хирургических отделениях стационаров

в терапевтических отделениях стационаров

980. Выберите правильный ответ

Главная задача паллиативной помощи

- купирование боли и других симптомов, а также решение психологических, социальных и духовных проблем пациентов и их родственников
- симптоматическая терапия хронических соматических заболеваний
- клиническая апробация новых обезболивающих препаратов у онкологических больных
- применение цитостатических препаратов у онкологических больных

981. Выберите правильный ответ

К задачам паллиативной помощи относятся

- адекватное обезболивание и купирование других физических симптомов
- осуществление эвтаназии
- проведение физиотерапевтических процедур
- помещение больных в специализированные учреждения

982. Выберите правильный ответ

Конечная цель паллиативной помощи

- улучшение качества жизни
- выздоровление
- полная реабилитация
- выведение в ремиссию

983. Выберите правильный ответ

Компоненты паллиативной помощи

- медицинская помощь и уход
- высокотехнологичная медицинская помощь
- реабилитационные мероприятия
- санаторно-курортное лечение

984. Выберите правильный ответ

Паллиативную помощь инкурабельным больным оказывает

- хоспис
- госпиталь ветеранов войн
- медико-санитарная часть
- клиническая больница

985. Выберите правильный ответ

Хоспис

- лечебное учреждение для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным (преимущественно онкологическим) в последней стадии
- учреждение для оказания социальной помощи пожилым пациентам
- медицинское учреждение, оказывающее помощь инвалидам на дому
- онкологическая клиника

986. Выберите правильный ответ

Хосписная помощь - это

- вариант паллиативной помощи
- вариант эвтаназии
- философское учение
- метод исследования в диетологии

987. Выберите правильный ответ

В основании концепции хосписа заложена идея

- паллиативной помощи

- локализации всех больных в одном месте
- изоляции больных
- помощи родственникам больного

988. Выберите правильный ответ

Система и процесс формирования отсутствующих у инвалида способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности

- абилитация
- реабилитация
- первичная профилактика
- вторичная профилактика

989. Выберите правильный ответ

Цель абилитации

- формирование отсутствующих у инвалида способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности
- восстановление способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности
- поддержание структурно-функциональной целостности пораженных органов и тканей
- профилактика осложнений

990. Выберите правильный ответ

Цель реабилитации инвалидов

- социальная интеграция больного, который является объектом реабилитации
- профилактика различных заболеваний
- поддержание структурно-функциональной целостности пораженных органов и тканей
- сохранение жизни и поддержание структурно-функциональной целостности пораженных органов и тканей

991. Выберите правильный ответ

Первый этап медицинской реабилитации

- лечебно-щадящий (госпитальный)
- функционально-тренирующий (амбулаторно-поликлинический)
- этап активного восстановления функций (санаторно-курортный)
- лечебно-тренирующий

992. Выберите правильный ответ

Комплексная реабилитационная программа содержит

- перечень методик и сроки текущего, заключительного медицинского контроля
- объективные параметры функционального состояния и научного сопоставления реально достигнутого результата с ожидаемым результатом
- методы оценки систем жизнеобеспечения организма
- сроки восстановления функции у больных

993. Выберите правильный ответ

Первый этап медицинской реабилитации проводят

- в специализированных лечебных и реабилитационных отделениях стационаров
- в региональных центрах медицинской реабилитации
- в реабилитационных центрах поликлиник

в санаториях соответствующего медицинского профиля

994. Выберите правильный ответ

Очередность этапов медицинской и психологической реабилитации

- очередность не имеет значения
- экстренный, стационарный, санаторный, амбулаторно-поликлинический
- санаторный, амбулаторно-поликлинический, стационарный, экстренный
- амбулаторно-поликлинический, экстренный, стационарный, санаторный

995. Выберите правильный ответ

Основные задачи амбулаторно-поликлинического этапа реабилитации

- диспансерное динамическое наблюдение, проведение вторичной профилактики, рациональное трудоустройство пациентов и поддержание или улучшение их трудоспособности
- прогнозирование и анализ возможных патологических состояний в соответствующих ситуациях, разработка комплекса мероприятий
- формирование у пациента и его родственников адекватного представления о болезни или травме
- определение адекватного лечебно-двигательного режима

996. Выберите правильный ответ

ЛФК используется на этапах реабилитации

- на всех этапах реабилитации
- только на поликлиническом
- на поликлиническом и санаторном
- на госпитальном и санаторном

997. Выберите правильный ответ

Социальная реабилитация - это

- мероприятия для устранения социальной недостаточности
- материальная компенсация
- мероприятия для компенсации нарушений здоровья
- профилактика различных заболеваний

998. Выберите правильный ответ

Санаторно-курортное лечение показано в период заболевания

- ремиссии
- острый
- ранний период реконвалесценции
- хронического течения

999. Выберите правильный ответ

При пониженной секреции желудка минеральную воду принимают до приема пищи

- за 10-15 минут
- за 30-40 минут
- за 45-60 минут
- за 1-1,5 часа

1000. Выберите правильный ответ

При повышенной секреторной функции желудка минеральную воду принимают перед приемом пищи

- за 1-1,5 часа
- за 10-15 минут
- за 30-40 минут
- за 1,5-2 часа

1001. Выберите правильный ответ

Характеристика, определяющая наиболее высокую дозу физической нагрузки

- сложность координации движения
- исходное положение
- амплитуда движения
- количество повторения

1002. Выберите правильный ответ

Лечебная физкультура - это

- применение средств физической культуры для воздействия на больного человека с целью профилактики и лечения его заболевания
- применение физических упражнений
- трудотерапия
- физические упражнения в воде

1003. Выберите правильный ответ

Основное действие лечебной физкультуры

- тренирующее
- противовоспалительное
- гипотензивное
- иммуностимулирующее

1004. Выберите правильный ответ

Специальные физические упражнения

- избирательно воздействуют на ту или иную часть (сегмент) опорно-двигательного аппарата
- оздоравливают и укрепляют весь организм
- развивают подвижность в суставах
- укрепляют мышцы, окружающие сустав

1005. Выберите правильный ответ

Общеукрепляющие физические упражнения

- оздоравливают и укрепляют весь организм
- избирательно воздействуют на ту или иную часть (сегмент) опорно-двигательного аппарата
- развивают подвижность в суставах
- укрепляют мышцы, окружающие сустав

1006. Выберите правильный ответ

Физическая нагрузка должна быть

- адекватной состоянию больного и его возможностям
- ниже функциональных возможностей больного
- выше функциональных возможностей больного
- любой

1007. Выберите правильный ответ

Подбор физических упражнений осуществляется с учетом

- принципа постепенности - от простого к сложному, а также особенностей течения болезни и уровня физической подготовленности больного
- пожеланий больного

- пожеланий родственников больного
- принципа – от сложного к простому

1008. Выберите правильный ответ

Динамические физические упражнения - это упражнения, при которых происходит

- чередование сокращения и расслабления мышц с изменением их длины
- напряжение и расслабление мышц без изменения их длины
- снятие состояния патологического возбуждения нервных центров
- сокращение и расслабление мышц, незаметные для выполняемого

1009. Выберите правильный ответ

При недержании мочи у женщин в ночные часы желательно использовать

- памперсы
- резиновое судно
- металлическое судно
- съемный мочеприемник

1010. Выберите правильный ответ

Трещины на губах можно обработать

- вазелином
- 5% раствором перманганата калия
- 3% раствором перекиси водорода
- 70% спиртом

1011. Выберите правильный ответ

Протирание ресниц и век следует осуществлять

- от наружного угла глаза к внутреннему углу
- от внутреннего угла глаза к наружному
- снизу-вверх
- круговыми движениями

1012. Выберите правильный ответ

Признаком наличия боли может быть

- напряженный лоб, в частности появление на нем глубоких морщин
- сонливость
- прекращение приема пищи
- беспокойство

1013. Выберите правильный ответ

О том, что у ребёнка в данный момент нет боли, свидетельствует

- ребёнок спит
- у ребёнка нормальное артериальное давление
- у ребёнка нормальная частота дыхания
- ребёнок говорит, что у него ничего не болит

1014. Выберите правильный ответ

Больные попадают в хоспис

- по направлению лечащего врача онкодиспансера или районного онколога по месту жительства
- самостоятельно
- при госпитализации скорой медицинской помощи
- по рекомендациям знакомых

1015. Выберите правильный ответ

Паллиативную помощь оказывают при

- неизлечимых заболеваниях
- острых заболеваниях
- заболеваниях детского возраста
- при хронических заболеваниях в стадии обострения

1016. Выберите правильный ответ

Оказание паллиативной помощи требуется пациентам

- со злокачественными новообразованиями IV стадии
- с бронхиальной астмой
- с сахарным диабетом
- с хронической сердечной недостаточностью

1017. Выберите правильный ответ

Паллиативная помощь в онкологии

- подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшиеся с проблемами онкологии путем предотвращения и облечению раннему выявлению
- подход, позволяющий ухудшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшиеся с проблемами онкологии путем предотвращения и облечению раннему выявлению
- научный подход, позволяющий уйти от жизни
- научный подход, позволяющий уйти от жизни путем жизненного ожидания

1018. Выберите правильный ответ

Перемещение пациента в постели через каждые 2 часа обеспечивает

- профилактику пролежней
- мероприятия по уходу
- нагрузку на позвоночник
- профилактику опрелостей

1019. Выберите правильный ответ

Препарат, используемый для обработки глаз тяжелобольного

- фурацилин
- перекись водорода
- пливасепт
- глицерин

1020. Выберите правильный ответ

Признак пролежня второй стадии

- пузырь
- отек, краснота
- бледность
- язва

1021. Выберите правильный ответ

Признак пролежня первой стадии

- отек, краснота
- бледность
- пузырь
- язва

1022. Выберите правильный ответ

Признак пролежня третьей стадии

- язва

- отек, краснота
- пузырь
- поражение кожи и глубжележащих тканей

1023. Выберите правильный ответ

Места образования пролежней при положении пациента на спине

- область крестца, пятки, лопатки, затылок
- область тазобедренного сустава (большого вертела), лодыжки
- ребра, колени, гребни подвздошных костей, пальцы ног
- седалищные бугры и ягодицы, стопы

1024. Выберите правильный ответ

Места вероятного образования пролежней

- остистые отростки позвонков
- паховые области
- подмышечные впадины
- локтевые сгибы

1025. Выберите правильный ответ

Места образования пролежней при положении пациента на животе

- ребра, колени, гребни подвздошных костей, пальцы ног
- область тазобедренного сустава (большого вертела), лодыжки
- седалищные бугры и ягодицы, стопы
- область крестца, пятки, лопатки, затылок

1026. Выберите правильный ответ

Места образования пролежней при положении пациента сидя

- седалищные бугры и ягодицы, стопы
- область тазобедренного сустава (большого вертела), лодыжки
- ребра, колени, гребни подвздошных костей, пальцы ног
- область крестца, пятки, лопатки, затылок

1027. Выберите правильный ответ

Место наиболее вероятного образования опрелостей

- подмышечные впадины
- затылок
- лопатки
- остистые отростки позвонков

1028. Выберите правильный ответ

Место наиболее вероятного образования опрелостей

- паховая область
- затылок
- крестец
- лодыжки

1029. Выберите правильный ответ

Факторы, способствующие образованию пролежней

- крошки и мелкие предметы в постели
- высокобелковое питание
- частая смена положения в постели

- обильное питье

1030. Выберите правильный ответ

Факторы, способствующие образованию пролежней

- длительное пребывание больного в одном положении
- психическая травма
- обильное питье
- белковое питание

1031. Выберите правильный ответ

Факторы, способствующие образованию пролежней

- недержание мочи и кала
- высокобелковое питание
- частая смена положения в постели
- обильное питье

1032. Выберите правильный ответ

Действия медицинского персонала хосписа при отказе больного от пищи и воды

- увлажнение губ пациента
- насильственное кормление
- внутривенное введение 5% раствора глюкозы
- внутривенное капельное введение физиологического раствора

1033. Выберите правильный ответ

Недопустимый принцип паллиативного ухода

- применение агрессивного лечения и осуществление эвтаназии
- оказание психологической поддержки
- облегчение боли, устранение страданий и других тягостных симптомов
- оказание поддержки семье на последнем этапе жизни больного и после его смерти

1034. Выберите правильный ответ

В России эвтаназия

- запрещена
- проводится при терминальных стадиях онкологических заболеваний
- возможна по просьбе больного
- возможна по просьбе родственников

1035. Выберите правильный ответ

Ведущей характеристикой в синдроме боли является

- интенсивность
- локализация
- иррадиация
- длительность

1036. Выберите правильный ответ

Возбуждение и беспокойное поведение больного, сопровождающееся стонами и гримасами, свидетельствует о

- физической боли
- постепенном угасании сознания
- душевной боли
- депрессии

1037. Выберите правильный ответ

- Инструмент для оценки боли
- цифровая оценочная шкала
 - пульсоксиметр
 - пикфлоуметр
 - термометр

1038. Выберите правильный ответ

Основная группа препаратов на первой ступени обезболивающей терапии

- ненаркотические анальгетики
- препараты кодеина
- препараты морфина
- антидепрессанты

1039. Выберите правильный ответ

Лекарственные препараты, используемые при фармакотерапии хронической боли

- опиоидные и неопиоидные анальгетики
- спазмолитики
- антигистаминные препараты
- антидепрессанты

1040. Выберите правильный ответ

Для облегчения страданий больного в хосписах используется

- обезболивание
- гипноз
- эвтаназия
- иглорефлексотерапия

1041. Выберите правильный ответ

Первая реакция больного при постановке ему диагноза incurable заболевания

- отрицание («не так»)
- просьба об отсрочке («не сейчас»)
- протест («почему я?»)
- депрессия

1042. Выберите правильный ответ

К понятию «горевание» относятся первичные эмоциональные реакции на

- личную утрату, понятие «горевание» связывается со смертью близких людей
- утрату физического здоровья
- утрату трудоспособности
- экономические трудности

1043. Выберите правильный ответ

Первая стадия «горевания», связанная со смертью близкого человека

- стадия шока
- стадия отрицания
- стадия агрессии
- стадия депрессии

1044. Выберите правильный ответ

Вторая стадия «горевания», связанная со смертью близкого человека

- стадия отрицания
- стадия шока
- стадия агрессии
- стадия депрессии

1045. Выберите правильный ответ

Третья стадия «горевания», связанная со смертью близкого человека

- стадия агрессии
- стадия отрицания
- стадия шока
- стадия депрессии

1046. Выберите правильный ответ

Четвертая стадия «горевания», связанная со смертью близкого человека

- стадия депрессии
- стадия отрицания
- стадия агрессии
- стадия шока

1047. Выберите правильный ответ

Наиболее частая причина смерти больных СПИДом

- оппортунистические инфекции
- острое нарушение мозгового кровообращения
- острая коронарная недостаточность
- почечная недостаточность

1048. Выберите правильный ответ

Страх смерти - проблема

- психологическая
- физическая
- социальная
- духовная

1049. Выберите правильный ответ

Постельное белье тяжелобольному пациенту меняют

- по мере загрязнения
- один раз в 2 недели
- один раз в неделю
- один раз в 3 дня

1050. Выберите правильный ответ

Больному со спастическим запором применяют клизму

- масляную
- обычную очистительную
- сифонную
- гипертоническую

1051. Выберите правильный ответ

К жизнеподдерживающему лечению относится

- купирование тягостных симптомов
- искусственная вентиляция легких, экстракорпоральный диализ с помощью аппарата «искусственная почка», искусственное питание
- обезболивание
- психологическая поддержка

1052. Выберите правильный ответ

Для проведения искусственного кормления пациента используется

- тонкий желудочный зонд
- катетер
- поильник
- десертная ложка

1053. Выберите правильный ответ

- Ежедневный уход за стомой кишечника
- уход за кожей вокруг стомы
 - исключение из рациона низкокалорийных продуктов
 - постановка очистительной клизмы
 - постановка лекарственной клизмы

1054. Выберите правильный ответ

Положение Фаулера

- промежуточное полулежа/полусидя

- лежа на животе
- лежа на спине
- промежуточное - лежа на боку/лежа на животе

1055. Выберите правильный ответ

Положение Симса

- промежуточное – лежа на боку/лежа на животе
- лежа на животе
- промежуточное полулежа/полусидя
- лежа на спине

ПМ.04. Осуществление профилактической деятельности

МДК.04.01. Основы профилактики

1056. Выберите правильный ответ

Здоровье человека - это

- состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма
- деятельность, активность людей, направленные на сохранение и улучшения здоровья
- отсутствие болезней
- отсутствие факторов риска

1057. Выберите правильный ответ

Соматическое здоровье - это

- текущее состояние органов и систем органов человеческого организма
- состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию
- мера социальной активности, трудоспособности, форма активного деятельного отношения к жизни
- ожидаемая частота развития заболеваний

1058. Выберите правильный ответ

Психическое здоровье - это

- состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию
- текущее состояние органов и систем органов человеческого организма
- мера социальной активности, трудоспособности, форма активного деятельного отношения к жизни
- ожидаемая частота развития заболеваний

1059. Выберите правильный ответ

Социальное здоровье - это

- мера социальной активности, трудоспособности, форма активного деятельного отношения к жизни
- текущее состояние органов и систем органов человеческого организма
- состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию
- ожидаемая частота развития заболеваний

1060. Выберите правильный ответ

Универсальный интегрированный показатель здоровья населения

- средняя продолжительность предстоящей жизни
- рождаемость
- смертность
- естественный прирост (убыль)

1061. Выберите правильный ответ

Первичная медико-санитарная помощь - система оказания медицинской помощи, включающая мероприятия

- по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию ЗОЖ и санитарно-гигиеническому просвещению населения
- по оказанию специализированной медицинской помощи
- по оказанию экстренной медицинской помощи при заболеваниях и состояниях, угрожающих жизни больного
- направленные на улучшение качества жизни безнадежно больных с целью избавления от боли и облегчения других проявлений болезни

1062. Выберите правильный ответ

Первичная медико-санитарная помощь ориентирует пациента в вопросах здоровья на

- личную ответственность
- пассивное восприятие
- общественное сознание
- ответственность медицинского работника

1063. Выберите правильный ответ

Удельный вес здравоохранения среди факторов, участвующих в формировании здоровья населения

- 10%
- 20%
- 30%
- 40%

1064. Выберите правильный ответ

Наибольшее значение для сохранения здоровья человека имеет

- образ жизни

- здравоохранение
- генетика
- экология

1065. Выберите правильный ответ

Социальный фактор, оказывающий влияние на здоровье

- обычаи (традиции)
- климат
- политика
- здравоохранение

1066. Выберите правильный ответ

Биологические факторы состояния здоровья

- возраст, пол, наследственность, конституция
- загрязнение внешней среды
- климат, природа, географические условия
- образ жизни людей

1067. Выберите правильный ответ

Индивидуальное здоровье

- здоровье отдельного человека
- здоровье малых социальных групп
- здоровье работающего населения
- здоровье городского населения

1068. Выберите правильный ответ

Общественное здоровье

- здоровье населения в целом и отдельных его групп
- здоровье отдельного человека
- здоровье работающего населения
- здоровье городского населения

1069. Выберите правильный ответ

Главным учреждением системы учреждений службы медицинской профилактики

- Федеральный НИИ медицинских проблем формирования здоровья МЗ РФ
- Главное управление здравоохранения области
- Центр здоровья
- Министерство здравоохранения

1070. Выберите правильный ответ

Диспансеризация

- активное динамическое наблюдение за состоянием здоровья людей с целью раннего выявления заболеваний и оздоровление больных с хроническими заболеваниями
- выявление инфекционных заболеваний
- наблюдение за состоянием внешней среды
- оказание неотложной помощи

1071. Выберите правильный ответ

Предварительные медицинские осмотры

- медицинские осмотры при поступлении на работу или учебу
- динамическое наблюдение за состоянием здоровья работающих в условиях воздействия профессиональных вредностей
- медицинские осмотры для обнаружения ранних форм социально-значимых заболеваний

- массовое обследование населения и выявление лиц с заболеваниями или начальными признаками заболеваний

1072. Выберите правильный ответ

Периодические медицинские осмотры

- динамическое наблюдение за состоянием здоровья различных групп населения с целью своевременного выявления начальных форм заболеваний
- динамическое наблюдение за состоянием здоровья работающих в условиях воздействия профессиональных вредностей
- медицинские осмотры для обнаружения ранних форм социально-значимых заболеваний
- медицинские осмотры при поступлении на работу или учебу

1073. Выберите правильный ответ

Целевые медицинские осмотры

- медицинские осмотры для обнаружения ранних форм социально-значимых заболеваний
- динамическое наблюдение за состоянием здоровья работающих в условиях воздействия профессиональных вредностей
- медицинские осмотры при поступлении на работу или учебу
- массовое обследование населения и выявление лиц с заболеваниями или начальными признаками заболеваний

1074. Выберите правильный ответ

Скрининг - это

- массовое обследование населения и выявление лиц с заболеваниями или начальными признаками заболеваний
- динамическое наблюдение за состоянием здоровья работающих в условиях воздействия профессиональных вредностей
- медицинские осмотры при поступлении на работу или учебу
- медицинские осмотры для обнаружения ранних форм социально-значимых заболеваний

1075. Выберите правильный ответ

Первичная профилактика - это

- комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение появления тех или иных заболеваний и отклонений в состоянии здоровья
- комплекс медицинских, социальных, санитарно-гигиенических, психологических мер, направленных на раннее выявление заболеваний, предупреждение их обострений, осложнений и хронизацию
- комплекс медицинских, психологических, педагогических, социальных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организма, качества жизни и трудоспособности больных и инвалидов
- система мер, направленных на создание оптимальных условий для пациента

1076. Выберите правильный ответ

Вторичная профилактика - это

- комплекс медицинских, социальных, санитарно-гигиенических, психологических мер, направленных на раннее выявление заболеваний, предупреждение их обострений, осложнений и хронизацию
- комплекс медицинских, психологических, педагогических, социальных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организма, качества жизни и трудоспособности больных и инвалидов
- система мер, направленных на создание оптимальных условий для пациента
- комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение появления тех или иных заболеваний и отклонений в состоянии здоровья

1077. Выберите правильный ответ

Третичная профилактика - это

- комплекс медицинских, психологических, педагогических, социальных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организма, качества жизни и трудоспособности больных и инвалидов
- комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение появления тех или иных заболеваний и отклонений в состоянии здоровья
- комплекс медицинских, социальных, санитарно-гигиенических, психологических мер, направленных на раннее выявление заболеваний, предупреждение их обострений, осложнений и хронизацию
- система мер, направленных на создание оптимальных условий для пациента

1078. Выберите правильный ответ

Объект первичной профилактики

- все население
- реконвалесценты острых заболеваний
- больные с хроническими заболеваниями
- трудоспособное население

1079. Выберите правильный ответ

Цель вторичной профилактики

- предупреждение хронизации болезней
- лечение острых заболеваний
- предупреждение несчастных случаев
- мотивация рационального питания

1080. Выберите правильный ответ

Первичная профилактика направлена

- на формирование потребности людей в ЗОЖ
- на возможно более раннее выявление отклонений в жизнедеятельности человека с целью проведения соответствующей коррекции
- на предупреждение обострений в течение болезни, перехода относительно легкого

заболевания (или стадии) в более тяжелое заболевание (или стадию)

- на предупреждение несчастных случаев

1081. Выберите правильный ответ

Компонент первичной профилактики

- проведение иммунопрофилактики
- диспансеризация
- реабилитация
- курсы профилактического лечения и целевого оздоровления

1082. Выберите правильный ответ

Компонент вторичной профилактики

- диспансеризация
- санитарно-гигиеническое воспитание
- формирование здорового образа жизни
- проведение иммунопрофилактики

1083. Выберите правильный ответ

Индивидуальная медицинская профилактика - профилактические мероприятия

- проводимые с отдельными индивидуумами
- проводимые с группами лиц, имеющих сходные симптомы и факторы риска
- охватывающие большие группы населения или все население в целом
- проведение иммунопрофилактики

1084. Выберите правильный ответ

Групповая медицинская профилактика - профилактические мероприятия

- проводимые с группами лиц, имеющих сходные симптомы и факторы риска
- проводимые с отдельными индивидуумами
- охватывающие большие группы населения или все население в целом
- проведение иммунопрофилактики

1085. Выберите правильный ответ

Популяционная (массовая) профилактика - профилактические мероприятия

- охватывающие большие группы населения или все население в целом
- проводимые с группами лиц, имеющих сходные симптомы и факторы риска
- проводимые с отдельными индивидуумами
- проведение иммунопрофилактики

1086. Выберите правильный ответ

Основная причина смерти населения

- болезни системы кровообращения
- новообразования
- болезни костно-мышечной системы
- травмы, несчастные случаи, отравления

1087. Выберите правильный ответ

Основной документ, регламентирующий порядок и объем проведения диспансеризации взрослого населения

- Приказ МЗ СССР № 770 от 30.05.86 г. (с изменениями от 12 сентября 1997 г.) «О порядке проведения всеобщей диспансеризации населения»

- Приказ Минздравсоцразвития РФ № 188 от 23.04.2008 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»
- Приказ МЗ РФ № 350 от 20.11.2002 г. «О совершенствовании амбулаторно-поликлинической службы»
- Приказ Минздравсоцразвития РФ №3бан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации и определения групп взрослого населения»

1088. Выберите правильный ответ

Целью диспансеризации является

- сохранение здоровья
- снижение инвалидности
- повышение рождаемости
- профилактика инфекционных заболеваний

1089. Выберите правильный ответ

Количество групп здоровья выделяемых у взрослого населения

- 3
- 4
- 5
- 6

1090. Выберите правильный ответ

Возрастные рамки проведения диспансеризации взрослого населения

- с 21 до 99 лет
- с 18 до 75 лет
- с 20 до 80 лет
- с 21 до 89 лет

1091. Выберите правильный ответ

Для инвалидов Великой отечественной войны кратность прохождения диспансеризации составляет

- 1 раз в год
- 2 раза в год
- 1 раз в 2 года
- 1 раз в 3 года

1092. Выберите правильный ответ

Документ с результатами диспансеризации

- паспорт здоровья
- амбулаторная карта
- карта диспансерного наблюдения
- санаторно-курортная карта

1093. Выберите правильный ответ

Профилактические медицинские осмотры способствуют выявлению

- острых заболеваний
- хронических заболеваний
- заболеваний на ранних стадиях
- инфекционных заболеваний

1094. Выберите правильный ответ

Профилактические медицинские осмотры являются основой

- реабилитационной работы
- амбулаторного лечения

- диспансеризации
- экспертизы трудоспособности

1095. Выберите правильный ответ

Функции кабинета доврачебного контроля отделения медицинской профилактики поликлиники

- антропометрия, измерение АД
- снятие ЭКГ
- проведение аускультации сердца
- составление индивидуального плана по оздоровлению образа жизни

1096. Выберите правильный ответ

Функции кабинета доврачебного контроля отделения медицинской профилактики поликлиники

- экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина капиллярной крови
- снятие ЭКГ
- проведение аускультации сердца
- составление индивидуального плана по оздоровлению образа жизни

1097. Выберите правильный ответ

Физические факторы риска для здоровья человека

- давление, излучение, температура
- пища, вода, ядовитые вещества
- растения, микроорганизмы, животные
- факторы, воздействующие на эмоциональную сферу через зрение, обоняние, осязание

1098. Выберите правильный ответ

Биологические факторы риска для здоровья человека

- растения, микроорганизмы, животные
- пища, вода, ядовитые вещества
- давление, излучение, температура
- факторы, воздействующие на эмоциональную сферу через зрение, обоняние, осязание

1099. Выберите правильный ответ

Химические факторы риска для здоровья человека

- пища, вода, ядовитые вещества
- давление, излучение, температура
- растения, микроорганизмы, животные
- факторы, воздействующие на эмоциональную сферу через зрение, обоняние, осязание

1100. Выберите правильный ответ

Психологические факторы риска для здоровья человека

- факторы, воздействующие на эмоциональную сферу через зрение, обоняние, осязание
- давление, излучение, температура
- пища, вода, ядовитые вещества
- растения, микроорганизмы, животные

1101. Выберите правильный ответ

Активная форма санитарно-гигиенического просвещения

- беседа
- брошюра

- санитарный бюллетень
- памятка

1102. Выберите правильный ответ

Пассивная форма санитарно-гигиенического просвещения

- санитарный бюллетень
- беседа
- вечер вопросов и ответов
- индивидуальная консультация

1103. Выберите правильный ответ

Девиз всемирного дня здоровья провозглашается

- ВОЗ
- МЗ РФ
- ООН
- общественными организациями

1104. Выберите правильный ответ

Всемирный день здоровья отмечается

- 7 апреля
- 14 ноября
- 25 сентября
- дата не фиксирована

1105. Выберите правильный ответ

Форма курсового гигиенического обучения населения

- «Школа здоровья»
- лекция
- конференция
- индивидуальная консультация

1106. Выберите правильный ответ

Преимущество индивидуальных форм работы по гигиеническому воспитанию

- использование индивидуального подхода
- использование дифференцированного подхода
- большой охват населения
- небольшие затраты времени специалиста

1107. Выберите правильный ответ

МДК.04.02. Профилактическая деятельность фельдшера в терапии

1111. Выберите правильный ответ

К группе профессиональных заболеваний относятся заболевания

- перечисленные в Списке профессиональных заболеваний, утвержденном МЗ и МП РФ
- развившиеся у лиц по пути на работу или с работы
- развившиеся у лиц, проживающих вблизи промышленных предприятий, загрязняющих атмосферный воздух
- инфекционные заболевания

1112. Выберите правильный ответ

Профессиональные заболевания

- заболевания, вызванные воздействием вредных условий труда

Недостаток индивидуальной формы работы по гигиеническому воспитанию

- небольшой охват населения
- отсутствие обратной связи
- использование дифференцированного подхода
- большой охват населения

1108. Выберите правильный ответ

Индивидуальная форма гигиенического воспитания

- консультирование
- вечер вопросов
- лекцию
- семинар

1109. Выберите правильный ответ

Программа «школы» для пациентов разрабатывается

- врачом-специалистом
- инструктором по санитарному просвещению
- специалистом организационно-методического кабинета
- главным врачом

1110. Выберите правильный ответ

Оптимальная продолжительность лекции для населения

- 40 минут
- 60 минут
- 90 минут
- 120 минут

1111. Выберите правильный ответ

Здравоохранение - это

- социальная функция общества и медицины по охране и укреплению здоровья
- система социального страхования граждан
- специализированная медицинская помощь населению
- стационарная медицинская помощь населению

группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов

- заболевания, главным методом лечения которых является операция
- онкологические заболевания

1113. Выберите правильный ответ

В случае установления признаков профессионального заболевания при прохождении медосмотра работник направляется в

- центр профпатологии
- медико-санитарную часть
- диагностический центр
- поликлинику

1114. Выберите правильный ответ

Вторичная профилактика рака направлена

- на выявление и устранение предраковых заболеваний
- на пропаганду здорового образа жизни
- на отказ от курения
- на рациональное питание

1115. Выберите правильный ответ

К мероприятиям, позволяющим рано выявлять опухоли, относятся

- определение онкомаркеров
- проведение ЭКГ
- определение уровня холестерина крови
- определение уровня гликированного гемоглобина

1116. Выберите правильный ответ

Скрининговые исследования на выявление рака наиболее рационально следует начинать с возрастной группы

- 35-44 лет
- 25-34 лет
- 15-24 лет
- 45-54 лет

1117. Выберите правильный ответ

Скрининговый метод диагностики рака ободочной и прямой кишки

- пальцевое ректальное исследование, колоноскопия
- ФГДС
- УЗИ абдоминальное
- копроскопия

1118. Выберите правильный ответ

Скрининговый метод рака щитовидной железы

- пальпация шеи, УЗИ щитовидной железы
- флюорография
- рентгенография органов грудной клетки
- определение уровня ТТГ

1119. Выберите правильный ответ

Основной симптом профессиональной хронической тугоухости

- снижение слуха
- головные боли
- шум в ушах
- повышение АД

1120. Выберите правильный ответ

Инструментальный метод диагностики профессиональной тугоухости

- тональная аудиометрия
- эхокардиография
- шепотная речь с 6 метров
- электроэнцефалография

1121. Выберите правильный ответ

Основной метод диагностики профессиональной бронхиальной астмы

- аллергопробы
- пикфлоуметрия
- спирография
- бронхоскопия

1122. Выберите правильный ответ

Местная вибрационная болезнь встречается у

- забойщиков
- водителей
- трактористов
- летчиков

1123. Выберите правильный ответ

Основные симптомы местной вибрационной болезни

- боли в руках и онемение пальцев
- боли в области сердца, перебои
- головная боль, головокружение
- одышка, бронхоспазм

1124. Выберите правильный ответ

Метод диагностики местной вибрационной болезни

- реовазография сосудов конечностей
- УЗИ органов брюшной полости
- эхокардиография
- электроэнцефалография

1125. Выберите правильный ответ

Общая вибрационная болезнь развивается у

- бульдозеристов
- точильщиков
- грузчиков
- шахтеров

1126. Выберите правильный ответ

Основные симптомы общей вибрационной болезни

- головные боли, повышение АД
- нарушение слуха, осиплость голоса
- боли в руках, онемение рук
- одышка, отеки

1127. Выберите правильный ответ

Первичная профилактика общей вибрационной болезни

- качественное проведение предварительных медицинских осмотров
- использование гипотензивных препаратов
- рациональное трудоустройство
- использование спазмолитиков

1128. Выберите правильный ответ

Основное значение в патогенезе пневмокониоза имеет

- фиброз легочной ткани
- воспаление альвеол
- воспаление плевры
- воспаление бронхов

1129. Выберите правильный ответ

К пневмокониозу относится

- силикоз
- вибрационная болезнь
- тугоухость
- профессиональная бронхиальная астма

1130. Выберите правильный ответ

Асбестоз - фактор риска

- рака легких
- пневмонии
- плеврита
- профессиональной бронхиальной астмы

1131. Выберите правильный ответ

Основной признак пневмокониоза

- одышка
- повышение АД
- боль в области сердца
- боль в грудной клетке

1132. Выберите правильный ответ

Уменьшение уровня шума на вредном производстве, является профилактикой профессионального заболевания

- нейросенсорной тугоухости
- хронического ларингита
- хронического ринита
- носового кровотечения

1133. Выберите правильный ответ

Профилактика глаукомы

- соблюдение личной гигиены
- занятия спортом
- регулярная тонометрия
- контроль остроты зрения

1134. Выберите правильный ответ

Очищение организма начинают с очищения

- кишечника
- печени
- крови
- суставов

1135. Выберите правильный ответ

Раздельное питание - это прием в разное время

- белков и углеводов
- белков и растительной пищи
- углеводов и растительной пищи
- белков и жиров

1136. Выберите правильный ответ

Соотношение белков, жиров и углеводов у взрослого человека должно быть

- 1:1:4
- 1:2:4
- 1:1:1
- 1:2:3

1137. Выберите правильный ответ

Индекс массы тела (ИМТ) в норме

- 25-30
- 20-30
- 15-20
- 18-25

1138. Выберите правильный ответ

Индекс массы тела рассчитывается как

- соотношение массы тела в кг к квадрату роста в м
- соотношение массы тела в кг к росту в м
- произведение массы тела в кг на квадрат роста в м

- произведение массы тела в кг на рост в м

1139. Выберите правильный ответ

Об ожирении говорит ИМТ более

- 28
- 25
- 20
- 18

1140. Выберите правильный ответ

Состав и количество пищевых продуктов, используемых в течение суток

- пищевой рацион
- режим питания
- физиологическая потребность
- диетотерапия

1141. Выберите правильный ответ

Суточная калорийность в пожилом возрасте должна составлять

- 80%
- 100%
- 60%
- 50%

1142. Выберите правильный ответ

Рекомендуется в пожилом и старческом возрасте ограничить в питании количество

- жиров
- рыбы
- молочных продуктов
- овощей

1143. Выберите правильный ответ

Диетические рекомендации при синдроме раздраженного кишечника (СРК) с преобладанием поноса

- исключить молоко, капусту, горох, газированные напитки, ограничить жиры
- ограничение соли, жидкости, белковых продуктов
- рекомендованы свёкла, продукты богатые клетчаткой, растительное масло
- питание дробное 5-6 раз, небольшими порциями, после еды не ложиться

1144. Выберите правильный ответ

Диетические рекомендации при синдроме раздраженного кишечника (СРК) с преобладанием запора

- рекомендованы свёкла, продукты богатые клетчаткой, растительное масло
- ограничить овощи, фрукты, растительное масло
- ограничение соли, жидкости, продуктов, богатых холестерином
- питание дробное, небольшими порциями, после еды не ложиться

1145. Выберите правильный ответ

Профилактика осложнений фармакотерапии у пожилых пациентов

- назначается уменьшенная доза препаратов
- назначается увеличенная доза препаратов

- рекомендуется полипрагмазия
- рекомендуется использование транквилизаторов

1146. Выберите правильный ответ

Первичная профилактика пневмококиозов

- использование респираторов
- использование бронхолитиков
- рациональное трудоустройство
- физиолечение

1147. Выберите правильный ответ

Вторичная профилактика пневмококиозов

- рациональное трудоустройство
- использование муколитиков
- использование респираторов
- качественное проведение предварительных мед. осмотров

1148. Выберите правильный ответ

Первичная профилактика профессиональной тугоухости

- использование наушников
- использование респираторов
- рациональное трудоустройство
- медикаментозное лечение

1149. Выберите правильный ответ

Первичная профилактика профессиональной бронхиальной астмы

- качественное проведение предварительного медицинского осмотра
- санаторно-курортное лечение
- назначение бронхолитиков
- назначение противовоспалительных препаратов

1150. Выберите правильный ответ

Первичная профилактика общей вибрационной болезни

- качественное проведение предварительных медицинских осмотров
- использование гипотензивных препаратов
- рациональное трудоустройство
- использование спазмолитиков

1151. Выберите правильный ответ

Цель базисного (профилактического) лечения бронхиальной астмы

- достижение контроля над симптомами заболевания
- увеличение количества госпитализаций
- полное излечение
- оказание неотложной помощи

1152. Выберите правильный ответ

Вторичная профилактика атопической бронхиальной астмы

- системные глюкокортикостероиды
- бронхолитики короткого действия
- муколитики
- специфическая гипосенсибилизация

1153. Выберите правильный ответ

Базисное (профилактическое) лечение бронхиальной астмы

- антибиотики, муколитики
- глюкокортикостероиды, бронхолитики длительного действия
- β -блокаторы, бронхолитики короткого действия
- антибиотики, бронхолитики

1154. Выберите правильный ответ

Для профилактики кандидоза полости рта при использовании ингаляционных глюкокортикостероидов рекомендуется

- полоскать рот после ингаляции
- использовать препарат до еды
- отменить препарат
- использовать препарат после еды

1155. Выберите правильный ответ

Профилактика побочных эффектов системных глюкокортикостероидов

- назначаются коротким курсом
- назначаются на ночь
- назначаются длительно
- назначаются до еды

1156. Выберите правильный ответ

Для профилактики появления эрозий на слизистой ЖКТ преднизолон следует принимать

- после еды
- до еды
- во время еды
- независимо от приема пищи

1157. Выберите правильный ответ

Пациенты с бронхиальной астмой, прошедшие обучение в «школе»

- реже обращаются за медицинской помощью
- чаще обращаются за медицинской помощью
- чаще используют бронхолитики короткого действия
- чаще используют глюкокортикостероиды

1158. Выберите правильный ответ

Основной фактор риска хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)

- ингаляционное воздействие экзогенных частиц или газов
- недостаток альфа1-антитрипсина
- инфекция
- гиперреактивность бронхов

1159. Выберите правильный ответ

Базисное (профилактическое) лечение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) включает

- бронхолитики длительного действия
- бронхолитики короткого действия
- антибиотики
- муколитики

1160. Выберите правильный ответ

Основной фактор риска рака лёгкого

- курение
- переохлаждение

- инфекция
- ожирение

1161. Выберите правильный ответ

- Основные методы раннего выявления рака легких
- бронхоскопия, рентгенография органов грудной клетки
 - спирография, УЗИ плевральной полости
 - общий анализ крови, общий анализ мокроты
 - ЭКГ, эхокардиография

1162. Выберите правильный ответ

- Основной фактор риска развития хронического лёгочного сердца
- хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
 - пневмония
 - хронический фарингит
 - острый бронхит

1163. Выберите правильный ответ

- Основной фактор риска развития острой ревматической лихорадки
- стрептококковая инфекция носоглотки
 - острая кишечная инфекция
 - хламидиоз
 - респираторные вирусные инфекции

1164. Выберите правильный ответ

- Для вторичной профилактики ревмокардита применяют
- бензатина-бензилпенициллин
 - ампициллин
 - эритромицин
 - гентамицин

1165. Выберите правильный ответ

- Бициллинопрофилактика проводится при
- ревмокардите
 - гипертонической болезни
 - атеросклерозе
 - ревматоидном артрите

1166. Выберите правильный ответ

- При отсутствии обострений ревмокардита бициллинопрофилактика проводится не менее
- 5 лет
 - 3 лет
 - 1 года
 - 10 лет

1167. Выберите правильный ответ

- Эндогенный фактор риска развития артериальной гипертензии
- сахарный диабет
 - гиподинамия
 - избыток соли в рационе
 - курение

1168. Выберите правильный ответ

- Экзогенный фактор риска развития артериальной гипертензии
- курение
 - гиперхолестеринемия

- наследственность
- сахарный диабет

1169. Выберите правильный ответ

- Гиперхолестеринемия - уровень холестерина в плазме выше
- 5,0 ммоль/л
 - 8,0 ммоль/л
 - 6,1 ммоль/л
 - 7,0 ммоль/л

1170. Выберите правильный ответ

- При диспансеризации пациентов с гипертонической ретинопатией проводится
- осмотр глазного дна
 - общий анализ мочи
 - ЭКГ
 - биохимический анализ крови

1171. Выберите правильный ответ

- При диспансеризации пациентов с гипертонической энцефалопатией проводится
- УЗИ сонных и церебральных артерий
 - ЭКГ
 - УЗИ почек
 - осмотр глазного дна

1172. Выберите правильный ответ

- Рацион пациентов с артериальной гипертензией ограничивает прием
- соли
 - citrusовых
 - специй
 - фруктов

1173. Выберите правильный ответ

- Целевой уровень АД у пациентов с артериальной гипертензией менее
- 140/90 мм.рт.ст.
 - 160/100 мм.рт.ст.
 - 120/80 мм.рт.ст.
 - 150/90 мм.рт.ст.

1174. Выберите правильный ответ

- Базисное лечение гипертонической болезни (профилактика криза) включает
- В-блокаторы, ингибиторы АПФ
 - блокаторы H₂ гистаминовых рецепторов, антациды
 - нитраты, диуретики
 - сердечные гликозиды, бронхолитики

1175. Выберите правильный ответ

- Фактор риска развития атеросклероза
- гиперхолестеринемия
 - занятия физической культурой
 - неотягощенная наследственность
 - рациональное питание

1176. Выберите правильный ответ

- Риск развития ИБС у женщин по сравнению с мужчинами в возрасте до 50 лет
- ниже
 - выше

- такой же
- значительно выше

1177. Выберите правильный ответ

Продукты, богатые калием

- изюм, курага
- конфеты,
- молоко, творог
- мясо, рыба

1178. Выберите правильный ответ

Доза ацетилсалициловой кислоты (аспирина), улучшающая реологические свойства крови, используемая для профилактики инфаркта

- миокарда
- 75-320 мг
- 500 мг
- 1000 мг
- 25 мг

1179. Выберите правильный ответ

Базисное лечение стенокардии (профилактика приступов) включает

- изосорбид-5-мононитрат, метопролол
- панангин, дигоксин
- индапамид, каптоприл
- ацетилсалициловая кислота (аспирин), фуросемид

1180. Выберите правильный ответ

Критерий эффективности диспансеризации при стенокардии

- переход из III в II функциональный класс
- назначение группы инвалидности
- переход из II в III функциональный класс
- увеличение трудопотерь

1181. Выберите правильный ответ

Основной этиологический фактор хронического гастрита

- инфекция хеликобактер пилори (Hр)
- систематический приём алкоголя
- заброс желчи из 12-перстной кишки
- наследственность

1182. Выберите правильный ответ

Для стимуляции секреторной функции желудка рекомендуют отвар

- подорожника
- мяты
- душицы
- укропа

1183. Выберите правильный ответ

При диспансеризации больных с хроническим гастритом проводится

- фиброгастроскопия
- колоноскопия
- ректороманоскопия
- ирригоскопия

1184. Выберите правильный ответ

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) рекомендуют

- маалокс
- амоксициллин
- метоклопрамид
- де-нол

1185. Выберите правильный ответ

Препарат для вторичной профилактики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)

- метоклопрамид
- дротаверина гидрохлорид
- кларитромицин
- метронидазол

1186. Выберите правильный ответ

Для профилактики обострений язвенной болезни рекомендуют использовать

- блокаторы секреции
- антибиотики
- спазмолитики
- антибактериальные препараты

1187. Выберите правильный ответ

Фактор риска развития хронического энтероколита

- длительный приём медикаментов
- курение
- наследственность
- физические нагрузки

1188. Выберите правильный ответ

При синдроме раздражённого кишечника рекомендуют ограничить

- использование слабительных
- использование пробиотиков
- использование регуляторов моторики
- кисломолочные продукты

1189. Выберите правильный ответ

Фактор риска развития хронического панкреатита

- злоупотребление алкоголем
- физические нагрузки
- частые ангины
- наследственность

1190. Выберите правильный ответ

При диарее в питании рекомендуют исключить

- молоко
- отварное мясо
- картофель
- сухари

1191. Выберите правильный ответ

При запоре рекомендуют употреблять

- свеклу, растительное масло
- печень, мясо
- картофель, мясо
- белый хлеб, молоко

1192. Выберите правильный ответ

Диета при холецистите исключает

- жареные котлеты
- кефир
- нежирное мясо
- творог

1193. Выберите правильный ответ

Тюбаж с профилактической целью применяют для

- увеличения оттока желчи
- обезболивания
- уменьшения оттока желчи
- уменьшения воспаления

1194. Выберите правильный ответ

При диспансеризации больных язвенной болезнью проводится

- фиброгастроскопия
- ректороманоскопия
- дуоденальное зондирование
- холецистография

1195. Выберите правильный ответ

При диспансеризации больных хроническим холециститом проводят

- УЗИ брюшной полости
- цистоскопию
- лапароскопию
- урографию

1196. Выберите правильный ответ

При диспансеризации больных хроническим панкреатитом исследуют содержание в крови

- глюкозы
- креатинина
- фибриногена
- холестерина

1197. Выберите правильный ответ

Фактор риска развития гломерулонефрита

- переохлаждение
- мочекаменная болезнь
- аденома предстательной железы
- курение

1198. Выберите правильный ответ

Фитотерапия для профилактики обострений пиелонефрита

- брусника, медвежьих ушки
- алтей, душица
- мята, мать-и-мачеха
- подорожник, пижма

1199. Выберите правильный ответ

В начальной стадии ХПН в диете ограничивают

- белки
- витамины
- жиры
- углеводы

1200. Выберите правильный ответ

Фактор риска развития В12-дефицитной анемии

- атрофический гастрит
- многоплодная беременность
- обильные менструации
- наследственность

1201. Выберите правильный ответ

Профилактические курсы лечения витамином В12 проводятся при

- резекции желудка
- ГЭРБ
- язвенной болезни
- холецистите

1202. Выберите правильный ответ

Основной фактор риска развития эндемического зоба

- дефицит йода в почве, воде
- инфекция
- стрессы
- черепно-мозговые травмы

1203. Выберите правильный ответ

Продукты, наиболее богатые йодом

- морепродукты
- мясо
- хлеб
- молоко

1204. Выберите правильный ответ

Для профилактики эндемического зоба йодируют

- поваренную соль
- крупы
- растительное масло
- сахар

1205. Выберите правильный ответ

Пациенту с сахарным диабетом рекомендуют чередовать места инъекций инсулина для профилактики

- липодистрофии
- инсулинорезистентности
- полинейропатии
- ретинопатии

1206. Выберите правильный ответ

Основной фактор риска развития сахарного диабета II типа

- избыточная масса тела
- курение
- гиподинамия
- артериальная гипертензия

1207. Выберите правильный ответ

«Быстрые» углеводы содержатся

- во фруктовых соках
- в гречке
- в кабачках
- в ржаном хлебе

1208. Выберите правильный ответ

Продукты, содержащие «медленные» углеводы

- зерновой хлеб
- фруктовый сок
- мед
- сахар

1209. Выберите правильный ответ

К бытовым аллергенам относится

- домашняя пыль
- пенициллин
- пыльца березы
- шоколад

1210. Выберите правильный ответ

Для профилактики клещевого энцефалита используется

- вакцина
- гамма-глобулин
- анатоксин
- антибиотики

1211. Выберите правильный ответ

Вакцинопрофилактика проводится

- гриппе
- аденовирусной инфекции
- парагриппе
- РС-вирусной инфекции

1212. Выберите правильный ответ

Для профилактики ишемического инсульта необходимо

- профилактика ишемии сосудов головного мозга
- снижение уровня холестерина крови
- нормализация водно-солевого обмена
- снижение уровня глюкозы крови

1213. Выберите правильный ответ

Для профилактики контрактур при инсульте используют

- укладку конечности в физиологическом положении
- бинтование эластичным бинтом
- массаж
- гипсование конечности

1214. Выберите правильный ответ

Профилактика осложнений при неврите лицевого нерва необходимо

- закапывание глаза на поврежденной стороне искусственной слезой и наложение щадящей повязки на глаз
- ЛФК
- применение антибактериальных средств местно
- физиотерапевтические процедуры

1215. Выберите правильный ответ

Особенность транспортировки пациента с травмой поясничного отдела позвоночника для профилактики осложнений

- обеспечить положение пациента на щите, на спине
- придать пациенту положение полусидя
- транспортировать стоя
- оказать помощь на месте происшествия

1216. Выберите правильный ответ

Профилактика посттравматической эпилепсии

- назначение в процессе лечения противосудорожных препаратов
- назначение антибиотиков
- назначение ноотропов
- витаминотерапия

1217. Выберите правильный ответ

Профилактика расстройств вегетативной нервной системы

- нормализация режима сна и бодрствования
- регулярные курсы витаминизации
- ЛФК
- иглоукалывание

1218. Выберите правильный ответ

Профилактика формирования остеохондроза

- ограничение тяжелого физического труда
- нормализация сна
- диетотерапия
- избегание стрессов

1219. Выберите правильный ответ

Профилактика осложнений со стороны ЖКТ при приёме нестероидных противовоспалительных препаратов

- прием НПВП после еды
- прием НПВП только при болях
- ФГС-контроль
- регулярно принимать анальгетики

1220. Выберите правильный ответ

Профилактика обострения Люмбаго

- укрепление мышечного корсета
- соблюдение бессолевой диеты
- ограничение потребления жидкости
- избегать стрессовых ситуаций

1221. Выберите правильный ответ

Профилактические средства при цереброваскулярной недостаточности

- ноотропы
- мочегонные препараты
- антидепрессанты
- психостимуляторы

1222. Выберите правильный ответ

Основная мера профилактики неврологических заболеваний

- антиоксиданты
- курортное лечение
- снижение веса
- витаминотерапия

1223. Выберите правильный ответ

Для профилактики вертеброгенной невралгии шейного отдела позвоночника используют воротник Шанса

- в дневное время
- круглосуточно
- во время работы
- при головной боли

1224. Выберите правильный ответ

Для профилактики осложнений после проведения люмбальной пункции пациента необходимо уложить на

- живот, без подушки
- мягкую постель
- спину
- бок

1225. Выберите правильный ответ

Профилактика менингита - особое внимание при лечении

- синуситов, гайморитов
- желудочно-кишечных расстройств
- аллергических состояний
- головной боли

1226. Выберите правильный ответ

Профилактика осложнений при черепно-мозговых травмах (абсцесс, менингит)

- антибиотики в/в, в/м
- люмбальная пункция
- трепанация черепа
- постельный режим

1227. Выберите правильный ответ

Профилактика неврозов

- снижение числа стрессорных факторов, умение нейтрализовать возникающую психотравмирующую ситуацию
- применение антидепрессантов
- применение психотерапии
- исключение психотравмирующей ситуации

1228. Выберите правильный ответ

Профилактика геморрагического инсульта

- раннее выявление и систематическое медикаментозное лечение АГ
- отказ от курения
- лечение и профилактика факторов риска (сахарного диабета, гиперхолестеринемии)
- диспансеризация больных

1229. Выберите правильный ответ

Разработка рекомендаций по профессиональному отбору, профилактика производственных и семейных конфликтов

- задачи первичной психопрофилактики
- задачи вторичной психопрофилактики
- задачи третичной психопрофилактики
- задачи психогигиены

1230. Выберите правильный ответ

Раннее выявление и предупреждение неблагоприятного течения психических заболеваний - основа

- вторичной психопрофилактики
- первичной психопрофилактики
- третичной психопрофилактики
- психогигиены

1231. Выберите правильный ответ

Система психологических воздействий, направленная на изменение определенных свойств психики

- психологическая коррекция
- психологическое консультирование
- психогигиена
- психотерапия

1232. Выберите правильный ответ

Психологическая коррекция в качестве профилактических мер наиболее значима на этапе

- первичной психопрофилактики
- вторичной психопрофилактики
- третичной психопрофилактики
- психогигиены

1233. Выберите правильный ответ

Диспансеризация хирургических больных - это

- лечебное направление работы поликлиники
- профилактическое направление работы поликлиники
- оперативное направление работы поликлиники
- статистическое направление поликлиники

1234. Выберите правильный ответ

Продолжительность диспансерного наблюдения больных после операций по поводу хирургических заболеваний

- 1 год
- 6-12 месяцев
- 1-2 года
- 3 года

1235. Выберите правильный ответ

Диспансерному наблюдению у хирурга подлежат больные с диагнозом

- хронический остеомиелит, облитерирующие заболевания нижних конечностей, грыжи приобретенные и врожденные
- злокачественные опухоли различной локализации
- заболевания крови
- заболевания мочеполовой системы

1236. Выберите правильный ответ

Факторы риска по развитию хронических заболеваний периферических артерий

- мужской пол, курение, переохлаждение
- артериальная гипотония, сердечная недостаточность
- почечная, печеночная недостаточность
- заболевания органов дыхания

1237. Выберите правильный ответ

Первичная профилактика злокачественных новообразований

- устранение воздействий неблагоприятных факторов окружающей среды и образа жизни
- проведение санитарно-профилактических мероприятий
- проведение вакцинации
- проведение лечебно-профилактических мероприятий

1238. Выберите правильный ответ

Вторичная профилактика злокачественных новообразований

- комплекс мероприятий, направленных на выявление предопухолевых заболеваний и состояний и раннюю диагностику онкологических заболеваний
- устранение воздействий неблагоприятных факторов окружающей среды и образа жизни

- проведение лечебно-профилактических мероприятий
- проведение санитарно-профилактических мероприятий

1239. Выберите правильный ответ

Онкогигиеническая профилактика

- выявление и устранение возможности действия на человека канцерогенных факторов окружающей среды (образ жизни и питание)
- выявление и устранение возможности канцерогенного воздействия воды и пищи, загрязнения водоемов, воздушной среды различными химическими веществами
- профилактика путем выделения семей с наследуемыми предрасположенностями к опухолевым заболеваниям
- выделения людей или формирование групп с иммунологической недостаточностью и организации мероприятий по ее коррекции

1240. Выберите правильный ответ

Специальные методы исследования при онкологических заболеваниях

- цитологические, гистологические
- УЗИ, эндоскопическое
- лабораторная диагностика
- рентгенологическое

1241. Выберите правильный ответ

Под факторами риска для здоровья понимают факторы

- потенциально опасные для здоровья
- повышающие опасность травматизма
- вредные и опасные производственные
- вызывающие физическое и/или эмоциональное напряжение

1242. Выберите правильный ответ

Фактор риска по возникновению рака молочной железы

- хронические трещины сосков
- хронические очаги инфекции
- переохлаждение
- лактация

1243. Выберите правильный ответ

Наибольший риск возникновения рака щитовидной железы при

- узлом зобе
- диффузном зобе
- тиреотоксическом зобе
- тиреоидите

1244. Выберите правильный ответ

Производственные процессы канцерогенные для человека

- работа с асбестом, сажей, производство резины
- деревообрабатывающая и мебельная промышленность
- пищевая промышленность
- фармацевтическая деятельность

МДК.04.03. Профилактическая деятельность фельдшера в педиатрии

1245. Выберите правильный ответ

При проведении профилактического осмотра ребенку в возрасте 1 месяц проводится УЗИ

- органов брюшной полости, сердца, тазобедренных суставов, головного мозга
- головного мозга
- органов брюшной полости, сердца, нейросонография
- органов брюшной полости, сердца, тазобедренных суставов

1246. Выберите правильный ответ

Кратность проведения патронажа к ребенку 2-ого месяца жизни фельдшером ФАП

- 3
- 2
- 1
- 4

1247. Выберите правильный ответ

Кратность проведения патронажа к ребенку 3-его, 4-ого и 5-ого месяца жизни фельдшером ФАП (раз в месяц)

- 2
- 3
- 4
- 1

1248. Выберите правильный ответ

Кратность проведения патронажа к ребенку 2-ого полугодия жизни фельдшером ФАП (раз в месяц)

- 1
- 2
- 3
- 4

1249. Выберите правильный ответ

Кратность осмотра педиатром ребенка грудного возраста на фиксированном приеме на ФАП

- 1 раз в месяц
- 2 раза в месяц
- 1 раз в 3 месяца
- 1 раз в 2 месяца

1250. Выберите правильный ответ

Термин «физическое развитие» в педиатрии понимается как динамический процесс

- роста и биологического созревания ребёнка в том или ином периоде детства
- роста ребёнка и биологического созревания отдельных систем
- роста ребёнка в том или ином периоде детства
- биологического созревания отдельных органов и систем ребенка

1251. Выберите правильный ответ

Оценка физического развития ребенка на 1-ом году жизни осуществляется 1 раз

- в месяц
- в 3 месяца
- в 6 месяцев
- в неделю

1252. Выберите правильный ответ

Частота антропометрических измерений и осмотров для оценки физического развития в подростковом возрасте составляет 1 раз

- в 1 год
- в 1 месяц
- в 3 месяца
- в 6 месяцев

1253. Выберите правильный ответ

Средняя прибавка массы тела за первый месяц жизни составляет (грамм)

- 600
- 250
- 400
- 1000

1254. Выберите правильный ответ

Прирост длины тела ребенка за первый год жизни в среднем составляет

- 25 см
- 30 см
- 15 см
- 20 см

1255. Выберите правильный ответ

Длина тела ребёнка в 1 год в среднем составляет

- 75 см
- 80 см
- 65 см
- 70 см

1256. Выберите правильный ответ

Окружность головы у большинства детей в конце первого года жизни

- меньше окружности груди на 1-2 см
- равна окружности груди
- больше окружности груди на 3 см
- меньше окружности груди на 4 см

1257. Выберите правильный ответ

При оценке физического развития по центильным таблицам оно расценивается как гармоничное, если разница номеров центильных коридоров роста и массы составляет не более

- 1
- 2
- 3
- 4

1258. Выберите правильный ответ

При оценке физического развития по центильным таблицам для определения соматотипа суммируют номера центильных коридоров

- массы тела, длины, окружности груди

- роста, массы тела, окружности головы
- роста и массы тела
- окружности груди и головы

1259. Выберите правильный ответ

Критерий оценки состояния здоровья ребенка

- уровень функционального состояния основных систем организма
- показатели поведения ребенка
- эмоциональное состояние ребенка
- аппетит и пищевое поведение ребенка

1260. Выберите правильный ответ

Критерий оценки состояния здоровья ребенка

- степень сопротивляемости организма неблагоприятным внешним воздействиям
- показатели поведения ребенка
- эмоциональное состояние ребенка
- аппетит и пищевое поведение ребенка

1261. Выберите правильный ответ

Критерий оценки состояния здоровья ребенка

- уровень достигнутого развития и степень его гармоничности
- показатели поведения ребенка
- эмоциональное состояние ребенка
- аппетит и пищевое поведение ребенка

1262. Выберите правильный ответ

Критерий оценки состояния здоровья ребенка

- наличие функциональных нарушений и/или хронических заболеваний
- показатели поведения ребенка
- эмоциональное состояние ребенка
- аппетит и пищевое поведение ребенка

1263. Выберите правильный ответ

Уровень резистентности организма ребенка определяется

- кратностью острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру
- кратностью острых респираторных заболеваний, перенесенных ребенком в течение его жизни
- тяжестью острых заболеваний
- длительностью и тяжестью заболевания

1264. Выберите правильный ответ

Количество групп диспансерного наблюдения, выделяемых у детей

- 5
- 4
- 3
- 2

1265. Выберите правильный ответ

Группа диспансерного наблюдения, в которой находятся здоровые дети с нормальным физическим и нервно-психическим развитием

- I
- II
- III

IV

1266. Выберите правильный ответ

Группа диспансерного наблюдения, в которой находятся дети с наличием функциональных нарушений в состоянии здоровья

- II
 III
 IV
 I

1267. Выберите правильный ответ

Группа диспансерного наблюдения, в которой находятся дети с хроническими заболеваниями в стадии компенсации

- III
 IV
 I
 II

1268. Выберите правильный ответ

Группа диспансерного наблюдения, в которой находятся дети с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации

- V
 IV
 III
 II

1269. Выберите правильный ответ

Кратность проведения комплексной оценки состояния здоровья ребенку на 1-ом году жизни

- 1 раз в месяц
 1 раз в 3 месяца
 1 раз в 6 месяцев
 1 раз в год

1270. Выберите правильный ответ

Кратность проведения комплексной оценки состояния здоровья ребенку на 3-ем году жизни

- 1 раз в 6 месяцев
 1 раз в 3 месяца
 1 раз в месяц
 1 раз в год

1271. Выберите правильный ответ

Кратность проведения комплексной оценки состояния здоровья детям школьного возраста

- 1 раз в год
 1 раз в месяц
 1 раз в 3 месяца
 1 раз в 6 месяцев

1272. Выберите правильный ответ

Сроки проведения первичного патронажа новорожденного фельдшером ФАП

- в день выписки новорожденного из родильного дома
 в 7-дневном возрасте ребенка
 в первые 3 дня после выписки новорожденного из родильного дома
 через неделю после выписки новорожденного из родильного дома

1273. Выберите правильный ответ

Патронаж здорового новорожденного осуществляется фельдшером

- 2 раза в неделю
 ежедневно
 1 раз в неделю
 1 раза в 2 недели

1274. Выберите правильный ответ

Организация проблемно-целевого обучения детей с хронической патологией и членов семьи в «Школах здоровья» предполагает

- повышение уровня медицинских знаний
 оказание самостоятельно медицинской помощи
 получение среднего медицинского образования
 получение высшего медицинского образования

1275. Выберите правильный ответ

Основной метод проблемно-целевого обучения детей с хронической патологией и членов семьи

- организация специализированных медицинских школ по профилю заболеваний
 самостоятельное изучение литературы родителями пациентов
 оказание самостоятельно медицинской помощи
 получение среднего медицинского образования родителями детей

1276. Выберите правильный ответ

Гигиеническое воспитание детей младшего школьного возраста наиболее эффективно проводить в форме

- урока здоровья
 семинара
 лекции
 беседы

1277. Выберите правильный ответ

Гигиеническое воспитание детей дошкольного возраста должно проводиться в форме

- игры
 урока
 беседы
 лекции

1278. Выберите правильный ответ

Наиболее актуальной темой для профилактической беседы медицинского работника с родителями детей грудного возраста является

- профилактика рахита, хронических расстройств питания, анемии
 профилактика инфекционно-аллергических заболеваний
 профилактика детского травматизма
 профилактика близорукости

1279. Выберите правильный ответ

Для профилактической беседы педиатра с родителями детей школьного возраста является наиболее актуальной тема

- о профилактике нарушений осанки

- о правилах ухода за здоровым и больным ребенком
- о формировании навыков личной гигиены
- о профилактике острых детских инфекций

1280. Выберите правильный ответ

Для профилактической беседы педиатра с родителями детей школьного возраста является наиболее актуальной тема

- о близорукости и других нарушениях зрения
- о профилактике рахита, хронических расстройств питания, анемии
- о профилактике детского травматизма
- о значении аллергических и инфекционно-аллергических заболеваний

1281. Выберите правильный ответ

Продукты, наиболее богатые белками

- мясо
- крупы
- фрукты
- овощи

1282. Выберите правильный ответ

Продукты, наиболее богатые углеводами

- овощи
- мясо
- творог
- яйца

МДК.04.04. Профилактическая деятельность фельдшера при инфекционных заболеваниях

1283. Выберите правильный ответ

Первое звено эпидемического процесса

- источник инфекции
- механизм передачи инфекции
- восприимчивый организм
- окружающая среда

1284. Выберите правильный ответ

Второе звено эпидемического процесса

- механизм передачи инфекции
- источник инфекции
- восприимчивый организм
- окружающая среда

1285. Выберите правильный ответ

Третье звено эпидемического процесса

- восприимчивый организм
- источник инфекции
- механизм передачи инфекции
- окружающая среда

1286. Выберите правильный ответ

К профилактическим мероприятиям, направленным на источник инфекции относится

- изоляция пациента
- дезинфекция
- здоровый образ жизни
- иммунизация

1287. Выберите правильный ответ

К искусственному пассивному иммунитету относится

- иммунитет после введения лечебной сыворотки
- иммунитет, возникающий после перенесенной инфекции
- иммунитет, передающийся от матери к ребенку
- иммунитет после введения вакцины

1288. Выберите правильный ответ

К искусственному активному иммунитету относится

- иммунитет после введения вакцины
- иммунитет, возникающий после перенесенной инфекции

иммунитет после введения сыворотки

иммунитет, передающийся от матери к ребенку

1289. Выберите правильный ответ

К естественному активному иммунитету относится

- иммунитет, возникающий после перенесенной инфекции
- иммунитет, передающийся от матери к ребенку
- иммунитет после введения сыворотки
- иммунитет после введения вакцины

1290. Выберите правильный ответ

К естественному пассивному иммунитету относится

- иммунитет, передающийся от матери к ребенку
- иммунитет, возникающий после перенесенной инфекции
- иммунитет после введения сыворотки
- иммунитет после введения вакцины

1291. Выберите правильный ответ

Профилактические мероприятия, направленные на механизм передачи относятся

- дезинфекция
- дератизация
- изоляция пациента
- профилактика бактериофагами

1292. Выберите правильный ответ

Вид специфической профилактики инфекционных заболеваний

- вакцинация
- проведение санитарно-просветительной работы
- лечение больных
- обследование контактных

1293. Выберите правильный ответ

Санитарно-просветительная работа относится

- к неспецифической профилактике
- к плановой профилактике
- к специфической профилактике
- к экстренной профилактике

1294. Выберите правильный ответ

Дезинфекция, проводимая в эпидемическом очаге в присутствии пациента

- текущая
- плановая
- заключительная
- профилактическая

1295. Выберите правильный ответ

Текущую дезинфекцию при лечении пациента на дому проводит

- ухаживающий
- сам пациент
- медицинский работник
- никто не проводит

1296. Выберите правильный ответ

Быстрее всего развиваются эпидемии в группе

- инфекций дыхательных путей
- кишечных инфекций
- кровяных инфекций
- инфекций наружных покровов

1297. Выберите правильный ответ

Плановая вакцинация должна проводиться

- в специально оборудованных кабинетах поликлиники
- в КИЗ (кабинете инфекционных заболеваний)
- только в стационаре
- в специально оборудованных кабинетах стационара

1298. Выберите правильный ответ

Дезинфекция, проводимая в эпидемическом очаге после удаления источника инфекции

- заключительная
- плановая
- текущая
- профилактическая

1299. Выберите правильный ответ

Дезинфекция, проводимая в местах общественного пользования

- профилактическая
- плановая
- заключительная
- текущая

1300. Выберите правильный ответ

Для годовой динамики заболеваемости кишечными инфекциями наиболее характерно

- летне-осенняя сезонность
- зимняя сезонность
- равномерное распределение в течение года
- осенне-весенняя сезонность

1301. Выберите правильный ответ

Основной способ индивидуальной профилактики шигеллезов

- соблюдение правил личной гигиены
- вакцинация
- прием дизентерийного бактериофага
- прием антибиотиков

1302. Выберите правильный ответ

Тактика медицинского персонала при эпидемии гриппа в образовательном учреждении

- выступление по местному радио на тему: «Грипп, пути передачи, клиника и профилактика»
- вакцинация
- контроль пищеблока
- проведение генеральной уборки в учебных классах

1303. Выберите правильный ответ

Меры специфической профилактики гриппа

- введение противогриппозной вакцины
- изоляция больных
- ношение четырехслойной маски
- кварцевание помещений

1304. Выберите правильный ответ

Вакцины, используемые для проведения специфической профилактики гриппа

- Ваксигрипп, гриппол
- АДС-М
- Энцевир
- Энджерикс В

1305. Выберите правильный ответ

Специфическая профилактика гриппа (вакцинация) проводится

- каждый год за 3 мес. до обычного начала эпидемии в регионе проживания
- каждый год во время эпидемии в регионе проживания
- каждый год в январе-феврале
- 1 раз в 5 лет осенью

1306. Выберите правильный ответ

Ревакцинация против дифтерии и столбняка взрослому населению проводится

- проводится каждые 10 лет от последней прививки
- проводится каждый год
- проводится каждые 5 лет
- не проводится

1307. Выберите правильный ответ

Для проведения ревакцинации против дифтерии и столбняка взрослому населению используют вакцину

- АДС-М
- Ваксигрипп, гриппол
- Энцевир
- Энджерикс В

1308. Выберите правильный ответ

Профилактика вирусного гепатита «В»

- применение только одноразовых шприцов
- мытье овощей и фруктов
- употребление кипяченой воды
- дезинфекция выделений

1309. Выберите правильный ответ

Донор должен обязательно обследоваться на

- вирусный гепатит «В»
- сибирскую язву

- дизентерию
- малярию

1310. Выберите правильный ответ

Наиболее эффективные меры профилактики ВИЧ-инфекции среди населения

- санитарно-просветительная работа среди населения
- массовое лабораторное обследование на ВИЧ-инфекцию
- изоляция ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
- применение медикаментов и вакцин для специфической профилактики групп риска среди населения

1311. Выберите правильный ответ

Мероприятия для предупреждения внутрибольничного инфицирования ВИЧ-инфекцией в соматическом стационаре

- дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения
- ультрафиолетовое облучение помещений
- тщательное проветривание помещений
- дезинфекция оборудования, помещений

1312. Выберите правильный ответ

Профилактика ВИЧ-инфекции при порезе или уколе кожи медицинского работника инструментом, загрязненным кровью

- обработка и снятие перчатки, выдавливание крови, мытье руки с мылом под проточной водой, обработка 70% спиртом, смазывание раны 5% раствором йода
- мытье проточной водой, затем мытье с мылом
- обработка 6% раствором перекиси водорода
- выдавливание крови, обработка ранки 96% спиртом

1313. Выберите правильный ответ

Скрининговый тест на ВИЧ-инфекцию

- анализ крови с помощью иммуноферментного анализа (ИФА)
- анализ крови на определение антител класса IgG
- анализ крови на определение HBsAg
- общий анализ крови

1314. Выберите правильный ответ

Первичная химиопрофилактика туберкулеза проводится

- при угрозе заражения и заболевания туберкулезом
- при тяжелых формах туберкулеза
- при риске обострения туберкулезного процесса
- при возможности рецидива заболевания

1315. Выберите правильный ответ

Противотуберкулезный препарат, используемый для химиопрофилактики

- изониазид
- стрептомицин
- этамбутол

- рифампицин

1316. Выберите правильный ответ

Препарат для проведения вакцинации и ревакцинации против туберкулеза

- вакцина БЦЖ
- альтертуберкулин Коха
- туберкулин ППД-Л
- диаскинтест

1317. Выберите правильный ответ

Ревакцинация БЦЖ необходима в связи

- с угасанием иммунитета после вакцинации
- с наличием контакта с больным туберкулезом
- с отсутствием поствакцинального рубца БЦЖ
- с целью диагностики туберкулеза

1318. Выберите правильный ответ

Флюорографическое обследование «декретированного» контингента проводится

- 1 раз в год
- 2 раза в год
- раз в 2 года
- раз в 3 года

1319. Выберите правильный ответ

К социальным факторам, способствующим распространению туберкулеза, относятся

- неблагоприятные жилищно-бытовые условия
- благоприятные жилищно-бытовые условия
- низкий интеллектуальный уровень
- беспорядочный образ жизни

1320. Выберите правильный ответ

Для проведения химиопрофилактики при выражении туберкулиновых проб используется

- изониазид
- стрептомицин
- рифампицин
- этамбутол

1321. Выберите правильный ответ

Химиопрофилактика при выражении туберкулиновых проб проводится в течение

- 3 месяцев
- 2 месяцев
- 1 месяца
- 6 месяцев

1322. Выберите правильный ответ

Мероприятия по уничтожению патогенных микроорганизмов в окружающей среде

- дезинфекция
- дезинсекция
- дератизация
- стерилизация

1323. Выберите правильный ответ

Комплекс мер по уничтожению грызунов – переносчиков инфекции

- дератизация
- стерилизация
- дезинсекция
- дезинфекция

1324. Выберите правильный ответ

Цель мероприятий по соблюдению асептики

- предупреждение попадания патогенных микроорганизмов в рану
- уничтожение патогенных микроорганизмов в окружающей среде - : уничтожение патогенных микроорганизмов в ране
- уничтожение насекомых - переносчиков инфекции

1325. Выберите правильный ответ

Механический способ дезинфекции

- проветривание
- кварцевание
- обжигание
- кипячение

1326. Выберите правильный ответ

Физический метод дезинфекции

- использование ультрафиолетового излучения
- проветривание
- использование дезинфицирующих растворов
- протирание влажной ветошью

1327. Выберите правильный ответ

Вид дезинфекции после выздоровления или смерти пациента

- заключительная
- профилактическая
- предварительная
- текущая

1328. Выберите правильный ответ

Цель гигиенической обработки рук медицинского персонала

- профилактика профессионального заражения
- создание кратковременной стерильности
- обеспечение кратковременной стерильности
- удаление бытового загрязнения

04.05. Профилактическая деятельность фельдшера в акушерстве

1329. Выберите правильный ответ

Продолжительные, обильные менструации - фактор риска анемии

- железодефицитной
- В12-дефицитной
- гемолитической
- апластической

1330. Выберите правильный ответ

Железосодержащие препараты с профилактической целью рекомендуют принимать 1 неделю в месяц при

- обильных менструациях
- хроническом гастрите
- хроническом энтерите
- хроническом гепатите

1331. Выберите правильный ответ

Продукты, богатые железом

- мясо, печень

- молоко, яйца
- крупа, хлеб
- картофель, масло

1332. Выберите правильный ответ

Продукты, содержащие витамин В12

- печень, яйца
- крупа, хлеб
- курага, изюм
- картофель, масло

1333. Выберите правильный ответ

Женщинам целесообразно проводить маммографическое исследование в качестве скринингового метода диагностики рака молочной железы

- в возрасте 40-69 лет
- в возрасте 30-39 лет
- в возрасте 20-29 лет
- старше 70 лет

1334. Выберите правильный ответ

Скрининговый метод диагностики рака молочной железы

- маммография
- самообследование молочных желёз
- УЗИ молочных желёз
- компьютерная томография молочных желёз

1335. Выберите правильный ответ

Скрининговый метод диагностики рака шейки матки

- кольпоцитодиагностика
- трансабдоминальное УЗИ органов малого таза
- трансвагинальное УЗИ органов малого таза
- раздельное диагностическое выскабливание

1336. Выберите правильный ответ

Физиопсихопрофилактическая подготовка включает

- индивидуальные беседы и групповые занятия специальной гимнастикой
- исследование глазного дна
- антропометрию
- консультацию психиатра

1337. Выберите правильный ответ

Психопрофилактическая подготовка направлена на

- снятие страха у беременной перед родами и родовыми болями
- определение патологии плода;
- выявление скрытых инфекционных заболеваний у беременной
- организацию специализированного ухода за больными

1338. Выберите правильный ответ

Психопрофилактическая подготовка к родам

- уменьшает родовые боли, способствует благоприятному течению беременности и родов
- не влияет на течение беременности и родов
- ухудшает состояние внутриутробного плода
- повышает артериальное давление

1339. Выберите правильный ответ

Цель физиопсихопрофилактики при беременности

- восприятие родов как физиологического процесса и обучение навыкам поведения в родах
- получение родового сертификата
- оформление обменной карты
- выявление соматической патологии

1340. Выберите правильный ответ

Метод психопрофилактической подготовки беременной к родам

- рекомендуется всем беременным для уменьшения болевых ощущений в родах
- позволяет полностью избежать болевых ощущений в родах
- проводится только для женщин из группы высокого риска
- показал свою полную неэффективность

1341. Выберите правильный ответ

Психопрофилактическая подготовка к родам начинается с

- 32-35 недель беременности
- 12 недель беременности
- 15-16 недель беременности
- 22-24 недель беременности

1342. Выберите правильный ответ

При подготовке к родам лучше, если беременная

- заранее выберет родильный дом, узнает об условиях пребывания там и пройдет курс дородовой подготовки
- не будет из суеверия думать о родах и читать книги для беременных
- прочитает учебник акушерства для специалистов
- посетит несколько родов в родильном зале

1343. Выберите правильный ответ

При первом контакте с беременной в «Школе материнства» необходимо выяснить

отношение ее к беременности, представление беременной о родах, особенность страха перед ними, боязнь боли

- уровень образования
- перенесённые операции и травмы
- размер одежды

1344. Выберите правильный ответ

Занятия в «Школе материнства» с беременными целесообразно начинать с

- 33-34 недель беременности
- 28 недель беременности
- 37-38 недель беременности
- 24 недель беременности

1345. Выберите правильный ответ

Каждая женщина должна проходить гинекологический профилактический осмотр

- 1 раз в год
- 1 раз в 3 года
- 1 раз в 3 месяца
- 1 раз в 5 лет

1346. Выберите правильный ответ

Профилактические гинекологические осмотры должны проходить

- все женщины и девушки, начиная с 16-18 лет
- только женщины репродуктивного возраста
- только женщины, состоящие на диспансерном учёте
- только женщинам, живущим половой жизнью

1347. Выберите правильный ответ

Во время профилактического осмотра обязательным является взятие мазков

- на онкологическое исследование
- на гормональное исследование
- на бакпосев
- на гонококки с провокацией

ПМ.05. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации

МДК.05.01. Реаниматология

1348. Выберите правильный ответ

Максимальная продолжительность клинической смерти при обычных условиях внешней среды (минут)

- 4-5
- 5-6
- 6-8
- 2-3

1349. Выберите правильный ответ

Основной признак клинической смерти

- отсутствие пульса на сонной артерии
- расширение зрачков
- нитевидный пульс на сонной артерии
- отсутствие пульса на лучевой артерии

1350. Выберите правильный ответ

Самая частая причина внезапной смерти

- фибрилляция желудочков
- асистолия
- полная атриовентрикулярная блокада
- экстремальная синусовая брадикардия

1351. Выберите правильный ответ

Терминальные состояния - это состояния

- пограничные между жизнью и смертью
- характеризующиеся кратковременной потерей сознания
- приводящие к резкому снижению АД
- перехода острого заболевания в хроническое заболевание

1352. Выберите правильный ответ

Достоверные признаки клинической смерти
 отсутствие дыхания, сознания, сердцебиения, расширенные зрачки без реакции на свет
 судороги, холодные конечности, тахипноэ, гипотензия
 фибрилляция желудочков, пульс малого наполнения, диспноэ, цианоз
 учащенное дыхание, узкие зрачки без реакции на свет, нитевидный пульс

1353. Выберите правильный ответ

Наиболее частое осложнение при проведении сердечно-легочной реанимации

- перелом ребер
- гидроторакс
- аспирация желудочного содержимого
- анасарка

1354. Выберите правильный ответ

Утопление - это

- аспирация большого количества воды со спазмом мышц гортани
- разновидность механической асфиксии
- состояние удушья
- разновидность странгуляционной асфиксии

1355. Выберите правильный ответ

Вид утопления, при котором клиническая смерть наступает в результате рефлекторной остановки сердца

- синкопальный
- асфиксический
- вторичный
- истинный

1356. Выберите правильный ответ

Аспирация пресной воды вызывает

- избыток жидкости в кровеносном русле, недостаток кислорода в тканях, фибрилляцию желудочков
- избыток жидкости в кровеносном русле
- фибрилляцию желудочков сердца
- недостаток кислорода в тканях

1357. Выберите правильный ответ

Аспирация морской воды вызывает

- снижение ОЦК, сгущение крови, кислородное голодание
- сгущение крови
- кислородное голодание
- снижение ОЦК

1358. Выберите правильный ответ

При асфиксическом утоплении

- характерна первичная асистолия
- наблюдается фибрилляция желудочков
- развивается полная атриовентрикулярная блока
- остановка кровообращения не происходит

1359. Выберите правильный ответ

Асфиксическое утопление характеризуется

- первичным ларингоспазмом
- первичной остановкой кровообращения

- переломом шейного отдела позвоночника
- первичной массивной аспирацией жидкости

1360. Выберите правильный ответ

Истинное утопление характеризуется

- первичной массивной аспирацией жидкости
- первичной остановкой кровообращения
- переломом шейного отдела позвоночника
- первичным ларингоспазмом

1361. Выберите правильный ответ

Синкопальное утопление характеризуется

- первичной остановкой кровообращения
- первичным ларингоспазмом
- переломом шейного отдела позвоночника
- первичной массивной аспирацией жидкости

1362. Выберите правильный ответ

Если ток проходит через сердце и мозг, наблюдается

- потеря сознания, остановка дыхания, фибрилляция желудочков сердца
- потеря сознания и остановка дыхания
- сохранение сознания, остановка дыхания
- потеря сознания

1363. Выберите правильный ответ

При электротравме смерть наступает от

- паралича дыхательного и сосудодвигательного центра
- кровотечения
- термического ожога
- астматического статуса

1364. Выберите правильный ответ

При удушении расстройство дыхания и кровообращения связано

- со сдавлением трахеи, нервных стволов и крупных сосудов, питающих мозг
- с регургитацией
- с экстрасистолией
- с фибрилляцией желудочков

1365. Выберите правильный ответ

Основные механизмы нарушения газообмена в легких

- нарушение альвеолярной вентиляции, диффузию газов через альвеолярно-капиллярную мембрану и капиллярного кровотока
- нарушение диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану
- нарушение капиллярного легочного кровотока
- нарушение альвеолярной вентиляции

1366. Выберите правильный ответ

Противопоказания для сердечно-легочной реанимации

- травмы не совместимые с жизнью
- старческий возраст
- алкоголизм, психические заболевания
- массивная кровопотеря

1367. Выберите правильный ответ

Тройной прием Сафара включает в себя

- запрокидывание головы, выведение нижней челюсти, открытие рта
- выведение нижней челюсти, открытие рта, туалет полости рта
- запрокидывание головы, выведение нижней челюсти, введение воздуховода
- выдвижение нижней челюсти, открытие рта, санация ротовой полости

1368. Выберите правильный ответ

Сердечно-легочная реанимация у взрослых начинается с проведения

- 30 компрессий грудной клетки
- 5 искусственных вдохов
- 15 компрессий грудной клетки
- 3 искусственных вдохов

1369. Выберите правильный ответ

Объем искусственного вдоха при проведении сердечно-легочной реанимации у взрослых составляет (мл)

- 500-600
- 700-800
- 300-400
- 1000-1100

1370. Выберите правильный ответ

Время, затрачиваемое на один искусственный вдох при проведении сердечно-легочной реанимации, должно составлять (секунд)

- 1
- 2
- 3
- 4

1371. Выберите правильный ответ

При проведении сердечно-легочной реанимации адреналин вводится

- внутривенно
- эндотрахеально
- внутримышечно
- подкожно

1372. Выберите правильный ответ

Соотношение между компрессиями грудной клетки и вдуванием воздуха при сердечно-легочной реанимации

- 30:2
- 1:8
- 1:5
- 2:15

1373. Выберите правильный ответ

Место приложения рук при непрямом массаже сердца

- граница между средней и нижней третью грудины
- средняя треть грудины
- верхняя треть грудины
- нижняя треть грудины

1374. Выберите правильный ответ

Нажатие на грудину при непрямом массаже сердца проводится

- проксимальной частью ладони, не сгибая рук в локтях
- всей ладонной поверхностью кисти, не сгибая рук в локтях
- проксимальной частью ладони, согнув руки в локтях
- дистальной частью ладони, не сгибая рук в локтях

1375. Выберите правильный ответ

Частота компрессий грудной клетки при массаже сердца у взрослых

- 80-100 в мин.
- 40-60 в мин.
- 50-70 в мин.
- 100-120 в мин.

1376. Выберите правильный ответ

Сердечно-легочную реанимацию обязаны проводить

- все специалисты со средним и высшим медицинским образованием
- только врачи и фельдшеры
- только врачи и медсестры реанимационных отделений
- только врачи

1377. Выберите правильный ответ

Показания для проведения сердечно-легочной реанимации

- клиническая смерть
- коматозные состояния
- ортостатический коллапс
- нарушение сердечного ритма

1378. Выберите правильный ответ

Критерии эффективности реанимации

- пульс на сонной артерии
- экскурсия грудной клетки
- сужение зрачков
- экскурсия грудной клетки и сужение зрачков

1379. Выберите правильный ответ

Эффективная реанимация проводится

- 30 минут
- 10 минут
- 5 минут
- до восстановления самостоятельной сердечной деятельности

1380. Выберите правильный ответ

Непрямой массаж сердца при сердечно-легочной реанимации новорожденному проводится

- ладонной поверхностью первой фаланги большого пальца (или больших пальцев обеих рук), остальные пальцы помещаются под спину ребенка
- указательным и средним пальцами
- проксимальной частью ладони
- двумя руками, сложенными крест-накрест в виде «бабочки»

1381. Выберите правильный ответ

Непрямой массаж сердца при сердечно-легочной реанимации ребенку от 1 до 12 месяцев проводится

- указательным и средним пальцами
- проксимальной частью ладони
- двумя руками, сложенными крест-накрест в виде «бабочки»
- ладонной поверхностью первой фаланги большого пальца (или больших пальцев обеих рук), остальные пальцы помещаются под спину ребенка

1382. Выберите правильный ответ

Непрямой массаж сердца при сердечно-легочной реанимации ребенку от 1 до 7 лет проводится

- проксимальной частью ладони
- двумя руками, сложенными крест-накрест в виде «бабочки»
- указательным и средним пальцами
- ладонной поверхностью первой фаланги большого пальца (или больших пальцев обеих рук), остальные пальцы помещаются под спину ребенка

1383. Выберите правильный ответ

Непрямой массаж сердца при сердечно-легочной реанимации ребенку старше 7 лет проводится

- двумя руками, как у взрослых
- проксимальной частью ладони
- указательным и средним пальцами
- ладонной поверхностью первой фаланги большого пальца (или больших пальцев обеих рук), остальные пальцы помещаются под спину ребенка

1384. Выберите правильный ответ

При запрокидывании головы ребенка кзади во время проведения сердечно-легочной реанимации обеспечивается

- выпрямление дыхательных путей
- предотвращение западения языка
- улучшение мозгового кровотока
- улучшение сердечного ритма

1385. Выберите правильный ответ

Положение новорожденного при проведении первичной реанимационной помощи новорожденному при асфиксии

- на спине с валиком под плечами со слегка запрокинутой головой и опущенным на 15° головным концом кровати
- на спине с валиком под плечами со слегка запрокинутой головой и опущенным на 15° ножным концом кровати
- на спине с валиком под плечами со слегка запрокинутой головой на ровной поверхности
- на животе на ровной поверхности, голова повернута на бок

1386. Выберите правильный ответ

Метод тактильной стимуляции дыхания при проведении первичной реанимационной помощи новорожденному при асфиксии

- похлопывания новорожденного по стопам или поглаживания по спине в течение 10-15 секунд
- раздражение слизистой носа катетером
- раздражение слизистой полости рта
- хлопок по ягодицам

1387. Выберите правильный ответ

При проведении первичной реанимационной помощи новорожденному при асфиксии ИВЛ на догоспитальном этапе проводится

- с помощью дыхательного мешка Амбу
- «рот в рот»
- «рот в нос»
- аппаратом ИВЛ

1388. Выберите правильный ответ

При попадании ребенку инородного тела в дыхательные пути следует

- провести прием Геймлиха
- уложить на спину, повернув голову на бок
- нажать шпателем на корень языка
- дать выпить теплое щелочное питье

1389. Выберите правильный ответ

Прием Геймлиха у детей старше года осуществляют в положении

- стоя
- сидя или лежа на боку
- лежа на спине
- лежа на животе

МДК.05.02. Осуществление скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах

1390. Выберите правильный ответ

Осложнения гипертонического криза

- инсульт, инфаркт миокарда
- обморок, коллапс
- ревмокардит, порок сердца
- пневмония, плеврит

1391. Выберите правильный ответ

Отек легких - форма острой недостаточности

- левожелудочковой
- коронарной
- дыхательной
- сосудистой

1392. Выберите правильный ответ

На фоне гипертонического криза появились удушье и обильная пенная розовая мокрота - это

- отек легких
- легочное кровотечение
- долевая пневмония
- тромбоэмболия легочной артерии

1393. Выберите правильный ответ

Клокочущее дыхание и розовая пенная мокрота наблюдаются при

- отеке легких
- коллапсе

- обмороке
- бронхоспазме

1394. Выберите правильный ответ

Основной симптом сердечной астмы

- инспираторное удушье
- головокружение
- тошнота
- экспираторное удушье

1395. Выберите правильный ответ

Состояние, относящееся к синдрому острой сердечной недостаточности

- отек легких
- коллапс
- обморок
- шок

1392. Выберите правильный ответ

Сердечная астма - проявление острой недостаточности

- левожелудочковой
- коронарной
- дыхательной
- сосудистой

1396. Выберите правильный ответ

Внезапное начало и внезапное окончание приступа тахикардии от 120 до 200 уд/мин. характерно для

- пароксизмальной тахикардии
- синусовой тахикардии
- мерцания предсердий
- фибрилляции желудочков

1397. Выберите правильный ответ

Клиника синдрома Морганьи-Эдамса-Стокса

- потеря сознания, пульс не определяется, тоны сердца не слышны
- головная боль
- артериальная гипертензия
- пульс полный, напряженный, тахикардия

1398. Выберите правильный ответ

Коллапс - проявление острой недостаточности

- сосудистой
- левожелудочковой
- правожелудочковой
- коронарной

1399. Выберите правильный ответ

Дегтеобразный стул бывает при кровотечении из кишки

- поперечно-ободочной
- сигмовидной
- прямой
- 12-перстной

1400. Выберите правильный ответ

Печеночная колика наблюдается при

- желчнокаменной болезни
- панкреатите
- хроническом гепатите
- циррозе печени

1401. Выберите правильный ответ

При печеночной колике боль локализуется в области

- правой подреберной
- левой подвздошной
- левой подреберной
- правой подвздошной

1402. Выберите правильный ответ

При печеночной колике развивается желтуха

- механическая
- гемолитическая
- паренхиматозная
- надпеченочная

1403. Выберите правильный ответ

Положительный френкикус-симптом возникает при

- печеночной колике
- остром гастрите
- почечной колике
- циррозе печени

1404. Выберите правильный ответ

Приступ сильной боли в пояснице с иррадиацией по ходу мочеточника, в паховую область наблюдается при

- мочекаменной болезни
- пиелонефрите
- цистите
- гломерулонефрите

1405. Выберите правильный ответ

При почечной колике в моче наблюдается

- гематурия
- кетонурия
- глюкозурия
- бактериурия

1406. Выберите правильный ответ

При почечной колике боль чаще иррадирует

- в паховую область
- под левую лопатку
- в правое плечо
- под правую лопатку

1407. Выберите правильный ответ

Острое осложнение сахарного диабета

- гипогликемическая кома
- ретинопатия
- макроангиопатия
- полинейропатия

1408. Выберите правильный ответ

При гипогликемической коме кожные покровы

- гиперемированы
- цианотичные
- желтушные
- сухие

1409. Выберите правильный ответ

При гипогликемической коме в выдыхаемом воздухе отмечается запах

- нет запаха

- аммиака
- ацетона
- алкоголя

1410. Выберите правильный ответ

Причины острой дыхательной недостаточности

- снижение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе, закупорка дыхательных путей, слабость дыхательной мускулатуры
- закупорка дыхательных путей, кровохарканье
- слабость дыхательной мускулатуры,
- снижение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе

1411. Выберите правильный ответ

Ранние симптомы острой дыхательной недостаточности

- одышка до 20-24 в минуту, цианоз
- нарушение сознания, цианоз
- нарушение сознания, тахикардия
- повышение АД, тахикардия

1412. Выберите правильный ответ

Причины нарушения проходимости дыхательных путей

- западение языка, обструкция инородными телами, скопление мокроты в трахее и бронхах
- обструкция инородными телами
- скопление мокроты в трахее и бронхах
- западение языка

1413. Выберите правильный ответ

Характерные симптомы острой дыхательной недостаточности

- одышка, кашель, цианоз кожи, повышение АД, повышение ЦВД
- боли в животе, головокружение, похолодание конечностей, цианоз кожи
- боли в области сердца, одышка, головная боль, перебои в работе сердца
- головная боль, потемнение в глазах, кашель с гнойной мокротой

1414. Выберите правильный ответ

Для комы характерно

- потеря сознания с угнетением дыхания, кровообращения и выпадение рефлексов
- потеря сознания с угнетением кровообращения
- утрата сознания и выпадение разнообразных рефлексов
- потеря сознания с угнетением дыхания

1415. Выберите правильный ответ

Вид комы, развивающийся при черепно-мозговой травме

- травматическая (мозговая)
- токсическая
- гипоксическая
- почечная

1416. Выберите правильный ответ

Наибольшие опасности судорожного синдрома

- нарушение вдоха и обструкция дыхательных путей
- перелом конечностей, нарушение дыхания и большая трата энергии
- непроизвольная мышечная работа с тратой энергии и кислорода
- падение с кровати и нарушение дыхания

1417. Выберите правильный ответ

Основной признак коматозного состояния

- угнетение центральной нервной системы
- угнетение дыхания
- угнетение гемодинамики
- угнетение периферической нервной системы

1418. Выберите правильный ответ

Глубина коматозного состояния определяется по

- степени угнетения рефлексов
- степени угнетения сознания
- выраженности гемодинамических расстройств
- степени угнетения дыхания

1419. Выберите правильный ответ

Аспирационно-обтурационные нарушения дыхания могут развиваться

- при коме любой глубины
- при глубокой коме
- при поверхностной коме
- не развиваются

1420. Выберите правильный ответ

Угнетение дыхательного центра развивается

- при коме любой глубины
- с глубокой комой
- с поверхностной комой
- не развивается

1421. Выберите правильный ответ

Обморок - это

- внезапная кратковременная потеря сознания
- потеря сознания с нарушением двигательных, чувствительных и соматических функций, в том числе, жизненно важных
- внезапное уменьшение сердечного выброса, сопровождающееся продолжительным снижением систолического АД менее 90 мм.рт.ст. и признаками нарушения перфузии органов и тканей
- резкий подъём артериального давления

1422. Выберите правильный ответ

При коллапсе наблюдается

- снижение АД
- нарушение микроциркуляции и тканевой перфузии
- олигурия
- генерализованное нарушение функции клеток

1423. Выберите правильный ответ

К гиповолемическому относится шок

- травматический
- кардиогенный
- анафилактический
- инфекционно-токсический

1424. Выберите правильный ответ

При сосудистом (перераспределительном) шоке происходит

- уход крови в депо-органы брюшной полости
- потеря крови
- резкое снижение сократительной способности миокарда
- абсолютное снижение ОЦК

1425. Выберите правильный ответ

При шоке нарушение функции почек, проявляется

- олигурией
- полиурией
- поллакиурией
- никтурией

1426. Выберите правильный ответ

Ведущий механизм развития анафилактического шока

- первичное снижение сосудистого тонуса
- снижение сократительной способности миокарда
- уменьшение объема циркулирующей крови
- препятствие выбросу крови в аорту

1427. Выберите правильный ответ

Гиповолемический шок 1 степени возникает при дефиците объема циркулирующей крови

- 10%
- 20%
- 30-40%
- более 40%

1428. Выберите правильный ответ

Для шока 3 степени характерно систолическое артериальное давление

- ниже 60 мм.рт.ст.
- 60-80 мм.рт.ст.
- 90-100 мм.рт.ст.
- 100-120 мм.рт.ст.

1429. Выберите правильный ответ

Характерные признаки алкогольной комы

- нарушение сознания, мидриаз, снижение температуры, снижение артериального давления, гиперсаливация
- нарушение сознания, на коже сине-багровые пятна, повышение артериального давления
- нарушение сознания, миоз, на локтевых сгибах следы от инъекций, апноэ
- сознание спутанное, выраженное чувство голода, анизокория

1430. Выберите правильный ответ

Признаки отравления метиловым спиртом

- нарушение зрения, нитевидный пульс, одышка, головная боль, снижение артериального давления, рвота, частый жидкий стул, боли в животе
- рвота с примесью алой крови, снижение артериального давления, увеличение печени
- рвота «кофейной гущей», слабость, снижение АД

- рвота, частый жидкий стул, боли в животе

1431. Выберите правильный ответ

Острое осложнение при отравлениях едкими веществами

- перфорация пищевода или желудка
- острая печеночная недостаточность
- острая дыхательная недостаточность
- острая сердечная недостаточность

1432. Выберите правильный ответ

Отек Квинке прежде всего появляется

- в области губ, щек, век, лба, волосистой части головы
- на передней брюшной стенке
- в поясничной области
- на нижних конечностях

1433. Выберите правильный ответ

Клинические признаки цереброваскулярной комы

- быстрое угнетение сознания, неврологическая симптоматика на фоне гемодинамических нарушений
- повторная потеря сознания после «светлого промежутка»
- развивается внезапно, выключение сознания и судороги начинаются одновременно
- острое развитие на фоне выраженной гипертермии

1434. Выберите правильный ответ

Клинические признаки опиатной комы

- угнетение дыхания, цианоз, сужение зрачков, брадикардия, артериальная гипотония
- гиперемия лица, сухость кожи, расширение зрачков, тахикардия, тахипноэ
- бледность кожи, расширение зрачков, нитевидный пульс, поверхностное дыхание
- потливость, бронхорея, гиперсаливация, сужение зрачков, гипотермия

1435. Выберите правильный ответ

Ведущий патогенетический фактор в нарушении дыхания при опиатной коме

- угнетение дыхательного центра
- слабость дыхательной мускулатуры
- обтурационно-аспирационные расстройства
- нарушение легочной микроциркуляции

1436. Выберите правильный ответ

Паралич дыхательной мускулатуры развивается при отравлении

- фосфорорганическими веществами
- дихлорэтаном
- героином
- кокаином

1437. Выберите правильный ответ

Токсический отек легких развивается при остром отравлении

- газами раздражающего или удушающего действия
- клофелином

- барбитуратами
- дихлорэтаном

1438. Выберите правильный ответ

Головная боль, нарушение сознания, инспираторная одышка, малиновая окраска кожи характерны для отравления

- угарным газом
- хлором
- аммиаком
- сероводородом

1439. Выберите правильный ответ

Отравление считается суицидальным, если пациент

- умышленно выпил яд с целью самоубийства
- по ошибке выпил неизвестную жидкость
- выпил жидкость, предварительно кем-то отравленную
- съел несвежие продукты

1440. Выберите правильный ответ

Вынужденное положение при приступе бронхиальной астмы

- сидя, опираясь руками
- горизонтальное с приподнятыми ногами
- лежа на боку
- горизонтальное

1441. Выберите правильный ответ

При легочном кровотечении кровь бывает

- алая, пеннистая
- темная, со сгустками
- цвета «кофейной гущи»
- темная, пеннистая

1442. Выберите правильный ответ

Легочное кровотечение может возникнуть при

- абсцессе легкого
- бронхиальной астме
- остром бронхите
- экссудативном плеврите

1443. Выберите правильный ответ

Приступообразная боль за грудиной давящего характера, проходящая после приёма нитроглицерина

- стенокардия
- инфаркт миокарда
- плеврит
- перикардит

1444. Выберите правильный ответ

Сжимающие боли за грудиной, иррадиирующие под левую лопатку, продолжительностью 5-10 мин., характерны для

- стенокардии
- инфаркта миокарда
- ревматического эндокардита
- бактериального эндокардита

1445. Выберите правильный ответ

Интенсивная боль за грудиной жгучего характера с широкой зоной иррадиации, не проходящая от нитроглицерина характерна для

- инфаркта миокарда
- стенокардии
- плеврита
- перикардита

1446. Выберите правильный ответ

Осложнение инфаркта миокарда

- фибрилляция желудочков
- пневмоторакс
- перфорация язвы
- бронхоспазм

1447. Выберите правильный ответ

Типичная форма инфаркта миокарда

- ангинозная
- абдоминальная
- астматическая
- церебральная

1448. Выберите правильный ответ

Боли в животе наблюдаются при форме инфаркта миокарда

- абдоминальной
- астматической
- аритмической
- ангинозной

1449. Выберите правильный ответ

Зону некроза на ЭКГ при инфаркте миокарда отражает зубец

- P
- Q
- R
- S

1450. Выберите правильный ответ

Клинические симптомы кардиогенного шока

- резкое снижение АД, частый нитевидный пульс
- лихорадка, кашель с «ржавой» мокротой
- лихорадка, лимфаденопатия
- резкое повышение АД, напряженный пульс

1451. Выберите правильный ответ

Приступ удушья наблюдается при форме инфаркта миокарда

- астматической
- ангинозной
- аритмической
- безболевой

1452. Выберите правильный ответ

Сильная головная боль, тошнота, рвота, «мушки» перед глазами, напряженный пульс наблюдаются при

- гипертоническом кризе
- коллапсе
- обмороке
- стенокардии

1453. Выберите правильный ответ

Характер и локализация болей при остром аппендиците

- постоянные, сильные боли в правой подвздошной области

- постоянные, резкие боли в правом подреберье
- опоясывающие, тупого характера
- «кинжальные» в эпигастрии

1454. Выберите правильный ответ

Синдром острой кровопотери может наблюдаться при

- желудочном кровотечении
- стенозирующей язве
- перфоративной язве
- пенетрирующей язве

1455. Выберите правильный ответ

Причина травматического шока

- болевой фактор
- интоксикация
- нарушение дыхания
- психическая травма

1456. Выберите правильный ответ

Симптом осложненного перелома тела позвонка

- ниже места повреждения отсутствуют все виды чувствительности
- движения в конечностях сохранены
- нарушений со стороны мочеиспускания нет
- характерно учащенное мочеиспускание

1457. Выберите правильный ответ

Симптом торпидной фазы шока

- падение АД, тахикардия
- падение АД, брадикардия
- потеря сознания
- повышение температуры

1458. Выберите правильный ответ

Достоверный признак перелома

- патологическая подвижность
- боль
- пружинящая фиксация
- отсутствие активных движений

1459. Выберите правильный ответ

Абсолютный признак перелома основания черепа

- ликворея из носа (слухового проход+)
- разлитая головная боль
- психомоторное возбуждение
- утрата сознания в момент травмы

1460. Выберите правильный ответ

Для сдавления головного мозга характерно

- наличие «светлого промежутка»
- ретроградная амнезия
- нарушение сна
- колебания АД

1461. Выберите правильный ответ

Подкожная эмфизема указывает на повреждение

- легкого
- сердца
- глотки
- пищевода

1462. Выберите правильный ответ

Сотрясение головного мозга от ушиба отличается

- отсутствием очаговой симптоматики
- наличием «светлого промежутка»
- наличием повышенного АД
- нарушением сна

1463. Выберите правильный ответ

Симптом клапанного пневмоторакса

- нарастающая одышка
- урежение пульса
- усиление дыхательных шумов
- отечность тканей

1467. Выберите правильный ответ

При «розовом» типе лихорадки у ребенка

- теплоотдача соответствует теплопродукции
- теплоотдача превышает теплопродукцию
- теплопродукция превышает теплоотдачу
- теплоотдача и теплопродукция снижены

1465. Выберите правильный ответ

При «бледном» типе лихорадки у ребенка

- теплоотдача соответствует теплопродукции
- теплоотдача превышает теплопродукцию
- теплопродукция превышает теплоотдачу
- теплоотдача и теплопродукция снижены

1466. Выберите правильный ответ

Симптом «розового» типа лихорадки у детей

- кожные покровы теплые, влажные, «лихорадочный» румянец
- общее состояние страдает значительно
- дистальные отделы холодные на ощупь, озноб
- кожные покровы бледные, с мраморным оттенком

1467. Выберите правильный ответ

Симптом «бледного» типа лихорадки у детей

- дистальные отделы холодные на ощупь, озноб
- общее состояние страдает незначительно
- кожные покровы теплые, влажные, «лихорадочный» румянец
- теплоотдача соответствует теплопродукции

1468. Выберите правильный ответ

При «бледном» типе лихорадки у детей есть риск развития

- коллапса
- анафилактического шока
- эксикоза
- носового кровотечения

1469. Выберите правильный ответ

Высокая фебрильная (пиретическая) лихорадка

- температура 39,6°C
- температура 38,6°C
- температура 37,6°C
- температура 36,6°C

1470. Выберите правильный ответ

При ОРВИ у детей может возникнуть неотложное состояние

- фебрильные судороги
- анорексия
- приступообразный кашель

головная боль

1471. Выберите правильный ответ

Внезапное появление у ребенка 2-х лет лающего кашля, осиплости голоса и стенотического дыхания характерно для

- острого обструктивного ларингита
- приступа бронхиальной астмы
- острого обструктивного бронхита
- острого тонзиллита

1472. Выберите правильный ответ

Ведущий клинический симптом обструктивного бронхита у детей

- экспираторная одышка
- лихорадка
- инспираторная одышка
- слабость

1473. Выберите правильный ответ

Внезапное появление ночью у ребенка 2-х лет лающего кашля, осиплости голоса и инспираторной одышки характерно для развития

- обструктивного ларингита
- обструктивного бронхита
- острого тонзиллита
- приступа бронхиальной астмы

1474. Выберите правильный ответ

При кетоацидотической коме кожные покровы

- сухие
- влажные
- желтушные
- гиперемированные

1475. Выберите правильный ответ

При кетоацидотической коме в выдыхаемом воздухе отмечается запах

- ацетона
- аммиака
- алкоголя
- нет запаха

1476. Выберите правильный ответ

Причина возникновения гипогликемической комы

- передозировка инсулина
- малоподвижный образ жизни
- недостаточная доза инсулина
- избыточный прием углеводов

1477. Выберите правильный ответ

Симптомы тиреотоксического криза

- артериальная гипертензия, психическое возбуждение, гипертермия
- артериальная гипотензия, кожные покровы сухие
- артериальная гипертензия, брадикардия
- артериальная гипертензия, гипотермия

1478. Выберите правильный ответ

Признак печёночной комы

- сладкий, печеночный запах
- запах аммиака
- запах ацетона

запах алкоголя

1479. Выберите правильный ответ

При уремической коме в выдыхаемом воздухе отмечается запах

- аммиака
- алкоголя
- ацетона
- сероводорода

1480. Выберите правильный ответ

Заболевание, осложняющееся кетоацидотической комой

- сахарный диабет
- ишемическая болезнь сердца
- гипертоническая болезнь
- язвенная болезнь желудка

1481. Выберите правильный ответ

К аллергической реакции немедленного типа относят

- анафилактический шок
- инфекционно-зависимую бронхиальную астму
- реакцию на туберкулин
- контактный дерматит

1482. Выберите правильный ответ

Клинические симптомы отека Квинке

- отек лица, затруднение дыхания
- повышение АД, рвота
- кожный зуд, падение АД
- потеря сознания, повышение АД

1483. Выберите правильный ответ

Резкое падение АД наблюдается при

- анафилактическом шоке
- крапивнице
- отеке Квинке
- сывороточной болезни

1484. Выберите правильный ответ

Постепенное медленное снижение артериального давления показано, если гипертонический криз осложняется

- ишемическим инсультом
- расслаивающей аневризмой аорты
- острым коронарным синдромом
- нарушением ритма сердца

1485. Выберите правильный ответ

К ассоциированному клиническому состоянию при артериальной гипертензии относится

- расслаивающая аневризма аорты
- аортальный стеноз
- аортальная недостаточность
- трикуспидальная недостаточность

1486. Выберите правильный ответ

Самой частой причиной коронарной недостаточности является

- атеросклероз коронарных артерий
- «мышечный» мостик
- коронариит
- гипертрофия левого желудочка

1487. Выберите правильный ответ

Боль в грудной клетке, на фоне внезапно появившейся одышки, характерна для

- тромбоза легочной артерии
- расслаивающейся аневризмы аорты
- острого перикардита
- грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

1488. Выберите правильный ответ

Субъективный симптом кровотечения

- головокружение
- бледность
- тахикардия
- гипотония

1489. Выберите правильный ответ

АД при III стадии геморрагического шока ниже

- 70 мм.рт.ст.
- 120 мм.рт.ст.
- 80 мм.рт.ст.
- 100 мм.рт.ст.

1490. Выберите правильный ответ

Признак кровотечения в плевральную полость

- притупление перкуторного звука на стороне кровотечения
- рвота кофейной гущей
- алая пенящаяся кровь из полости рта
- кровохарканье

1491. Выберите правильный ответ

Ведущий симптом острого живота

- боль
- слюнотечение
- отсутствие аппетита
- повышенный аппетит

1492. Выберите правильный ответ

Характерный признак повреждения селезенки

- симптом скопления жидкости в брюшной полости
- отек передней брюшной стенки
- втянутость брюшной стенки
- «доскообразный» живот

1493. Выберите правильный ответ

Симптом Ситковского наблюдается при

- остром аппендиците
- остром панкреатите
- остром холецистите
- почечной колике

1494. Выберите правильный ответ

Рвота при остром панкреатите

- многократная, не приносящая облегчения
- однократная
- многократная, приносящая облегчение
- отсутствует

1495. Выберите правильный ответ

При приступе бронхиальной астмы ребенок садится, опираясь руками на край сидения с целью

- облегчения дыхания

- облегчения кашля
- снижения АД
- снижения температуры тела

1496. Выберите правильный ответ

При приступе бронхиальной астмы у ребенка над легкими аускультативно определяются

- сухие и влажные разнокалиберные хрипы на фоне жесткого дыхания
- крепитация на фоне ослабленного дыхания
- шум трения плевры
- шум трения перикарда

1497. Выберите правильный ответ

Характер одышки при приступе бронхиальной астмы у детей

- экспираторный
- инспираторный
- смешанный
- одышка отсутствует

1498. Выберите правильный ответ

Тахипноэ и цианоз носогубного треугольника после физической нагрузки у ребенка грудного возраста

- ДН I
- ДН II
- ДН III
- отсутствие ДН

1499. Выберите правильный ответ

Признак ДН II у ребенка раннего возраста

- одышка в покое с участием вспомогательной мускулатуры
- нарушение сознания, судороги
- соотношение частоты дыхательных движений и пульса 1:4
- появление одышки и цианоза после физической нагрузки

1500. Выберите правильный ответ

Симптомы, позволяющие заподозрить инородное тело верхних дыхательных путей у ребенка

- затрудненное шумное дыхание, возникшее внезапно, инспираторная одышка, приступообразный кашель
- нарушение сознания, судороги
- повышение температуры тела, кашель, нарастание интоксикации
- появление одышки и цианоза после физической нагрузки

1501. Выберите правильный ответ

Симптомы, позволяющие заподозрить у ребенка обморок

- внезапная потеря сознания, бледность, холодный пот, снижение АД
- нарушение сознания, судороги
- затрудненное шумное дыхание, возникшее внезапно, инспираторная одышка, приступообразный кашель
- повышение температуры тела, кашель

1502. Выберите правильный ответ

Симптомы, позволяющие заподозрить развитие эксикоза у ребенка раннего возраста

- сухость кожи, слизистых, западение большого родничка
- гипертермия
- отказ от еды, тошнота
- головная боль, рвота

1503. Выберите правильный ответ

Симптомы, позволяющие заподозрить развитие у ребенка крапивницы

- внезапное начало, появление уртикарной сыпи, интенсивный зуд кожи, чихание, обильные водянистые выделения из носа
- возникновение приступа экспираторной одышки
- острое появление ограниченного отека кожи, подкожной клетчатки, слизистых
- чихание, обильные водянистые выделения из носа

1504. Выберите правильный ответ

Симптомы, позволяющие заподозрить развитие у ребенка отека Квинке

- острое появление ограниченного отека кожи, подкожной клетчатки, слизистых
- возникновение приступа экспираторной одышки
- чихание, обильные водянистые выделения из носа
- внезапное начало, появление уртикарной сыпи, интенсивный зуд кожи

1505. Выберите правильный ответ

Сердечно-сосудистые симптомы при анафилактическом шоке у ребенка

- тахикардия, снижение АД вплоть до коллапса
- тахикардия, повышение АД
- тахикардия, АД в норме
- изменений нет

1506. Выберите правильный ответ

Желудочно-кишечные симптомы при анафилактическом шоке у ребенка

- резкие боли в животе, тошнота, рвота
- диарея
- метеоризм
- отрыжка, изжога

1507. Выберите правильный ответ

Возможная причина развития гипогликемической комы у ребенка с сахарным диабетом

- избыточное введение инсулина при недостаточном приеме пищи
- нарушение диеты (избыток углеводов)
- недостаточная доза инсулина
- острое инфекционное заболевание

1508. Выберите правильный ответ

Возможная причина развития кетоацидотической комы у ребенка с сахарным диабетом

- нарушение диеты (избыток углеводов)
- избыточное введение инсулина при неадекватном приеме пищи
- запоздалый прием пищи после введения инсулина
- физическое и психическое перенапряжение

1509. Выберите правильный ответ

Симптомы, позволяющие заподозрить менингококковую инфекцию у ребенка

- геморрагическая сыпь звездчатого характера на фоне высокой лихорадки
- пятнисто-папулезная сыпь, синдром катарального воспаления верхних дыхательных путей, лихорадка
- мелкоточечная сыпь, бледный носогубный треугольник, острый тонзиллит, лихорадка
- везикулезная сыпь на фоне умеренно выраженной лихорадки

1510. Выберите правильный ответ

При переломе бедра необходимо фиксировать

- тазобедренный, голеностопный, коленный суставы
- тазобедренный и коленный суставы
- тазобедренный сустав
- место перелома

1511. Выберите правильный ответ

Транспортировать пострадавшего с травмой груди следует в положении

- полусидя
- горизонтальном
- вертикальном
- с приподнятым ножным концом

1512. Выберите правильный ответ

При повреждении шейного отдела позвоночника с целью транспортной иммобилизации используют

- шину-воротник транспортную
- ватно-марлевые кольца Дельбе
- крестообразную повязку
- шину Крамера

1513. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при кровотечении из геморроидальных узлов

- тампонада на область заднего прохода
- газоотводная трубка
- повязка с фурацилиновой мазью
- очистительная клизма

1514. Выберите правильный ответ

Тактика фельдшера при выпадении слизистой прямой кишки

- вправление слизистой прямой кишки
- введение спазмолитиков
- введение прозерина
- примочки с теплым раствором фурацилина

1515. Выберите правильный ответ

При геморрагическом шоке на догоспитальном этапе следует перелить

- кровезаменители
- альбумин
- плазму
- цельную кровь

1516. Выберите правильный ответ

Артериальное кровотечение из раны в верхней трети предплечья можно остановить путем сгибания руки

- в локтевом суставе
- в плечевом и локтевом суставах
- в плечевом суставе
- в лучезапястном суставе

1517. Выберите правильный ответ

Пациента с массивной кровопотерей транспортируют

- лежа с приподнятым ножным концом
- лежа на животе
- полусидя
- лежа с опущенными ногами

1518. Выберите правильный ответ

При переломах костей таза пациента транспортируют в положении

- на спине, на щите в положении «лягушки»
- на спине на мягких носилках
- на животе
- полусидя

1519. Выберите правильный ответ

Тактика фельдшера при ущемленной грыже

- срочная госпитализация
- грелка на живот
- вправление грыжи
- очистительная клизма

1520. Выберите правильный ответ

Тактика фельдшера при травме мочевого пузыря

- холод на зону травмы, срочная госпитализация
- введение мочегонных средств
- введение нитрофурановых препаратов
- катетеризация

1521. Выберите правильный ответ

Способ временной остановки наружного артериального кровотечения

- наложение кровоостанавливающего жгута
- местное применение холода
- наложение давящей повязки
- приподнятое положение конечности

1522. Выберите правильный ответ

Тактика фельдшера при закрытом вывихе

- транспортная иммобилизация
- тепло на место травмы
- наложение давящей повязки
- асептическая повязка

1523. Выберите правильный ответ

При растяжении связок сустава необходимо в первую очередь

- наложить тугую повязку
- произвести вытяжение конечности

- применить тепло на место повреждения
- остановить кровотечение

1524. Выберите правильный ответ

Шину Крамера накладывают при переломе

- костей конечности
- ребер
- костей таза
- позвоночника

1525. Выберите правильный ответ

Основное правило наложения шины

- с захватом не менее 2-х суставов, расположенных выше и ниже места перелома
- с захватом сустава, расположенного выше места перелома
- с захватом сустава, расположенного ниже места перелома
- только на место перелома

1526. Выберите правильный ответ

Пациента с инородным телом дыхательных путей следует транспортировать в положении

- сидя или полусидя
- лежа на спине
- лежа на животе
- лежа с опущенной головой

1527. Выберите правильный ответ

Сонная артерия при кровотечении из нее прижимается

- к VI шейному позвонку
- к ключице
- к углу нижней челюсти
- к височной кости

1528. Выберите правильный ответ

При ушибах в первую очередь необходимо

- применить пузырь со льдом
- наложить согревающий компресс
- сделать массаж
- ввести обезболивающие средства

1529. Выберите правильный ответ

При переломе плеча необходимо фиксировать

- лучезапястный сустав, локтевой и плечевой суставы
- локтевой и плечевой суставы
- место перелома
- плечевой сустав

1530. Выберите правильный ответ

Окклюзионная повязка накладывается при

- проникающем ранении груди
- ампутации конечности
- рубленой ране плеча
- проникающем ранении живота

1531. Выберите правильный ответ

Показание для наложения кровоостанавливающего жгута

- травматическая ампутация конечности
- кровотечение из вен голени
- кровотечение при ранении сонной артерии

- кровотечение при разрыве селезенки

1532. Выберите правильный ответ

Тактика при переломах ребер без повреждения органов грудной клетки

- обезболивание, транспортировка в полусидячем положении
- наложение транспортной шины
- наложение циркулярной давящей повязки
- наложение окклюзионной повязки

1533. Выберите правильный ответ

При носовом кровотечении вследствие перелома основания черепа необходимо

- выполнить переднюю тампонаду
- выполнить переднюю и заднюю тампонаду
- выполнить заднюю тампонаду
- отсосать кровь из носовых ходов

1534. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при черепно-мозговой травме заключается в применении

- пузыря со льдом на голову
- наркотиков
- противорвотных препаратов
- кордиамина

1535. Выберите правильный ответ

При сдавлении грудной клетки пострадавшему нужно

- придать полусидячее положение
- уложить на бок
- уложить на живот
- уложить на спину

1536. Выберите правильный ответ

Для профилактики и борьбы с отеком мозга применяют

- дегидратационную терапию
- введение обезболивающих
- оксигенотерапию
- введение спазмолитиков

1537. Выберите правильный ответ

При оказании неотложной помощи пациенту с открытым пневмотораксом необходимо

- наложить окклюзионную повязку
- выполнить новокаиновую блокаду
- ввести спазмолитики
- наложить шину Крамера

1538. Выберите правильный ответ

Пациенту в состоянии астматического статуса необходимо ввести

- глюкокортикостероиды
- диуретики
- периферические вазодилататоры
- защищенные пенициллины

1539. Выберите правильный ответ

Беродуал является

- комбинацией адrenomиметика и холинолитика
- ингаляционным глюкокортикостероидом
- коротко действующий адrenomиметиком

- пролонгированным холинолитиком

1540. Выберите правильный ответ

Подключичная артерия при кровотечении прижимается

- к I ребру
- к ключице
- к VI шейному позвонку
- к углу нижней челюсти

1541. Выберите правильный ответ

Способ временной остановки наружного артериального кровотечения

- наложение кровоостанавливающего жгута
- местное применение холода
- наложение давящей повязки
- приподнятое положение конечности

1542. Выберите правильный ответ

При застое крови в малом круге кровообращения положение пациента

- полусидячее
- лежа с приподнятыми ногами
- коленно-локтевое
- горизонтальное

1543. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при гипогликемической коме

- глюкоза внутривенно
- морфин внутривенно
- актрапид подкожно
- эпинефрин внутривенно

1544. Выберите правильный ответ

При отеке легких на фоне высокого артериального давления применяют

- эналаприлат
- гепарин
- эпинефрин (адреналин)
- допамин

1545. Выберите правильный ответ

При лечении отека гортани применяют

- преднизолон
- диклофенак
- нитроглицерин
- каптоприл

1546. Выберите правильный ответ

Анафилактический шок чаще возникает при введении лекарственного препарата

- парентерально
- ингаляционно
- внутрь
- сублингвально

1547. Выберите правильный ответ

Анафилактический шок чаще вызывают аллергены

- лекарственные
- бытовые
- пищевые
- пыльцевые

1548. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при гипогликемическом состоянии

- напоить сладким чаем
- актрапид в/в
- напоить отваром шиповника
- гепарин в/в

1549. Выберите правильный ответ

При лечении кетоацидотической комы на догоспитальном этапе применяют

- физиологический раствор внутривенно капельно
- инсулин подкожно
- фуросемид внутривенно
- преднизолон внутривенно

1550. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при желудочковой форме пароксизмальной тахикардии

- амиодарон
- эналаприл
- метопролол
- аминофиллин (эуфиллин)

1551. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при желудочном кровотечении

- этамзилат
- альмагель
- омепразол
- кеторолак

1552. Выберите правильный ответ

Промывание желудка необходимо провести

- при пищевом отравлении
- при пищеводном кровотечении
- при абдоминальной форме инфаркта миокарда
- при желудочном кровотечении

1553. Выберите правильный ответ

Противопоказание для промывания желудка

- желудочное кровотечение
- отравление алкоголем
- стеноз привратника
- пищевое отравление

1554. Выберите правильный ответ

Оксигенотерапия через пеногасители обязательна при

- альвеолярном отеке легких
- обмороке
- бронхиальной астме
- стенокардии

1555. Выберите правильный ответ

При отеке легких на фоне низкого давления применяют

- допамин
- фуросемид
- сальбутамол
- аминофиллин (эуфиллин)

1556. Выберите правильный ответ

При подозрении на травму шейного отдела позвоночника нельзя проводить

- разгибание головы
- выдвигание нижней челюсти
- открывание рта
- открывания рта, выдвигание нижней челюсти

1557. Выберите правильный ответ

Для проведения сердечно-легочной реанимации обязательно

- положение на жестком основании
- наличие капнографа
- наличие монитора
- дыхательный объем, равный 1000 мл

1558. Выберите правильный ответ

Частота вдохов при ИВЛ взрослому в одну минуту

- 12-18
- 6-8
- 10-12
- 20-25

1559. Выберите правильный ответ

При фибрилляции желудочков следует проводить

- дефибрилляцию
- искусственное дыхание
- введение медикаментозных средств
- открытый массаж сердца

1560. Выберите правильный ответ

При извлечении человека из ледяной воды через 10 минут, следует

- приступить к проведению реанимации
- вызвать скорую помощь
- вызвать милицию
- вызвать врача поликлиники

1561. Выберите правильный ответ

Алгоритм на догоспитальном этапе при утоплении

- достать из воды, обеспечить проходимость дыхательных путей
- массаж сердца
- ИВЛ
- удаление воды из легких

1562. Выберите правильный ответ

Экстренная госпитализация утонувшего после реанимационных мероприятий

- обязательна во всех случаях
- обязательна при подозрении на травму позвоночника
- не обязательна, если быстро пришел в себя
- не обязательна при быстром восстановлении дыхания

1563. Выберите правильный ответ

Тактика фельдшера при легких поражениях электрическим током

- успокоить пострадавшего, наложить повязку на место поражения («метка тока») и госпитализировать в терапевтическое отделение
- наложить повязку на место поражения («метка тока»)

- госпитализировать в терапевтическое отделение
- успокоить пострадавшего

1564. Выберите правильный ответ

Реанимационные мероприятия при повешении

- освобождение из петли, туалет полости рта и носоглотки и СЛР
- туалет полости рта и носоглотки
- СЛР по общим правилам
- освобождение из петли

1565. Выберите правильный ответ

Интубация при странгуляционной асфиксии предупреждает

- непроходимость трахеи
- резкое падение АД
- судорожный синдром
- нарушение теплорегуляции

1566. Выберите правильный ответ

Способ транспортировки пациента в коме

- устойчивое боковое положение
- лежа на спине
- лежа на спине с опущенным головным концом
- лежа на животе

1567. Выберите правильный ответ

При всех методах ингаляции кислородом требуется

- увлажнение дыхательной смеси
- положение с опущенным головным концом кровати
- введение эуфиллина
- назначение больному бронхоспазмолитиков

1568. Выберите правильный ответ

При травматическом шоке средней степени тяжести показано введение

- коллоидных и кристаллоидных растворов
- сердечных гликозидов
- вазопрессоров (допамина)
- мочегонных препаратов

1569. Выберите правильный ответ

Обязательный комплекс интенсивной терапии при анафилактическом шоке на догоспитальном этапе

- внутривенное введение эпинефрина гидрохлорида (адреналина) и глюкокортикоидов на фоне инфузионной терапии
- внутривенное введение глюконата кальция и хлоропирамина гидрохлорида (супрастина)
- внутримышечная инъекция эпинефрина гидрохлорида (адреналина), хлоропирамина гидрохлорида (супрастина) и никетамида (кордиамина)
- внутривенное введение глюкокортикоидных гормонов на фоне массивной инфузионной терапии

1570. Выберите правильный ответ

Основная задача интенсивной терапии гиповолемического шока на догоспитальном этапе

- восполнение объема циркулирующей крови
- стимуляция сократительной способности миокарда

- улучшение реологических свойств крови
- дегидратация

1571. Выберите правильный ответ

Объем воды для промывания желудка при пероральном отравлении у взрослого

- 8-12 литров воды комнатной температуры
- 2-3 литра холодной воды
- 2-3 стакана теплой воды
- промывание не обязательно

1572. Выберите правильный ответ

При брадикардии, вызванной передозировкой сердечными гликозидами, применяют

- атропин
- фуросемид
- атенолол
- эналаприл

1573. Выберите правильный ответ

При отравлении ядовитыми грибами неотложная помощь направлена на

- поддержание функции жизненно важных органов
- обезболивание
- подавление активности нервной системы
- профилактику осложнений

1574. Выберите правильный ответ

При цереброваскулярной коме на фоне артериальной гипертензии применяют

- болюсное введение гипотензивных препаратов
- глюкокортикостероиды
- гипотензивные препараты под язык или внутрь
- осмотические диуретики

1575. Выберите правильный ответ

Первая помощь при тепловом ударе направлена на

- скорейшее устранение перегревания тела
- улучшение дыхания и кровообращения
- обильный прием жидкости
- восстановление сознания

1576. Выберите правильный ответ

Принцип лечения острых отравлений, осуществляемый на этапе СМП во всех без исключения случаях

- антидотная терапия
- активная детоксикация
- промывание желудка
- посиндромная неотложная помощь

1577. Выберите правильный ответ

Антидот при отравлении фосфорорганическими соединениями (ФОС)

- атропин
- сернокислая магнезия
- неостигмина метилсульфат (прозерин)
- димеркапрол (унитиол)

1578. Выберите правильный ответ

Симптомы, указывающие на то, что доза антидота, примененного при отравлении

фосфорорганическими соединениями (ФОС)
достаточная

- появление сухости кожи, слизистых, уменьшение брадикардии, расширение зрачков
- сужение зрачков, увеличение влажности кожи
- увеличение влажности кожи
- уменьшение тахикардии, сужение зрачков, уменьшение сухости кожи

1579. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при отравлении опиатами, сопровождающемся комой и депрессией дыхания

- восстановление проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция легких
- промывание желудка через зонд
- внутривенное введение налоксона
- внутривенное введение никетамида (кордиамина)

1580. Выберите правильный ответ

В качестве антидота при отравлении метиловым спиртом применяется

- этанол
- налоксон
- неостигмина метилсульфат (прозерин)
- димеркапрол (унитиол)

1581. Выберите правильный ответ

При отравления метиловым спиртом каждые 3 часа внутрь вводится этанол в дозе

- 50 мл 30% раствора
- 20 мл 5% раствора
- 200 мл 30% раствора
- 50 мл 70% раствора

1582. Выберите правильный ответ

Обязательное лечебное мероприятие при отравлении угарным газом на догоспитальном этапе

- оксигенотерапия 100% кислородом
- промывании желудка
- внутривенное введение налоксона
- внутримышечное введение унитиола

1583. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы

- сальбутамол
- гепарин
- морфин
- нитроглицерин

1584. Выберите правильный ответ

При приступе бронхиальной астмы противопоказан препарат

- морфин
- фенотерол
- преднизолон
- эуфиллин (аминофиллин)

1585. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при легочном кровотечении

- этамзилат

- гепарин
- ацетилсалициловая кислота
- дифенгидрамин гидрохлорид (димедрол)

1586. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при инфаркте миокарда

- морфин, гепарин
- амоксициллин, бромгексин
- эпинефрин, преднизолон
- эналаприл, фуросемид

1587. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при приступе стенокардии

- нитроглицерин
- морфин
- дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол)
- преднизолон

1588. Выберите правильный ответ

Аэрозольная форма нитроглицерина

- нитроминт
- нитросорбид
- нитрогранулонг
- нитронг

1589. Выберите правильный ответ

Транспортировка пациента с инфарктом миокарда

- лежа на носилках
- в кресле-каталке
- самостоятельное передвижение
- сидя

1590. Выберите правильный ответ

При инфаркте миокарда необходима госпитализация

- в первый час заболевания
- на 2-е сутки заболевания
- на 3-и сутки заболевания
- на 4-е сутки заболевания

1591. Выберите правильный ответ

Неотложную помощь при анафилактическом шоке начинают оказывать

- на месте его развития
- в процедурном кабинете
- в приемном отделении
- в палате

1592. Выберите правильный ответ

Неотложная помощь при анафилактическом шоке

- эпинефрин (адреналин), преднизолон
- атропин, дротаверин
- нифедипин, эналаприл
- каптоприл, фуросемид

1593. Выберите правильный ответ

Препарат, применяемый при остановке сердца

- эпинефрин (адреналин)
- эналаприлат
- морфин
- фуросемид

1594. Выберите правильный ответ

Пациента с массивной кровопотерей транспортируют

- лежа с приподнятым ножным концом
- лежа на животе
- лежа с опущенными ногами
- полусидя

1595. Выберите правильный ответ

При переломе костей предплечья шина накладывается

- от кончиков пальцев до верхней трети плеча
- от лучезапястного сустава до локтевого сустава
- на место перелома
- от лучезапястного сустава до верхней трети плеча

1596. Выберите правильный ответ

Лежа на спине, на щите транспортируют пациентов

- с переломом грудного отдела позвоночника
- с ушибом грудной клетки
- с травмой органов брюшной полости
- с переломом ребер

1597. Выберите правильный ответ

В соответствии с рекомендациями ВОЗ исходно здоровым детям жаропонижающую терапию следует проводить, когда аксиллярная температура у ребенка

- 38,5 град С
- 37,5 град С
- 38,0 град С
- 37,0 град С

1598. Выберите правильный ответ

В соответствии с рекомендациями ВОЗ детям первых 3-х мес., с фебрильными судорогами в анамнезе жаропонижающую терапию следует проводить, когда аксиллярная температура

- 38,0 град С
- 37,5 град С
- 38,5 град С
- 37,0 град С

1599. Выберите правильный ответ

В соответствии с рекомендациями ВОЗ детям с тяжелыми заболеваниями сердца, органическими поражениями центральной нервной системы жаропонижающую терапию следует проводить, когда аксиллярная температура

- 38,0 град С
- 37,5 град С
- 38,5 град С
- 37,0 град С

1600. Выберите правильный ответ

Препарат первого выбора, назначаемый при лихорадке у детей

- парацетамол
- ацетилсалициловая кислота
- преднизолон
- метамизол натрия (анальгин)

1601. Выберите правильный ответ

Парацетамол назначается детям при лихорадке в разовой дозе

- 10-15 мг на кг массы тела
- 10-15 мг на год жизни
- 60 мг на год жизни
- 60 мг на кг массы тела

1602. Выберите правильный ответ

При «бледном» типе лихорадки показано

- грелка к ногам
- холод на область крупных сосудов
- обтирание полуспиртовым раствором
- холодный компресс на лоб

1603. Выберите правильный ответ

В состав литической смеси при «бледном» типе лихорадки у детей должен входить

- дротаверин
- преднизолон
- аминофиллин (эуфиллин)
- фуросемид

1604. Выберите правильный ответ

Физические методы охлаждения при лихорадке у детей противопоказаны

- при признаках «бледной» лихорадки
- при наличии в анамнезе судорог на повышение температуры
- всегда
- детям грудного возраста

1605. Выберите правильный ответ

Препарат выбора на догоспитальном этапе при судорожном синдроме у детей

- 0,5% раствор седуксена
- 50% раствор метамизола натрия (анальгина)
- 1% раствор дифенгидрамина гидрохлорида (димедрола)
- 10% раствор кальция глюконата

1606. Выберите правильный ответ

Тактика фельдшера скорой помощи при возникновении судорог у ребенка

- введение противосудорожных препаратов, обеспечение респираторной поддержки, госпитализацию в стационар
- введение противосудорожных препаратов, при купировании судорог - «актив» в поликлинику
- введение противосудорожных препаратов, обеспечение респираторной поддержки, вызов «на себя» специализированной бригады скорой медицинской помощи
- незамедлительную госпитализацию без дополнительных лечебных мероприятий

1607. Выберите правильный ответ

При судорожном синдроме у детей со спазмофилией показано введение

- 10% раствора кальция глюконата
- 50% раствора метамизола натрия (анальгина)
- 1% раствора дифенгидрамина гидрохлорида (димедрола)

0,1% раствора эpineфрина гидрохлорида (адреналина)

1608. Выберите правильный ответ

Разовая доза раствора седуксена у детей при внутримышечном или внутривенном введении составляет

- 0,3-0,5 мг/кг веса (0,05-0,1 мл/кг)
- 0,05-0,1 мг/кг веса
- 0,01 мг/кг веса
- 1 мг/кг веса

1609. Выберите правильный ответ

При обструктивном ларингите, осложнившимся стенозом гортани II на этапе скорой помощи показано

- проведение ингаляции через небулайзер будесонидом (пульмикортом)
- введение внутривенно 2,4% раствора аминофиллина (эуфиллина)
- промывание желудка
- применение физических методов охлаждения

1610. Выберите правильный ответ

Для купирования приступа бронхиальной астмы у детей используют бета-адреномиметик

- сальбутамол
- будесонид (пульмикорт)
- преднизолон
- дифенгидрамин гидрохлорид (димедрол)

1611. Выберите правильный ответ

При обмороке ребенку следует придать положение

- лежа с опущенным головным концом
- лежа на боку
- лежа с приподнятым головным концом
- ортопное

1612. Выберите правильный ответ

Препарат выбора для проведения оральной регидратации детям

- регидрон
- 5% раствор глюкозы
- физиологический раствор
- кипяченая вода

1613. Выберите правильный ответ

Препарат выбора для проведения оральной регидратации детям

- цитроглюкосалан
- смекта
- физиологический раствор
- пепидол

1614. Выберите правильный ответ

Расчет вводимой жидкости на 1-ом этапе проведения оральной регидратации

- 50 мл/кг
- 20 мл/кг
- 30 мл/кг
- 10 мл/кг

1615. Выберите правильный ответ

Алгоритм оказания неотложной помощи ребенку при крапивнице и ангионевротическом отеке (отеке Квинке) включает введение

- 2% раствора хлоропирамина (супрастина) 0,1-0,15 мл/год
- 2% раствора хлоропирамина (супрастина) 0,1-0,15 мл/кг
- 50% раствора метамизола натрия (анальгина) 01 мл/год
- 50% раствора метамизола натрия (анальгина) 01 мл/кг

1616. Выберите правильный ответ

Раствор эpineфрина гидрохлорида (адреналина) при анафилактическом шоке вводится детям в дозе

- 0,1 мл/год
- 0,1 мл/кг
- 1 мл/год
- 0,5 мл/год

1617. Выберите правильный ответ

Преднизолон при анафилактическом шоке вводится детям в дозе

- 5-10 мг/кг
- 1-2 мг/кг
- 1-2 мг/год
- 25 мг

1618. Выберите правильный ответ

При подозрении на развитие у ребенка кетоацидотической комы у ребенка с сахарным диабетом на догоспитальном этапе следует

- начать внутривенное капельное введение физиологического раствора
- ввести глюкокортикостероиды
- начать внутривенное капельное введение раствора глюкозы
- ввести инсулин

1619. Выберите правильный ответ

Количество воды для промывания желудка ребенку старше года равно

- 1,0 л на год жизни
- 1,0 л на кг массы тела
- 2,0 л на год жизни
- 100 мл на кг массы тела

1620. Выберите правильный ответ

Количество воды для промывания желудка ребенку первого года равно

- 100 мл на месяц жизни
- 1,0 л на кг массы тела
- 1,0 л на год жизни
- 100 мл на кг массы тела

1621. Выберите правильный ответ

Разовый объем жидкости при промывании желудка детям равен

- 10 мл/кг
- 200 мл
- 500 мл
- 100 мл

1622. Выберите правильный ответ

При ингаляционном отравлении ребенка в первую очередь следует

- удалить пострадавшего из опасной зоны или проветрить помещение
- промыть желудок
- сделать очистительную клизму
- теплым раствором мыльной воды тщательно обмыть кожу в течение не менее 15 минут

1623. Выберите правильный ответ

При носовом кровотечении ребенка следует

- усадить, слегка наклонив голов вперед
- усадить, голову запрокинуть вверх
- уложить с опущенным головным концом
- уложить на спину, под плечи подложить валик

1624. Выберите правильный ответ

При менингококковой инфекции на догоспитальном этапе с целью этиотропной терапии необходимо ввести

- азитромицин
- цефтриаксон
- цефалоспорины
- пенициллин

1625. Выберите правильный ответ

При менингококковой инфекции на догоспитальном этапе с целью предотвращения развития/уменьшения отека мозга необходимо ввести

- фуросемид (лазикс)
- преднизолон
- аминофиллин (эуфиллин)
- метамизол натрия (анальгин)

1626. Выберите правильный ответ

При менингококковой инфекции на догоспитальном этапе с целью предотвращения развития острой надпочечниковой недостаточности необходимо ввести

- преднизолон
- аминофиллин (эуфиллин)
- левомецетин сукцинат натрия
- фуросемид

1627. Выберите правильный ответ

Экспресс-оценка комы включает в себя исследование

- состояния сознания, характера дыхания, вида и реактивности зрачков
- характера дыхания и величины АД
- состояния сознания и функции почек
- вида и реактивности зрачков и функции печени

1628. Выберите правильный ответ

Индекс Альговера - это отношение

- пульса к систолическому давлению
- пульса к диастолическому давлению
- диастолического давления к пульсу
- систолического давления к пульсу

1629. Выберите правильный ответ

При правильно наложенном артериальном жгуте отмечают

- прекращение кровотечения
- синюшность кожных покровов
- отсутствие всех видов чувствительности ниже жгута
- повышение температуры тканей ниже жгута

1630. Выберите правильный ответ

Температура тела, при которой в случае переохлаждения реанимационные мероприятия могут быть успешными при

- температуре выше 28,0 град С
- 34,0 град С
- температуре тела, превышающей температуру воздуха
- 36,0 град С

1631. Выберите правильный ответ

Введение желудочного зонда на догоспитальном этапе при отравлении ядами прижигающего действия

- показано после введения анальгетиков и спазмолитиков
- противопоказано в течение первых 2 часов после отравления
- противопоказано в любом случае
- показано только у больных в коме

1632. Выберите правильный ответ

Постепенное медленное снижение артериального давления показано, если гипертонический криз осложняется

- ишемическим инсультом
- расслаивающей аневризмой аорты
- острым коронарным синдромом
- нарушением ритма сердца

1633. Выберите правильный ответ

Для подтверждения ишемии миокарда на ЭКГ диагностически значимыми являются изменения

- сегмента ST
- зубца Р
- комплекса QRS
- интервала PQ

1634. Выберите правильный ответ

Максимально быстрое снижение артериального давления показано, если гипертонический криз осложняется

- расслаивающей аневризмой аорты
- ишемическим инсультом
- острым коронарным синдромом
- нарушением ритма сердца

1635. Выберите правильный ответ

Цель проведения 1-ого этапа оральной регидратации

- восстановить потерянный объем жидкости
- снятие интоксикации
- предупреждение последующих потерь жидкости
- предупреждение развития пареза кишечника

1636. Выберите правильный ответ
Длительность 1-ого этапа оральной регидратации
 4-6 часов

- 2-4 часа
- 1-2 часа
- 8-10 часов

ПМ.06. Осуществление организационно-аналитической деятельности

МДК.06.01. Организация здравоохранения

1637. Выберите правильный ответ

Экстренное извещение передается при вновь выявленном

- инфекционном заболевании
- заболевании легких
- психическом заболевании
- врожденном пороке сердца

1638. Выберите правильный ответ

Экстренное извещение форма №058/у составляется на

- необычную реакцию на прививку
- оперативное вмешательство
- любое обращение в поликлинику
- первичный патронаж новорожденного

1639. Выберите правильный ответ

Основным документом ребёнка в детской поликлинике, который содержит историю его развития, является учетная форма

- №112
- №039
- №036
- №030

1640. Выберите правильный ответ

История развития ребенка представляет собой учетную форму

- №112/у
- №026/у
- №030/у
- №079/у

1641. Выберите правильный ответ

Основным медицинским документом ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, является форма

- №026/у
- №112/у
- №063/у
- №058/у

1642. Выберите правильный ответ

Карта профилактических прививок - форма

- №063/у
- №030/у
- №058/у
- №112/у

1643. Выберите правильный ответ

Учетными формами для планирования профилактических прививок в детской поликлинике являются формы

- №063/у и №112/у
- №026/у - 2000 и №112/у

- №063/у и №058/у
- №063/у и №026/у-2000

1644. Выберите правильный ответ

Учетная форма №025/у - это

- медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
- контрольная карта диспансерного наблюдения
- экстренное извещение
- история развития ребенка

1645. Выберите правильный ответ

Учетная форма №025/у «медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»

- заполняется на каждого впервые обратившегося за медицинской помощью в амбулаторных условиях пациента(ку)
- ведется на пациентов(ок), обращающихся за медицинской помощью в амбулаторных условиях в специализированные медицинские организации или их структурные подразделения
- заводится отдельно каждым из врачей, проводящим лечение
- заполняется только при первом и завершающем посещении пациента

1646. Выберите правильный ответ

При достижении ребенком возраста 17 лет (включительно) и передаче его на медицинское обслуживание в амбулаторно-поликлиническое учреждение данные из истории развития ребенка (учетная форма №112/у) переносятся в форму

- №052-1/у «Вкладной лист на подростка к медицинской карте амбулаторного больного»
- №025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»
- №025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»
- №030-13/у «Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг»

1647. Выберите правильный ответ

Основным учетным документом при проведении диспансеризации является форма

- №030/у
- №026/у
- №112/у
- №079/у

1648. Выберите правильный ответ

Учетная форма №030/у - это

- контрольная карта диспансерного наблюдения
- медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
- экстренное извещение
- история развития ребенка

1649. Выберите правильный ответ

При заполнении учетной формы №030/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения» взрослого пациента номер карты должен соответствовать номеру

«медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (форма N 025/у)

- страхового медицинского полиса пациента
- СНИЛС пациента
- «талона пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (форма N 025-1/у)

1650. Выберите правильный ответ

Листок нетрудоспособности

документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность граждан и подтверждающий временное освобождение от работы

документ, гарантирующий получение бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования на всей территории РФ по программе обязательного медицинского страхования

- медицинская карта амбулаторного пациента
- экстренное извещение

1651. Выберите правильный ответ

Основной документ при изучении заболеваемости с временной утратой нетрудоспособности

- листок нетрудоспособности
- медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
- карта пациента, выбывшего из стационара
- контрольная карта диспансерного наблюдения

1652. Выберите правильный ответ

В листке нетрудоспособности исправления

- не допускаются
- допускается 1 исправление
- допускается не более 2-х исправлений
- допускается не более 3-х исправлений по разрешению врачебной комиссии

1653. Выберите правильный ответ

Вид медицинской информационной системы базового уровня

- консультативно-диагностическая система
- информационная система лечебно-профилактического учреждения
- информационная система НИИ и медицинских вузов
- информационная система консультативного центра

1654. Выберите правильный ответ

Вид медицинской информационной системы уровня лечебно-профилактических учреждений

- информационная система консультативного центра
- консультативно-диагностическая система
- приборно-компьютерная система
- информационно-справочная система

1655. Выберите правильный ответ

Медицинская информационная система, включающая базы данных для ввода, хранения, поиска и выдачи медицинской справочной информации по запросу пользователя

- информационно-справочная система
- информационная система консультативного центра
- приборно-компьютерная система
- консультативно-диагностическая система

1656. Выберите правильный ответ

Компонент автоматизированного рабочего места медицинского работника

- приборно-компьютерная система
- информационная система консультативного центра
- банк информации медицинских учреждений и служб
- скрининговая система

1657. Выберите правильный ответ

Информационная система, предназначенная для ведения, хранения на электронных носителях, поиска и выдачи по информационным запросам персональных медицинских записей

- электронная история болезни
- электронный медицинский архив
- электронная персональная медицинская запись
- электронный журнал медицинских записей

1658. Выберите правильный ответ

Любая запись, сделанная конкретным медицинским работником в отношении конкретного пациента и сохраненная на электронном носителе

- электронная персональная медицинская запись
- электронная история болезни
- электронный медицинский архив
- электронный документ

1659. Выберите правильный ответ

Электронное хранилище данных, содержащее электронные персональные медицинские записи и другие наборы данных и программ

- электронный медицинский архив
- электронная персональная медицинская запись
- электронная история болезни
- электронный документ

1660. Выберите правильный ответ

Условие организации ведения электронной персональной медицинской записи (ЭПМЗ)

- неизменность и достоверность на протяжении всего периода хранения

- достоверность на момент создания ЭПМЗ
- общий доступ к ЭПМЗ до ее подписания
- ограничение доступа к данным об авторе и дате создания ЭПМЗ

1661. Выберите правильный ответ

Условие организации ведения электронной персональной медицинской записи (ЭПМЗ)

- возможность определить автора и происхождение ЭПМЗ в любой момент времени
- достоверность на момент создания ЭПМЗ
- открытый доступ к ЭПМЗ до ее подписания
- ограничение доступа к данным об авторе и дате создания ЭПМЗ

1662. Выберите правильный ответ

Условие организации ведения электронной персональной медицинской записи (ЭПМЗ)

- регламентация прав доступа и конфиденциальность
- достоверность на момент создания ЭПМЗ
- открытый доступ к ЭПМЗ
- ограничение доступа к данным об авторе и дате создания ЭПМЗ

1663. Выберите правильный ответ

Обязательный элемент электронной персональной медицинской записи (ЭПМЗ)

- идентификатор лица, создавшего запись
- текст ЭПМЗ
- прикрепленные файлы
- формализованные данные, прикрепленные к ЭПМЗ

1664. Выберите правильный ответ

Формат электронного документа, предназначенный только для просмотра

- PDF
- RTF
- TIFF
- DOC

1665. Выберите правильный ответ

Формат текстового электронного документа

- DOC
- RTF
- TIFF
- PDF

1666. Выберите правильный ответ

Технология, с помощью которой производится передача электронных сообщений и документов

- электронная почта
- чат
- веб-форум
- IP-телефония

1667. Выберите правильный ответ

Инструмент для поиска в Интернете информации по ключевым словам

- поисковые машины
- индексированные каталоги
- тематические списки ссылок

- онлайн-энциклопедии и справочники

1668. Выберите правильный ответ

Программа для открытия web-страниц

- браузер
- проводник
- FTP-сервер
- служба передачи файлов

1669. Выберите правильный ответ

Диспансеризация – это

- динамическое наблюдение за здоровьем пациента
- санаторно-курортное лечение
- реабилитация пациента
- самоконтроль за состоянием пациента

1670. Выберите правильный ответ

Диспансеризация взрослого населения до 40 лет проводится

- 1 раз в три года
- 1 раз в год
- 2 раза в год
- 1 раз в два года

1671. Выберите правильный ответ

Количество групп состояния здоровья взрослого населения по результатам диспансеризации

- 3
- 4
- 1
- 2

1672. Выберите правильный ответ

Диспансеризацию больных, перенесших неспецифический экссудативный плеврит, проводит

- терапевт
- онколог
- рентгенолог
- фтизиатр

1673. Выберите правильный ответ

При диспансеризации больных с язвенной болезнью желудка проводится

- фиброгастроскопия
- ирригоскопия
- колоноскопия
- ректороманоскопия

1674. Выберите правильный ответ

При хронической почечной недостаточности в диете ограничивают

- белки
- витамины
- жиры
- углеводы

1675. Выберите правильный ответ

Диспансерное наблюдение больных циррозом печени проводит

- терапевт
- инфекционист
- онколог

хирург

1676. Выберите правильный ответ

Период диспансерного наблюдения лиц, перенесших острый пиелонефрит

- 1 год
 2 года
 3 года
 4 года

1677. Выберите правильный ответ

Профилактические медицинские осмотры являются основой

- диспансеризации
 первичной медико-санитарной помощи
 реабилитационной работы
 экспертизы трудоспособности

1678. Выберите правильный ответ

Субкомпенсация характеризуется

- частичным возмещением функций
 полным возмещением функций
 состоянием полного физического комфорта
 нарушением жизнедеятельности организма

1679. Выберите правильный ответ

Функция фельдшерско-акушерского пункта

- оказание населению доврачебной медицинской помощи
 оценка качества диспансеризации населения
 обеспечение квалифицированной стационарной медицинской помощи населению
 оказание высокотехнологичной медицинской помощи

1680. Выберите правильный ответ

Функция фельдшерско-акушерского пункта

- повышение санитарно-гигиенической культуры населения
 оценка качества диспансеризации населения
 обеспечение квалифицированной стационарной медицинской помощи населению
 оказание высокотехнологичной медицинской помощи

1681. Выберите правильный ответ

Документ, предусматривающий оплату услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной учреждениями здравоохранения женщинам в период беременности и родов

- родовой сертификат
 единовременное пособие по рождению ребенка
 свидетельство о рождении ребёнка
 страховой полис

1682. Выберите правильный ответ

Учетная форма 058/у - это

- экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку

извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования

извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, психического заболевания

статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов

1683. Выберите правильный ответ

Подача экстренного извещения в инфекционный кабинет обязательна при выявлении

- острой кишечной инфекции
 острого гастрита
 синдрома раздраженного кишечника
 острого аппендицита

1684. Выберите правильный ответ

Маммография обеих молочных желез в двух проекциях в возрасте 40-75 лет проводится женщинам

- 1 раз в 3 года
 по показаниям
 ежегодно
 1 раз в 2 года

1685. Выберите правильный ответ

Декомпенсация характеризуется

- нарушением деятельности органа, системы органов или всего организма вследствие истощения компенсаторных систем
 состоянием частичного возмещения функций
 состоянием полного возмещения функций
 состоянием полного физического комфорта

1686. Выберите правильный ответ

Второй этап диспансеризации проводится с целью

- дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания
 выявления лиц, с острыми инфекционными заболеваниями
 проведения реабилитационных мероприятий
 проведения лечебных мероприятий

1687. Выберите правильный ответ

Дифференцированный набор обследований в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения зависит от

- возраста и пола
 рода деятельности
 психологических особенностей пациента
 возможностей медицинской организации

1688. Выберите правильный ответ

Дополнительным методом обследования больных артериальной гипертензией является

- оценка состояния глазного дна
 суточная экскреция с мочой кортизола
 содержание альдостерона в крови
 суточная экскреция адреналина

1689. Выберите правильный ответ

Кратность диспансерных осмотров больных с гипертонической болезнью в течение года

- 4
- 2
- 1
- 3

1690. Выберите правильный ответ

Основным показателем активности врача/фельдшера в организации и проведении диспансерного наблюдения является

- полнота охвата диспансерным наблюдением больных
- число вновь взятых больных под диспансерное наблюдение
- число больных, ни разу не явившихся на прием
- число зарегистрированных больных, нуждающихся в диспансерном наблюдении

1691. Выберите правильный ответ

Показатель заболеваемости населения изучается по данным

- обращаемости
- переписи населения
- плотности населения
- анкетирования

1692. Выберите правильный ответ

Медицинская организация сельского врачебного участка

- амбулатория
- центральная районная больница
- поликлиника
- диспансер

1693. Выберите правильный ответ

Важнейшим источником изучения численности, состава и территориального размещения населения является

- перепись населения
- статистические отчеты больниц
- данные медицинских осмотров
- анкетирование

1694. Выберите правильный ответ

Негативным показателем оценки здоровья населения является

- инвалидность
- физическое развитие
- рождаемость
- индекс здоровья

1695. Выберите правильный ответ

Негативным показателем оценки здоровья населения является

- смертность
- физическое развитие
- рождаемость
- индекс здоровья

1696. Выберите правильный ответ

Негативным показателем оценки здоровья населения является

- заболеваемость
- физическое развитие
- рождаемость
- индекс здоровья

МДК.06.02. Правовые основы профессиональной деятельности

1697. Выберите правильный ответ

Наложение штрафа - это ответственность

- административная
- дисциплинарная
- уголовная
- материальная

1698. Выберите правильный ответ

Выговор - это ответственность

- дисциплинарная
- уголовная
- материальная
- административная

1699. Выберите правильный ответ

Внеплановый и целевой инструктаж проводит

- непосредственный руководитель работ
- инженер по охране труда
- юрисконсульт
- руководитель организации

1700. Выберите правильный ответ

Несчастные случаи на производстве подлежат расследованию с составлением акта по форме н-1 при потере трудоспособности на

- 1 день и более
- 10 дней и более
- 5 дней
- 7 дней

1701. Выберите правильный ответ

Несчастный случай считается групповым при количестве пострадавших

- 2 и более
- 3 и более
- 3-4
- 4-5

1702. Выберите правильный ответ

В организации создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, если численность работников превышает

- 50 человек
- 100 человек
- 150 человек
- 25 человек

1703. Выберите правильный ответ

Под охраной труда понимают

- систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

- реабилитационные мероприятия для сохранения жизни работников
- экономические мероприятия для сохранения жизни работников
- организационно-правовые мероприятия для сохранения жизни работников

1704. Выберите правильный ответ

Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда проводят с работниками

- принятыми впервые в организацию
- при введении новых правил или стандартов
- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями
- с временными командировочными работниками

1705. Выберите правильный ответ

Баллоны с кислородом в зданиях медицинских организаций устанавливать и хранить

- разрешается в специально отведенных помещениях
- разрешается в подвальных помещениях
- запрещается
- запрещается, если отсутствует централизованное водоснабжение

1706. Выберите правильный ответ

Сведения, которые обязательно должны быть указаны в паспорте огнетушителя

- дата последней зарядки (проверки) и вес заряда
- место изготовления и приобретения огнетушителя
- дата последнего использования (если было)
- дата изготовления

1707. Выберите правильный ответ

Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком в возрасте до 7 лет выдается

- на весь период острого заболевания
- до 10 дней
- на две недели
- до 7 дней

1708. Выберите правильный ответ

Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком в возрасте старше 15 лет при амбулаторном лечении выдается

- 3
- 7
- 15
- 10

1709. Выберите правильный ответ

Листок нетрудоспособности по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет при карантине выдается

- на весь период карантина
- до 15 дней
- до 10 дней
- на неделю

1710. Выберите правильный ответ

При одновременном заболевании двух и более детей маме, работающей по трудовому договору, выдается

- один листок нетрудоспособности
- два листка нетрудоспособности
- два листка нетрудоспособности с интервалом в один день
- справка по уходу за больным ребенком